分 佈：雲南(昆明)。

Pediobius yunanensis Liao 長距繭蜂釉小蜂 (Liao et al., 1987:112)

Pediobius yunanensis Liao, 1987:112.
別 名：*長距繭蜂姬小蜂*。
寄 主：*Macrocentrus* sp. 長距繭蜂。
分 佈：雲南(昆明)。

Pediobius sp. 守子蜂腹柄釉小蜂 (He et al., 1991:51)

別 名：*守子蜂腹柄姬小蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南。

Pediobius sp. 潛蠅柄腹釉小蜂 (He et al., 1991:51; Sheng, 1989:57)

別 名：*潛蠅腹柄姬小蜂*。
寄 主：*Chromatomyia horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅
馬蒿潛蠅
女貞潛蠅
麥葉毛眼水蠅。
分 佈：福建、江西、浙江、安徽。

Pediobius sp. 梨星毛蟲毛背釉小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:83)

寄 主：梨星毛蟲(幼蟲)。
分 佈：江西。

Pediobius sp. 平頂柄腹釉小蜂 (Sheng, 1989:54)

寄 主：*Melanitis leda* Linnaeus 褐稻眼蝶(蛹)。
分 佈：江西。

Planotetrastichus scolyti Yang 小蠹扁體嚙小蜂 (Yang, 1996:283)

Planotetrastichus scolyti Yang, 1996:283-284.
寄 主：*Scolytus* sp. 無瘤黑小蠹(幼蟲)(山榆 *Ulmus* sp.)
Scolytus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲)(榆)。
分 佈：河南、陝西、內蒙古。

Pleurotropis sp. 稻苞蟲釉小蜂 (Liu, 1987:148; Xia, 1957:301)

Pleurotropis sp. Xia, 1957:301.
寄 主：*Parnara guttata* (Bermer et Grey) 稻苞蟲(蛹)。
分 佈：湖南、湖北。

Pnigalio katanis (Ishii) 潛蠅羽角釉小蜂 (Sheng, 1989:42; Sheng et al., 1989:165; Zong et al., 1986:119)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 油菜潛蠅(幼蟲)。

分 佈：江西、湖北。

Pnigalio longulus (Zetterstedt) 側毛釉小蜂 (Sheng, 1995:566)

Pnigalio longulus (Zetterstedt)

寄 主：

分 佈：浙江；歐洲。

Pnigalio soemias (Walker) 背毛釉小蜂 (Liu, 1991:33; Sheng, 11995:565)

Pnigalio soemias (Walker)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 油菜潛蠅(幼蟲)。

分 佈：福建、浙江；朝鮮、歐洲。

Quadrastichus liriomyzae Hansson et LaSaller 三斑潛蠅嚙小蜂 (Chien, 1998:43; Hansson et LaSalle, 1996: 196-198; Wu et Lin, 1998:15)

=*Tetrastichus* sp., Ujiye et Morakote, 1992:254.

=*Tetrastichus* sp., Ujiye et Adachi, 1995:84-86.

Quadrastichus liriomyzae Hansson et LaSaller, 1996:196-198.

寄 主：*Liriomyza trifolii* (Burgess) 三葉斑潛蠅

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 瓜斑潛蠅(昭和草)(臺灣新記錄)

Phyllocnistis citrella Stainton 橘潛蛾(新記錄)。

分 佈：臺灣；日本、琉球、泰國。

Sanyangia propinquae Yang 榆小蠹凸頭釉小蜂 (Yang, 1996:262)

Sanyangia propinquae Yang, 1966:262-263.

寄 主：三刺小蠹(幼蟲及蛹)(春榆、栓皮春榆)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Stenomesius japonicus (Ashmead) 日本釉小蜂 (Chen et Luo, 1990:78; Kamijo, 1976:484-485; Lin, 1997:116; Ujiye et Adachi, 1995:86)

Sympiesomorpha japonica Ashmead, 1904:163.

=*Sympisomorphelleus whitmani* Girault, 1916:300.

=*Stenelachistus impressus* Masi, 1917:201.

=*Euryscotolinx coimbatorensis* Rohwer, 1921:134.

=*Sympiesomorpha chilonis* Ishii, 1937:110.

=*Sympiesomorpha mikan* Ishii, 1953:4.

=*Stenomesioideus ashmeadi* Subba Rao et Sharma, 1966:299.

Stenomesius japonicus, Kamijo, 1976:484-485.

寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾

Epimactis sp. 柑橘白落葉蛾。

分 佈：臺灣、福建；朝鮮，日本、印度、巴基斯坦、埃及、Senegal, Seychelles Is., 新幾內亞、南馬利那、加羅林島。

Stenomesius maculatus Liao 稻縱捲葉螟釉小蜂 (He et al., 1991:50; Li, 1992:217-218; Liao et al., 1987:120; Sheng, 1989:38; Sun et al., 1980(4):22; Zhu, 1981(1-2):86)

Stenomesius sp. Sun et al., 1980(4):22.

Stenomesius maculatus Liao, 1987:120.

別 名：*稻縱捲葉螟姬小蜂，大斑黃小蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
Ancylolomia japonica 稻筒巢螟(幼蟲)(廣西)。
分 佈：福建(沙縣)、江西、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東。

Stenomesius tabashii (Nakayama) 螟蛉狹面釉小蜂 (Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Liao et al., 1987:119; Sheng, 1989:38; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:83; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):86)
別 名：*雙色狹面姬小蜂*。
寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(幼蟲，多寄生)。
分 佈：江西、湖南、四川、浙江、江蘇。

Stenomesius sp. 稻縱捲葉螟大斑黃小蜂 (Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; Zhang, 1987[ed.] 2:83)
寄 主：稻縱捲葉螟(幼蟲)
稻螟蛉(蛹)。
分 佈：江西、貴州。

Stenomesius sp. 刺蛾狹面釉小蜂 (Chen et al., 1999, 15(3):122)
寄 主：*Parasa consocia* Walker 茶青刺蛾。
分 佈：湖南。

Sympiesis derogatae Kamijo 捲葉螟羽角釉小蜂 (Hun., 1992:1273; Sheng, 1989:42; Sheng et al., 1990:112; Zhang, 1987[ed.] 2:83)
寄 主：梔子捲蛾
梔子三紋野螟
Sylepta derogata Fabricius 棉捲葉野螟。
分 佈：江西、湖南、廣西、湖北；朝鮮、日本。

Sympiesis dolichogaster Ashmead 長腹羽角釉小蜂 (Sheng, 1989:43; Sheng et al., 1990:111; Zhang, 1987[ed.] 2:83)
別 名：*烏桕舉肢蛾羽角姬小蜂*。
寄 主：烏桕舉肢蛾。
國外：細蛾科、冠潛蛾科、潛蛾科
分 佈：江西；日本、蘇聯(西烏克蘭)、捷克、匈牙利、澳洲、北美等，世界廣布。

Sympiesis flavopicta Boucek 荻螟羽角釉小蜂 (Sheng, 1989:43; Sheng et al., 1990:112)
寄 主：*Sesamia* sp. 荻蛀莖夜蛾。
分 佈：江西、湖南；德國、捷克、澳大利亞、保加利亞、南斯拉夫。

Sympiesis qinghaiensis Liao 草原毛蟲釉小蜂 (Lioa et al., 1987:98)
別 名：*草原毛蟲姬小蜂*。
寄 主：*Gynaephora alpherakii* (Grum-Grshimailo) 草原毛蟲(蛹)。

分 佈：青海。

Sympiesis ringoniellae Kamijo (Sun et al., 1987:157)
寄 主：*Lithocolletis ringoniella* Matsumura 蘋果金紋細蛾。
分 佈：陝西。

Sympiesis soriceicornis (Nees) (Sun et al., 1987:157)
寄 主：*Lithocolletis ringoniella* Matsumura 蘋果金紋細蛾。
分 佈：陝西。

Sympiesis striatipes (Ashmead) 條腿釉小蜂 (Lin, 1997:117; Wu et Lin, 1998:15)
Eulophus striatipes Ashmead, 1904:165.
Sympiesis striatipes, Kamijo, 1976:496-488.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：臺灣；日本、泰國、印度。

Sympiesis tsai Chu 蔡氏釉小蜂 (Chang et al., 1954:142; Liu, 1987:148)
寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：江西、湖北。

Sympiesis viridula (Thomson) 荻蛀莖夜蛾羽角釉小蜂 (Wang et al., 1989:113)
寄 主：*Sesamia* sp. 荻蛀莖夜蛾。
分 佈：湖南。

Sympiesis sp. 腎毒蛾羽角釉小蜂 (Wang et al., 1989:112)
Sympiesis sp. Wang et al., 1989:112.
寄 主：*Cifuna locuples* Walker 腎毒蛾(幼蟲)。
分 佈：湖南。

Sympiesis sp. 稻苞蟲羽角釉小蜂 (Liu, 1980(4):42; Liu et Wang, 1982:25; Sun et al., 1980(4):22; Xie, 1993, 9(1):21; Zhu, 1981(1-2):87)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Casinaria olacae 稻苞蟲凹眼姬蜂
Apanteles baoris 弄蝶絨繭蜂。
分 佈：福建、廣東、貴州、浙江、湖北。

Sympiesis sp. 潛蛾黑小蜂 (Chen et Luo, 1990:78)
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：福建。

Sympiesis sp. (Chen et Luo, 1990:79)
寄 主：*Epimactis* sp. 柑橘白落葉蛾。

分 佈：福建(福州)。

Tamarixia radiata (Waterston) 亮腹嚙小蜂 (Chien, 1989:187-190; Chien, 1992:1-138; Chien et Chiu, 1987:411-412; Chien et Chu, 1993:186-208; Chien et al., 1988: 430-439; 1989:401-407; 1991:25-38; 264-281; 1993: 111-123; 1994:19-30; 1994:97-105; 1995:81-96; Chiu et al., 1985:449; Huang et Gao, 1996:164; Lo et Chen, 1995:369; Lo et Wu, 1989:181)

Tetrastichus radiatus Waterston

Tamarixia radiata, Boucek, 1988:695.

寄 主：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木虱。

分 佈：臺灣(引進)；Ethiopian.

Teleopterus erxias (Walker) 紋翅釉小蜂 (Sheng, 1989:58; Sheng et al., 1989:165; Sheng et al., 1990:117)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(幼蟲)

女貞潛蠅(幼蟲)。

分 佈：江西；日本、歐洲。

Tetrastichodes sp. 蠊嚙小蜂 (Li et Nei, 1984:406-409; Yu et Xu, 1991:178)

寄 主：*Periplaneta fuliginosa* (Serville) 煙色蜚蠊。

分 佈：貴州、浙江。

Tetrastichus aponiusi Yang 楓樺小蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:281)

Tetrastichus aponiusi Yang, 1996:281.

寄 主：*Scolytus dahuricus* Chapuis 楓樺小蠹(幼蟲)(楓樺、碩樺)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Tetrastichus armandi Yang 松蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:282)

Tetrastichus armandi Yang, 1996:282.

寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(幼蟲、蛹)

其他小蠹(幼蟲、蛹)。

分 佈：陝西(秦嶺林區)。

Tetrastichus ayyari Rohwer 印度嚙小蜂 (ASZI, 1987, 2:343; ASZI et al., 1978:75; He et al., 1991:51; Liao et al., 1987:103; Sheng, 1989:47; Sheng et al., 1990:113; Xia, 1957:303; Zhang, 1987[ed.] 2:83; Zu, 1985:24)

寄 主：杉天牛(幼蟲)

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(蛹)

稻縱捲葉螟(蛹)

三化螟(蛹)

桑螟(蛹)

桑蟥(蛹)

桃蛀螟(蛹)

Sesamia inferens (Walker) 大螟(蛹)

Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(蛹)

柑橘鳳蝶(蛹)

稻眼蝶(蛹)。

分 佈：江西、湖南、廣東、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東；菲律賓、印度。

Tetrastichus brontispae Ferrière 紅胸葉蟲嚙小蜂 (Chiu et al., 1985:213-222; 449; 1988:211-219; Lo et Chen, 1995:368)

Tetrastichus brontispae Ferrière

寄 主：*Brontispa longissima* Gestr.　椰子紅胸葉蟲。

分 佈：臺灣；馬來亞、爪哇、西里伯、關島、塞班、索羅門、薩摩亞、波里尼西亞等島嶼。

附 註：臺灣於 1983 年自關島引進該蜂防治紅胸葉蟲立足成功。

Tetrastichus ceroplastae (Girault) 蠟蚧嚙小蜂 (Chen et al., 1999, 15(3):122; Huang et al., 1991:111; Hun., 1992:1274; Sheng, 1989:46)

寄 主：*Ceroplastes japonicus* Green　日本龜蠟蚧

Ceroplastes rubens Maskell　紅蠟蚧。

分 佈：福建、江西、湖南、浙江。

Tetrastichus clavatus Yang 顯棒小蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:274)

Tetrastichus clavatus Yang, 1996:274-275.

寄 主：*Xyleborus* sp.　材小蠹(幼蟲)(核桃)。

分 佈：陝西。

Tetrastichsu clavicornis Yang 刺角卵腹嚙小蜂 (Yang, 1996:278)

Tetrastichsu clavicornis Yang, 1996:278.

寄 主：肩小蜂(幼蟲)(ex *Scolytus schevyrewi* Semonov 臍腹小蠹，*Scolytus butovitschi* Stark 角胸小蠹)。

分 佈：黑龍江。

Tetrastichus cupressi Yang 柏小蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:276)

Tetrastichus cupressi Yang, 1966:276.

寄 主：*Phloeosinus aubei* Perris　柏肤小蠹(幼蟲)(西藏柏木、柏木)。

分 佈：雲南。

Tetrastichus hagenowii (Ratz.) 大蠊嚙小蜂 (Dai, 1988:182; Dai, 1985, 10(4):34; Dai, 1992:13-15; Dai et al., 1993, 9(3):114-115; Li, 1996, 18(1):47; Li et Nei, 1984:406-409; Li et al., 1984, 27(4):406-409; Li et al., 1989:161-163; Yu, 1991, 7(4):308; Yu et al., 1995, 11(1):102)

寄 主：*Blatella germanica*　德國小蠊

Periplaneta americana　美洲大蠊

Periplaneta australasiae　澳洲大蠊

Periplaneta brunnea　褐斑大蠊

Periplaneta fulifinosa (Serville) . 煙色蜚蠊

Periplaneta japonica　日本大蠊。

分 佈：臺灣、貴州、浙江、山東。

Tetrastichus jinzhouicus Liao 吉丁蟲嚙小蜂 (Lioa et al., 1987:105; Sheng et al., 1990:114)

寄 主：花椒吉丁
核桃黃斑吉丁
沙柳窄吉丁。
分 佈：陝西、遼寧。

Tetrastichus juglansi Yang 核桃小蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:272)

Tetrastichus juglansi Yang, 1996:272-273.
寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲)(核桃)。
分 佈：陝西。

Tetrastichus kodaikanalensis Sarawat 白蠟蟲嚙小蜂(Sheng, 1989:46)

寄 主：*Ericeus pela* (Chavannes) 白蠟蟲。
分 佈：江西。

Tetrastichus piceae Yang 雲杉小蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:277)

Tetrastichus piceae Yang, 1996:277.
寄 主：*Scolytus sinipiceus* Tsai 雲杉小蠹(幼蟲)(青海雲杉)
Dryocoetes hectographsu Reitter 雲杉毛小蠹(幼蟲)(青海雲杉)
Ips typobraphus Linnaeus 光臀八齒小蠹(幼蟲)(青海雲杉)。
分 佈：青海、甘肅(祁連山林區)。

Tetrastichus principiae Domenichoni 草蛉嚙小蜂 (Sheng et al., 1990:114)

寄 主：草蛉(蛹)。
分 佈：陝西；蘇聯、德國、法國、意大利、捷克。

Tetrastichus purpureus Cameron 膠蟲嚙小蜂 (ASZI, 1987, 2:343; ASZI et al., 1978:75; Hun.,1992:1274; Jiang et Gu, 1983:249; Liao et al., 1987:104; Lu et Wu, 1991:105; Sheng, 1989:49; Sheng et al., 1990:114; Shiao, 1978:218; Wang, 1987[ed.]:355; Yunn., 1987:1311)

寄 主：*Ceroplastes rubens* Maskell 紅蠟蚧
Chionaspis sp.
Coccophagus tschirchii Mahdihassan 膠蚧食蚧矮小蜂
Kerria lacca (Kerr) 膠蟲(南嶺黃檀)
Parasaissetia nigra (Nietner) 烏副盔蚧
Pseudaonidia duplex (Cockerell) 茶圓蚧
Tachardiaephagus tachardiae Howard 黃胸膠蚧跳小蜂
松針紅蠟蚧
東方圓蚧。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、華南膠蟲產區、上海；印度。

Tetrastichus schoenobii Ferriere 螟卵嚙小蜂 (ASZI, 1987, 2:344; ASZI et al., 1978:75; Chao et al., 1979:289-293; Cheng, 1953:291; Ding et al., 1980:55-58; Ding et al., 1980:59-61; Ding et al., 1981:262-267; He, 1984:71-75; He et al., 1991: 52; Jin et

al., 1982:1-12; Jiang et al., 1991:13-15; Liao et al., 1987:104; Liu et Wang, 1982:24; Qiu et al., 1980(2):28-31; Qiu et al., 1981:27-34; Qiu et al., 1984:85-96; Sheng, 1989:48; Ting et al., 1981, 24(3):262-267; Xia, 1957:303; Zhang, 1987[ed.] 2:83; Zhang et Zhao, 1986:215-219; Zou, 1980(4):49-51)

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker)　三化螟(卵塊中)
Scirpophaga excerptalis (Walker)　甘蔗白螟(卵塊中)
Schoenobius forficellus Thanberg　莎草螟(卵塊中)
Scirpophaga praelata Scopoli　荸薺白螟(卵塊中)
Spodoptera mauridia Boisd.　白菜夜蛾(卵)
尚寄生 *Tryporyza innotata* Walker　稻白螟(卵塊)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北；菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、印尼、印度、斯里蘭卡。

Tetrastichus shaxianensis Liao 稻縱捲葉螟嚙小蜂 (He et al., 1991:52; Lioa et al., 1987:107; Sheng, 1989:49)
Tetrastichus shaxianensis Liao, 1987:107.
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　稻縱捲葉螟(蛹)。
分 佈：福建(沙縣)、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、湖北。

Tetrastichus sokolowskii Kurdjumov 菜蛾嚙小蜂 (ASZI, 1987, 2:344; Liao et al., 1987:105; Sheng, 1989:49; Zhou et Zou, 1993:166-169)
寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus)　菜蛾(幼蟲、蛹)
Apanteles plutellae Wlkn.　菜蛾絨繭蜂。
分 佈：福建、江西、浙江；全北區、印度、非洲。

Tetrastichus taibaishanensis Yang 太白山小蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:279)
Tetrastichus taibaishanensis Yang, 1996:279-281.
寄 主：*Scolytus* sp.　無瘤黑小蠹(幼蟲)(山榆 *Ulmus* sp.)。
分 佈：陝西(秦嶺)。

Tetrastichus telon (Graham) 長腹木蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:273)
Aprostocetus telon Graham, 1961:8-9.
Tetrastichus telon (Graham), Domenichini, 1966:94-95.
寄 主：*Sphaerotrypes coimmbatorensis* Stegbbing　黃須球小蠹(幼蟲)(核桃)
Agrilus sp.　核桃黑小吉丁(幼蟲)(核桃)。
Agrilus vividis (Linnaeus)　山毛櫸吉丁(歐洲)
分 佈：陝西；歐洲。

Tetrastichus thoracicus Yang 隆胸小蠹嚙小蜂 (Yang, 1996:279)
Tetrastichus thoracicus Yang, 1996:279.
寄 主：*Scolytus schevyrewi* Semonov　臍腹小蠹(幼蟲)(榆)
Scolytus butovitschi Stark　角胸小蠹(幼蟲)(榆)。
分 佈：黑龍江。

Tetrastichus sp. 蠊卵擬嚙小蜂 (Li, 1996, 18(1):47; Yu, 1991, 7(4):308; Yu et al., 1995, 11(1):102)

寄 主：*Blatella germanica* 德國小蠊(黑胸大蠊)。
分 佈：浙江。

Tetrastichus sp. (Chou et Chou, 1990:70-75)
寄 主：*Idioscopus clypealis* (Leth.) 檬果葉蟬
Idioscopus niveosparsus (Leth.) 檬果葉蟬。
分 佈：臺灣。

Tetrastichus sp. 杉梢小捲蛾嚙小蜂 (Tong, 1981(3):38)
Tetrastichus sp. Tong, 1981(3):38.
寄 主：*Polychorsis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小捲蛾。
分 佈：湖南。

Tetrastichus sp. 稻縱捲葉螟嚙小蜂 (Hu et Wu, 1987:187; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:84; Zhu, 1981(1-2):87)
寄 主：二化螟(蛹)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenèe) 稻縱捲葉螟(蛹)。
分 佈：臺灣、廣東、湖南、貴州、浙江、湖北。

Tetrastichus sp. 竹縷舟蛾嚙小蜂 (Sheng et al., 1990:115)
寄 主：竹縷舟蛾(蛹)。
分 佈：湖南。

Tetrastichus sp. 松毛蟲嚙小蜂 (Sheng et al., 1990:115; Tong et al., 1988:118-122; Zhang, 1987[ed.] 2:84)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)。
分 佈：江西、湖南。

Tetrastichus sp. 粘蟲嚙小蜂 (Sun et al., 1984:110)
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：廣東。

Tetrastichus sp. 稻眼蝶嚙小蜂 (He et al., 1991:52)
寄 主：*Mycalesis gotma* Moore 稻眼蝶(蛹)。
分 佈：雲南。

Tetrastichus sp. 稻苞蟲嚙小蜂 (He et al., 1991:52; Sun et al., 1984:110)
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：廣東。

Tetrastichus sp. 水虻嚙小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:84)
寄 主：水虻(幼蟲)。
分 佈：江西。

Tetrastichus sp. 稻稈蠅嚙小蜂 (He et al., 1991:52; Zhang, 1987[ed.] 2:84)

寄 主：稻稈蠅(蛹)。

分 佈：江西、雲南、浙江。

Tetrastichus sp. 稻黑稈蠅嚙小蜂 (He et al., 1991:52)

寄 主：稻黑稈蠅(蛹)。

分 佈：雲南。

Tetrastichus sp. 潛蠅黃斑嚙小蜂 (Sheng, 1989:47; Sheng et al., 1989:165)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(幼蟲)

Caryepteris incana (Thunberg) 馬蒿潛蠅。

分 佈：江西。

Tetrastichus sp. (Schaefer et al., 1986:112-115; Wang et Sheng, 1991:99, Sheng et Wang, 1992:111)

寄 主：*Epilachna vigintioctopunctata* 二十八星瓢蟲(卵、幼蟲、蛹)。

分 佈：江西、我國南部、中部。

Tetrastichus sp. 榆葉蟲嚙小蜂 (Xiao, 1985(2):26; Zhang et Zhang, 1985:201-203)

Tetrastichus sp. Zhang et Zhang, 1985:201.

寄 主：*Pyrrhalta aenescens* Fairmaire 榆葉蟲(卵)。

分 佈：江蘇、河南。

Tetrastichus sp. 柑橘木蛾嚙小蜂 (Chen et Luo, 1990:79)

寄 主：*Odites* sp. 柑橘白落葉蛾。

分 佈：福建(福州)。

Tetrastichus sp. 菜粉蝶嚙小蜂 (Chen et al., 1991:111)

寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶。

分 佈：雲南。

Tetrastichus sp. 負泥蟲嚙小蜂 (Sheng et Lu, 1988:61)

寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲。

分 佈：江西。

Tetrastichus sp. 嚙小蜂 (Zhang et Li, 1993, 9(1):47)

寄 主：*Apanteles glomeratus* (Linnaeus) 菜粉蝶絨繭蜂(山楂粉蝶)

Aerolyta sp. 背頸盆蜂(山楂粉蝶)。

分 佈：吉林、黑龍江。

Tetrastichus sp. 淡褐嚙小蜂 (Sheng, 1989:48)

寄 主：蚜癭(朴樹)。

分 佈：江西。

Tetrastichus sp. 梨茎蜂嚙小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:84)
寄 主：梨茎蜂(幼蟲)。
分 佈：江西。

Tetrastichus sp. (Chiu et Lo, 1985:5)
寄 主：*Rhynchocoris humeralis* 角肩蝽。
分 佈：臺灣。

Zaommomentedon brevipetiolatus Kamijo 短柄嚙小蜂 (Kamijo, 1990:824; Lin, 1997:118; Ujiye et Adachi, 1995:84; Ujiye et Morakote, 1992:254; Wu et Lin, 1998:15)
Zaommomentedon brevipetiolatus Kamijo, 1990:824-826.
寄 主：*Phyllocnistis cirella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：臺灣；日本、琉球群島、泰國。

斯氏寡節小蜂 (He et al., 1996(4):34)
寄 主：黑刺粉蝨。
分 佈：浙江。

Trichogrammatidae 毛小蜂科 (赤眼蜂科)
(Lin, 1994, ii + 1-362; Wu et al., 1989:145)

Aphelinoidea gwaliorensis Yousuf et Shafee 長盾光脈赤眼蜂 (Lin, 1994:84, 258)
Aphelinoidea gwaliiorensis Yousuf et Shafee, 1985:303-304.
寄 主：
分 佈：福建；印度。

Aphelinoidea retiruga Lin 紋胸光脈赤眼蜂 (Lin, 1994:83, 259)
Aphelinoidea retiruga Lin, 1994:83-84.
寄 主：
分 佈：福建。

Aphelinoidea spp. 光脈光脈赤眼蜂 (Lin, 1994:260)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Apoderus sissu (Col. Attelabidae)。
分 佈：臺灣；印度。

Asynacta ambrostomae Liao 榆紫葉甲赤眼蜂 (Huo et al., 1990:167; Liao et al., 1987:210; Lin, 1994:198, 261; Sheng, 1989:93)
Asynacta ambrostomae Liao, 1987:210-211.
寄 主：*Ambrostoma quadriimpressum* Motschulsky 榆紫葉甲(卵)。
分 佈：江西、吉林、國內分布甚廣。

Asynacta ophriolae Lin 跳甲異赤眼蜂 (Lin, 1994:197, 261)

Asynacta ophriolae Lin, 1993:207-209.

寄 主：*Ophriola xanthospilota* Baly 黃櫨雙釣跳甲(卵)。

分 佈：北京。

Brachygrammatella (Pseudbrachygramma) coniclavata Lin 錐棒刺脈赤眼蜂 (Lin, 1993:211; 1994:40, 262)

Brachygrammatella coniclavata Lin, 1993:211-212.

寄 主：

分 佈：福建(福州)。

Chaetostricha auralenta Doutt 大青葉蟬赤眼蜂 (Huo et al., 1990:166)

寄 主：大青葉蟬(竹葉)。

分 佈：江西。

Chaetostricha biclavata Lin 雙棒毛翅赤眼蜂 (Lin, 1994:183, 265)

Chaetostricha biclavata Lin, 1994:183.

寄 主：

分 佈：福建(將樂)。

Chaetostricha cirifuniculata Lin 圓索毛翅赤眼蜂 (Lin, 1994:180, 265)

Chaetostricha cirifuniculata Lin, 1994:180-182.

寄 主：

分 佈：福建。

Chaetostricha denticuligera Lin 齒脛毛翅赤眼蜂 (Lin, 1994:182, 265)

Chaetostricha denticuligera Lin, 1994:182.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山、將樂)。

Chaetostricha terebrator Yousuf et Shafee 印度毛翅赤眼蜂 (Lin, 1994:179, 267)

Chaetostricha terebrator Yousuf et Shafee, 1985:301-302.

寄 主：

分 佈：福建、廣東、廣西、湖北；印度。

Densufens multiciliatus Lin 多毛類寬赤眼蜂 (Lin, 1994:177, 269)

Densufens multiciliatus Lin, 1994:177-178.

寄 主：

分 佈：北京、遼寧。

Doirania longiclavata Yashiro 長棒單棒赤眼蜂(Lin, 1994:38, 268)

Doirania longiclavata Yashiro, 1980:131-134.

寄 主：稻田昆蟲。

分 佈：福建、湖北、遼寧；日本。

Epoligosita brachysiphonia Lin 短管愛波赤眼蜂 (Lin, 1994:78, 269)

Epoligosita brachysiphonia Lin, 1990:42-43.

寄 主：

分 佈：福建。

Epoligosita digitata Lin 指突愛波赤眼蜂 (Lin, 1994:81, 269)

Epoligosita digitata Lin, 1990:45-46.

寄 主：

分 佈：福建、廣東、湖北。

Epoligosita longituba Lin 長管愛波赤眼蜂 (Lin, 1994:80, 269)

Epoligosita longituba Lin, 1990:44.

寄 主：

分 佈：福建。

Epoligosita sinica Viggiani et Ren 中華愛波赤眼蜂 (Lin,1994:80, 270; Viggiani et Ren, 1986:245)

Epoligosita sinica Viggiani et Ren, 1986:245-246.

寄 主：?*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧。

分 佈：福建、廣東。

Epoligosita zygoptera Lin 柄翅愛波赤眼蜂 (Lin, 1994:79, 270)

Epoligosita zygoptera Lin, 1990:43-44.

寄 主：

分 佈：福建(永春)。

Epoligositina apiculiformis Lin 尖翅筒索赤眼蜂 (Lin, 1994:70, 270)

Epoligositina apiculiformis Lin, 1990:48-49.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山黃崗山)。

Epoligositina longiclavata Lin 長棒簡索赤眼蜂 (Lin, 1994:69, 270)

Epoligositina longiclavata Lin, 1990:47-48.

寄 主：

分 佈：福建(福州)、廣東(廣州)。

Eteroligosita senticosa Lin 多刺異莖赤眼蜂 (Lin, 1994:130, 271)

Eteroligosita senticosa Lin, 1994:130-131.

寄 主：

分 佈：福建(將樂龍棲山)。

Eteroligosita zonata Lin 帶形異莖赤眼蜂 (Lin, 1994:129, 271)

Eteroligosita zonata Lin, 1994:129-130.

寄 主：

分 佈：福建(將樂)、遼寧。

Eutrichogramma elongatum Lin 長棒優赤眼蜂 (Lin, 1993 191:438; Lin, 1994:72. 271)

Eutrichogramma elongatum Lin, 1981:438-440.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建(將樂)。

Gnorimogramma acuminatum Lin 尖棒顯紋赤眼蜂 (Lin, 1994 :185, 271)

Gnorimogramma acuminatum Lin, 1994:185-186.

寄 主：

分 佈：福建。

Gnorimogramma aduncatum Lin 鈎爪顯紋赤眼蜂 (Lin, 1994:184, 271)

Gnorimogramma aduncatum Lin, 1994:184-185.

寄 主：

分 佈：福建、湖北。

Gnorimogramma oviclavatum Lin 卵棒顯紋赤眼蜂 (Lin, 1994:186, 271)

Gnorimogramma oviclavatum Lin, 1994:186-187.

寄 主：

分 佈：福建。

Haeckeliana brontispae (Lo et Chen,1995:368)

寄 主：

分 佈：

Haeckeliania longituba Lin 長管刺角赤眼蜂 (Lin, 1994:117, 272)

Haeckeliania longituba Lin, 1994:117-118.

寄 主：

分 佈：福建(將樂)。

Haeckeliania nigra Lin 黑色刺角赤眼蜂 (Lin, 1994:116, 272)

Haeckeliania nigra Lin, 1994:116-117.

寄 主：

分 佈：福建(將樂)。

Hayatia latiuscula Lin 截翅環索赤眼蜂 (Lin, 1994:127, 272)

Hayatia latiuscula Lin, 1993:95-96.

寄 主：

分 佈：福建(松溪)。

Hayatia tortuosa Lin 卷莖環索赤眼蜂 (Lin, 1994:126, 273)

Hayatia tortuosa Lin, 1993:94-95.

寄 主：

分 佈：福建(壽寧)。

Hispidophila latimarginata Lin 寬緣尖角赤眼蜂 (Lin, 1994:114, 273)

Hispidophila latimarginata Lin, 1994:114.
寄 主：
分 佈：福建(將樂)。

Hispidophila spinosa Lin 刺狀尖角赤眼蜂 (Lin, 1994:115, 273)

Hispidophila spinosa Lin, 1994:115.
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Ittys latipenis Lin 寬莖似鄰赤眼蜂 (Lin, 1994:176, 274)

Ittys latipenis Lin, 1994:176-177.
寄 主：
分 佈：福建、湖北、北京。

Japania ovi Girault 卵形長痣赤眼蜂 (Lin, 1994:170, 275)

Japania ovi Girault, 1911:44-45.
寄 主：一種葉蟬(卵)(榕樹)。
分 佈：華南。

Japania trachyphloia Lin 粗腹長痣赤眼蜂 (Lin, 1994:169, 275)

Japania trachyphloia Lin, 1994:169-170.
寄 主：
分 佈：福建(仙游)。

Lathromeris gracilicornis Lin 細角紋翅赤眼蜂 (Lin, 1994:110, 276)

Lathromeris gracilicornis Lin, 1994:110-111.
寄 主：
分 佈：廣西。

Lathromeris longipenis Lin 長莖細紋赤眼蜂 (Lin, 1994:112, 276)

Lathromeris longipenis Lin, 1994:112-113.
寄 主：
分 佈：湖北、北京。

Lathromeris tumiclavata Lin 錘棒紋翅赤眼蜂 (Lin, 1994:111, 277)

Lathrumeris tumiclavata Lin, 1994;111-112.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山)。

Lathromeroidea nigra Girault 黑色擬紋赤眼蜂 (Lin, 1994:106, 278)

Lathromeroidea nigra Girault, 1912:94-96.

寄 主：
分 佈：福建、廣西、北京、遼寧；澳洲。

Lathromeroidea trichoptera Lin 毛翅擬紋赤眼蜂 (Lin, 1994:107, 278)
Lathromeroidea trichoptera Lin, 1994:107-108.
寄 主：
分 佈：福建(福州、仙游)。

Lathromeromyia (s. str.) **dimorpha** Hayat 二形多刺赤眼蜂 (Lin, 1994:91, 279)
Lathromeromyia dimopha Hayat, 1981:77.
寄 主：
分 佈：福建；印度。

Lathromeromyia (Lathromeromina) transiseptata Lin 橫帶多刺赤眼蜂 (Lin, 1994:92, 279)
Lathromeromyia (*Lathromeromina*) *trnasiseptata* Lin, 1994:92.
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Megaphragma decochaetum Lin 十毛纓翅赤眼蜂 (Lin, 1994:75, 279)
Megaphragma decochaetum Lin, 1992:131-132.
寄 主：
分 佈：福建、廣東。

Megaphragma deflectum Lin 斜索纓翅赤眼蜂 (Lin, 1994:74, 279)
Megaphragma deflectum Lin, 1992:130-131.
寄 主：
分 佈：福建、遼寧。

Megaphragma polychaetum Lin多毛纓翅赤眼蜂 (Lin,1994:76, 280)
Megaphragma polychaetum Lin, 1992:132-133.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山七里橋)。

Megaphragma sp. 葉蟬纓翅赤眼蜂 (Lin, 1981:442; Lin,:1994:280)
Megaphragma sp. Lin, 1981:441.
寄 主：*Empoasca formosana* 茶小綠(卵)。
分 佈：臺灣。

Mirufens longitubatus Lin 長管斷脈赤眼蜂 (Lin, 1994:204, 281)
Mirufens longitubatus Lin, 1994:204-205.
寄 主：
分 佈：遼寧(瀋陽)。

Mirufens scabricostatus Lin 粗脊斷脈赤眼蜂 (Lin, 1993:209; 1994:202, 281)

Mirufens scabricostatus Lin, 1993:209-211.
寄 主：
分 佈：福建(福州、仙游)。

Mirufens shenyangensis Lou 瀋陽斷脈赤眼蜂 (Lin, 1994:203, 282)
Mirufens shenyangensis Lou, 1991:299-300.
寄 主：葉蟬(卵)(山丁子)。
分 佈：遼寧(瀋陽)。

Mirufens sp. 檬果葉蟬斷脈赤眼蜂(Chou et Chou, 1990:70-75; Lin, 1981:430; Lin, 1994:282; Wen et Lee, 1980:245)
Mirufens (*Trachocera*) sp., Wen et Lee, 1980:245.
Mirufens sp. Lin, 1981:430.
寄 主：*Chunrocerus niveosparsus* Lethierry 檬果葉蟬(卵)。
分 佈：臺灣。

Neocentrobiella longiungula Lin 長爪毛角赤眼蜂 (Lin, 1993:213; 1994:188, 283)
Neocentrobiella longiungula Lin, 1993:213-214.
寄 主：
分 佈：福建。

Oligosita acuticlavata Lin 尖角寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:137, 285)
Oligosita acuticlavata Lin, 1994:137-138.
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Oligosita aequilonga Lin 等腹寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:139, 285)
Oligosita aequilonga Lin, 1994:139.
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Oligosita brevicilia Girault 短毛寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:158, 286)
Oligosita brevicilia Girault, 1915:144-145.
寄 主：
分 佈：福建；泰國、澳洲

Oligosita brevicornis Lin 短角寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:145, 286)
Oligosita brevicornis Lin, 1994:141-146.
寄 主：
分 佈：福建(福州、將樂)。

Oligosita brunnea Lin 暗褐寡索赤眼蜂 (Lin,1994:143, 287)
Oligosita brunnea Lin, 1994:143-144.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山桐木)。

Oligosita curtifuniculata Lin 短索寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:148, 287)

Oligosita curtifuniculata Lin, 1994:148.

寄 主：

分 佈：福建(福州、將樂)。

Oligosita curvata Lin 彎管寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:152, 287)

Oligosita curvata Lin, 1994:152.

寄 主：

分 佈：福建。

Oligosita curvialata Lin 彎翅寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:151, 287)

Oligosita curvialata Lin, 1994:151.

寄 主：

分 佈：福建(將樂龍棲山)。

Oligosita cycloptera Lin 圓翅寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:156, 287)

Oligosita cycloptera Lin, 1994:156-157.

寄 主：

分 佈：福建(福州、將樂)。

Oligosita dolichosiphonia Lin 長管寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:165, 288)

Oligosita dolichosiphonia Lin, 1994:165-166.

寄 主：稻田昆蟲。

分 佈：福建(福州金山)

Oligosita elongata Lin 長索寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:161, 288)

Oligosita elongata Lin, 1994:161-162.

寄 主：

分 佈：福建(福州)、北京、遼寧。

Oligosita erythrina Lin 紅色寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:135, 288)

Oligosita erythrina Lin, 1994:135-136.

寄 主：

分 佈：福建。

Oligosita flavoflagella Lin 黃角寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:159, 289)

Oligosita flavoflagella Lin, 1994:159-160.

寄 主：

分 佈：福建。

Oligosita glabriscutata Lin 光盾寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:155, 289)

Oligosita glabriscutata Lin, 1994:155-156.

寄 主：

分 佈：福建(寧化)。

Oligosita grandiocella Lin 大眼寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:160, 290)

Oligosita grandiocella Lin, 1994:160-161.

寄 主：

分 佈：福建。

Oligosita introflexa Lin 彎緣寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:150, 291)

Oligosita introflexa Lin, 1994:150-151.

寄 主：

分 佈：福建。

Oligosita japonica Yashiro日本寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:146, 291)

Oligosita japonica Yashiro, 1979:199.

寄 主：

分 佈：福建、江西、遼寧；日本。

Oligosita krygeri (Girault) 腫脈寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:164, 291)

=*Chaetostricha pulchra* Kryger, 1918:309-310.

Chaetostricha krygeri Girault, 1929:4. (New name for *pulchra* Kryger, 1918, preoccupied).

=*Oligosita fomosa* Nowicki, 1935:595. (Unnecessary new name for *pulchra* Kryger, 1918).

=*Chaetostricha aurulenta* Doutt, 1951:308.

Oligosita krygeri, Doutt et Viggiani, 1968:539.

寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑葉蟬(卵)

Tettgella viridis 大青葉蟬(卵)。

分 佈：福建、江西、北京、遼寧；日本、蘇聯、意大利、法國、波蘭、丹麥。

Oligosita longialata Lin 長翅寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:142, 292)

Oligosita longialata Lin, 1994:142-143.

寄 主：

分 佈：福建(福州)、北京、遼寧。

Oligosita longicornis Lin 長角寡索赤眼蜂 (Lin,1994:161, 292)

Oligosita longicornis Lin, 1994:161.

寄 主：

分 佈：福建。

Oligosita macrothoracica Lin 長胸寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:138, 292)

Oligosita macrothoracica Lin, 1994:138.

寄 主：

分 佈：福建(福州)。

Oligosita mediterranes Nowicki 歐洲寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:149, 293)

Oligosita mediterranes Nowicki, 1935:593.

寄 主：
分 佈：福建、江西、廣東、湖北、北京、遼寧；以色列、希臘、意大利、法國等地。

Oligosita naias Girault (Lin, 1994:293)
Oligosita naias Girault, 1938:384.
寄 主：*Nephotettix nigroppictus* (Stål) 原黑尾葉蟬(卵)
Nepphotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛虱(卵)
Sogatella furcifera (Horváth) 白背飛虱(卵)。
分 佈：臺灣；菲律賓、泰國、印度、澳洲。

Oligosita nephotettica Mani 葉蟬寡索赤眼蜂 (He et al., 1991:54; Liao et al., 1987:208; Lin, 1970:191; Lin,:1974:94, 97; 1981:154, 293; Luo et Zhuo, 1983:61; Mao et al., 1999, 21(1):45-47; Sheng, 1989:95; Zhang, 1987[ed.] 2:85)
Oligosita nephotetticum Mani, 1939:92.
寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬(卵)
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(卵)
Nephotettix spp. 黑尾葉蟬(卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)
Laodelphax striatellus (Fallén) 斑飛蝨(卵)
飛蝨(卵)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、安徽、湖北；日本、印度。

Oligosita nigroflagellaris Lin 黑角寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:147, 293)
Oligosita nigroflagellaris Lin, 1994:147-148.
寄 主：
分 佈：福建、江西。

Oligosita platyoptera Lin 寬翅寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:166, 295)
Oligosita platyoptera Lin, 1994:166-167.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山、將樂)。

Oligosita polioptera Lin 灰翅寡索赤眼蜂 (Lin, 1994 133, 144)
Oligoista polioptera Lin, 1994:144.
寄 主：
分 佈：福建、湖北、遼寧。

Oligosita rubida Lin 微彎寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:136, 295)
Oligosita rubida Lin, 1994:136-137.
寄 主：
分 佈：福建。

Oligosita shibuyae Ishii 長突寡索赤眼蜂 (He et al., 1991:54; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Liao et al., 1987:209; Lin,

1970:187; 1970:191; Lin,:1974:94, 97; 1981;139, Luo et Zhou, 1983:61; 296; Mao et al., 1999, 21(1):45-47; Sheng, 1989:94; Sun et al., 1984:110)

Oligosita shibuyae Ishii, 1938:180.

寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑葉蟬(卵)

Nephotettix spp. 黑尾葉蟬(卵)

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)

Sogatodes furcifera Horváth 白背飛蝨(卵)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、北京、遼寧；日本。

Oligosita sparsiciliata Lin 稀毛寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:139, 296)

Oligosita sparsiciliata Lin, 1994:139-140.

寄 主：

分 佈：福建(福州)、遼寧。

Oligosita spiniclavata Lin 刺角寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:157, 296)

Oligosita spiniclavata Lin, 1994:157-158.

寄 主：

分 佈：福建(福州)。

Oligosita stenostigma Lin 窄痣寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:163, 297)

Oligosita stenostigma Lin, 1994:163-164.

寄 主：

分 佈：福建。

Oligosita transiscutata Lin 橫盾寡索赤眼蜂 (Lin, 1994:167, 297)

Oligosita transiscutata Lin, 1994:167-168.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山)。

Oligosita yasumatsui Viggiani et Subba Rao 飛蝨寡索赤眼蜂 (He et al., 1991:54; Liao et al., 1987:208; Lin, 1994:153, 298; Sun et al., 1980(4):22)

Oligosita yasumatsui Viggiani et Subba Rao, 1978:5.

Oligosita sp. He et Pang, 1986:112. Pang et Chen, 1987:208-209.

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)

Sogatodes furcifera Horváth 白背飛蝨(卵)

Nephotettis cincticeps (Uhler) 僞尾葉蟬(卵)

Nephotettix nigropictus (Stål) 原黑尾葉蟬 (卵)

Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(卵)。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、四川、湖北；馬來西亞、泰國。

Oligosita sp. (Luo et Zhuo, 1983:61; Sheng, 1989:95)

Oligosita sp. Luo et Zhuo, 1983:61.

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål)· 褐飛蝨(卵)

葉蟬。
分 佈：福建、江西。

Oligosita sp. (Mao et al., 1999, 21(1):46)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)。
分 佈：廣東。

Oligosita sp. (Mao et al., 1999, 21(1):46)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)。
分 佈：廣東。

Oligosita sp. (Chen et Chiu, 1983:287)
Oligosita sp., Chen et Chiu, 1983:287.
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉蟲(卵)。
分 佈：臺灣。

Ophion luteus (Linnaeus) 夜蛾瘦姬蜂 (Wang et Yao, 1992:646)
寄 主：小地老虎
大地老虎
桑夜蛾
夜蛾。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、西藏、浙江、江蘇、山東、山西、河北、青海、新疆；蒙古、蘇聯、日本、印度、錫金、非洲、歐洲、北美。

Ophioneurus lateralis Lin 側腹曲脈赤眼蜂 (Lin, 1994:119, 299)
Ophioneurus lateralis Lin, 1994:119-120.
寄 主：
分 佈：廣西。

Ophioneurus longicostatus Lin 長脊曲脈赤眼蜂 (Lin, 1994:120, 299)
Ophioneurus longicostatus Lin, 1994:120-121.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山黃崗山)。

Ophioneurus nullus Lin 無突曲脈赤眼蜂 (Lin, 1994:121, 299)
Ophioneurus nullus Lin, 1994:121-122.
寄 主：
分 佈：福建。

Paracentrobia (Brachistella) andoi (Ishii) 褐腰赤眼蜂 (He et al., 1991:54; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Liao et al., 1987: 209; Lin, 1970:187; 191; Lin,:1974:94, 96; 1981:171, 300; Lin et Kuo, 1970:192; Mao et al., 1999, 21(1):46; Sheng, 1989:94; Sun et al., 1980(4):22; Wu et al., 1982:36-38; Zhang, 1987[ed.] 2:85; Zhao, 1986:126)
Japania andoi Ishii, 1938:179.
=*Japania fasciata* Ishii, 1938:180.

寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬(卵)
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(卵)
Nephatettis spp. 黑尾葉蟬 (卵)
Delpphacodes sameshimai 葉蟬 (卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)
飛蝨(卵)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南；朝鮮、日本、菲律賓、泰國。

Paracentrobia (s. str.) **fusca** Lin 褐色鄰赤眼蜂 (Lin, 1994:173, 301)
Paracentrobia (s. str.) *fusca* Lin, 1994:173-174.
寄 主：
分 佈：福建、湖北。

Paracentrobia (s. str.) **yasumatsui** Subba Rao 六斑鄰赤眼蜂 (Lin, 1994:174, 304)
Paracentrobia (s. str.) *yasumatsui* Subba Rao, 1974:1-3.
寄 主：*Nephotettix nigropictus* (Stål) 原黑尾葉蟬(卵)
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬(卵)
Recilia dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬(卵)
Balclutha sp. 葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)
Sogatella furcifera (Horváth) 白背飛蝨(卵)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(卵)。
分 佈：福建、湖北、北京、遼寧；泰國。

Paracentrobia (Abbella) sp. 竹盾蚧赤眼蜂 (Huo et al., 1990:167; Sheng, 1989:94)
寄 主：*Kuwanaspis pseudoleucaspis* (Kuwana) 竹長白蚧。
分 佈：福建、江西、浙江、江蘇、安徽。

Paramegaphragma stenopterum Lin 窄翅長纓赤眼蜂 (Lin, 1994:67, 305)
Paramegaphragma stenopterum Lin, 1992:134-135.
寄 主：
分 佈：福建(福州、福安)。

Paramegaphragma macrostigmum Lin 顯痣長纓赤眼蜂 (Lin, 1994:68, 305)
Paramegaphragma macrostigmum Lin, 1992:135-136.
寄 主：
分 佈：福建(福州)、廣東(廣州)。

Poropoea brevituba Lin 短管圓翅赤眼蜂 (Lin, 1994:191, 307)
Poropoea brevituba Lin, 1994:191-192.
寄 主：一種鉗顎象甲(卵)。

分 佈：福建(將樂)。

Poropoea duplicata Lin 疊棒圓翅赤眼蜂 (Lin, 1994:192, 307)

Poropoea duplicata Lin, 1994:192-193.

寄 主：

分 佈：福建(南靖)。

Poropoea longicornis Viggiani 長角圓翅赤眼蜂 (Lin, 1994:193, 307)

Poropoea longicornis Viggiani, 1968:253-255.

寄 主：一種鉗顎象甲(卵)。

分 佈：福建(武夷山、將樂)、江蘇(蘇州)。

Poropoea morimotoi Hirose 日本圓翅赤眼蜂 (Lin, 1994:194, 308)

Poropoea morimotoi Hirose, 1963:30-33.

寄 主：*Apoderus balteatus* 卷葉象甲(卵)
Apoderus erythrogaster 卷葉象甲(卵)
Appoderus rubidius 卷葉象甲(卵)
Cycnotrachelus nitens 卷葉象甲(卵)
Henicolabus lewisii 卷葉象甲(卵)
Paracentrocorynus nigricollis 卷葉象甲(卵)
Paratrachclophorus longicornis 卷葉象甲(卵)
Paroplappoderus vanvolxeme 卷葉象甲(卵)
Phialodes rufipennis 卷葉象甲(卵)
Phymetapoderus pavens 卷葉象甲(卵)。

分 佈：福建、雲南、湖北、遼寧；日本。

Poropoea tomapoderus Luo et Liao 榆卷葉象赤眼蜂 (Luo et Liao, 1994:490)

Poropoea tomapoderus Luo et Liao, 1994:490-492.

寄 主：*Tomapoderus ruficollis* 榆卷葉象。

分 佈：北京。

Prestwichia multiciliata Lin 毛足窄翅赤眼蜂 (Lin, 1994:124, 309)

Prestwichia multiciliata Lin, 1993:97-98.

寄 主：

分 佈：福建(福州、壽寧)。

Probrachista sp. 窄翅赤眼蜂 (Lin, 1994 1981:438)

Probrachista Sp. Lin, 1981:438.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Prochaetostricha monticola Lin 山棲前毛赤眼蜂 (Lin, 1994:199, 310)

Prochaetostricha monticola Lin, 1981-432-435.

寄 主：
分 佈：臺灣。

Prosoligosita perplexa Hayat et Husain 印度四棒赤眼蜂 (Lin, 1994:89, 310)
Prosoligosita perplexa Hayat et Husain, 1981:81-83.
寄 主：
分 佈：福建；印度。

Pterygogramma breviclavatum Lin 短棒長脈赤眼蜂 (Lin, 1994:103, 311)
Pterygogramma breviclavatum Lin, 1994:103-104.
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Pterygogramma longius Lin 長角長脈赤眼蜂 (Lin, 1994:104, 311)
Pterygogramma longius Lin, 1994:104-105.
寄 主：
分 佈：福建。

Pterygogramma rotundum Lin 圓臉長脈赤眼蜂 (Lin, 1994:103, 312)
Pterygogramma rotundum Lin, 1994:103.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山)。

Trachocera sp. 葉甲赤眼蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:85)
寄 主：梨葉甲(卵)。
分 佈：江西。

Trichogramma achaeae Nagaraja et Nagarkatti 暖突赤眼蜂 (Lin, 1987:99; Lin, 1994:56, 313)
Trichogramma achaeae Nagaraja et Nagarkatti, 1969:396.
寄 主：*Achaea janata* 苧麻紅褐夜蛾(卵)
Helcoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(卵)
Achroia grisella 蠟螟(卵)
Herse convulvuli 甘薯天蛾(卵)
另尚寄生：*Corcyra cephalonica* Stainton 外米綴蛾
Earias insulana 燈蛾
Earias vitella 燈蛾
Pectinophora gossypiella Saunders 紅鈴蟲
Tiracola plagiata 夜蛾。
分 佈：福建；印度。

Trichogramma agriae Nagaraja 旋花天蛾赤眼蜂 (Lin, 1987:98; Lin, 1994:55, 314)
Trichogramma agriae Nagaraja, 1973:277.
寄 主：*Agrius convolvuli* 白薯天蛾(卵)

Corcyra cephalonica Stainton 外米綴蛾(卵)。
分 佈：福建；印度。

Trichogramma agrotidis 地老虎赤眼蜂 (Li et al., 1983:1-5)
Trichogramma agrotidis
寄 主：
分 佈：
附 註：國外引進。

Trichogramma artonae Chen et Pang 斑蛾赤眼蜂 (Chen et Pang, 1986:89; Huo et al., 1990:164; Lin, 1994: 57, 314)
Trichogramma artonae Chen et Pang, 1968:89-90.
寄 主：*Artona funeralis* Butler 黃紋竹斑蛾(卵)。
分 佈：湖南

Trichogramma australicum Girault 澳洲赤眼蜂 (ASZI, et al., 1978:103, Lin, 1994:314; Pang et Chen, 1974:444; 1980(1):22)
Trichogramma australicum Girault, 1912:109-110.
寄 主：夜蛾科、燈蛾科、小捲葉蛾科、捲蛾科、細蛾科、螟蛾科、弄蝶科：
已有記錄寄主：
Achaea janata
Cactoblastis caetorym
Calaptilia sp.
Carpocapsa pomonella
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Diatraea saccharelis
Helicoverpa armiger (Hübner) 棉鈴蟲
Proceras sacchariphagus 蔗螟。
分 佈：湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、陝西、河南、河北、遼寧；東洋區、澳洲、巴布亞新幾內亞、美國、千里達。
附 註：本種在我國分佈有問題。

Trichogramma cacoeciae Marchal 孤雌赤眼蜂 (Li et Zhang, 1980(4):31-36; Li et al., 1983:1-5; Liu et Wu, 1980(1):57; Pu, 1987:60)
別 名：*卷蛾赤眼蜂*。
寄 主：
分 佈：
附 註：1979 年由德國引進。

Trichogramma chilonis Ishii 螟黃赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:363; Chan et Chou, 1000 (2):136; Chen, 1956(4):15-16; Chen, 1990:358; Chen, 1989:49; Chen et Chiu, 1983:187; 1984:128; 1985:207-212; 1986:99-106; Chen et Chur, 1948, 2:21-36; Chen et al., 1992:187-194; Chen et Luo, 1990:81; Chen et Peng, 1998:135-140; Chen et Wu, 1980(1):44-48; Chen et al., 1994:58; Chen et al., 1993:143; Chen et al., 1999, 15(3):122; Cheng, 1986:41-58; Cheng et al., 1976:415; Cheng et al., 1978, 80:21-36; Cheng et al., 1978:301; Chien et al., 1984:186; Chiu et Chen, 1986:23-30; Chiu et Chou, 1976:238; Chiu eet Lo, 1985:5; Chou et al., 1994:328; Chu et Lee,

1990:357; 1991:214-226; Chu et al., 1994:53-64; Dai, 1992:42; Feng et Wu, 1987, :362-364; Feng et al., 1995, :64; Feng et al., 1997, 13(1):6-9; Feng et al., 1999, 15(3):97-99; Gou, 1985, 7(4):192-200; Gou, 1986:113; Guo et Zhu, 1996, 18(1):7-12; He et al., 1991:54; Guangtung, 1974:269-280; Guangxi, 1974:129-134; Guo et Zhu, 1996, 18(1):7-12; Hu, 1956:235-245; Guo et Zhang, 1993, 15(2):51-59; Hu, 1983:288; Hu et Wu, 1987:187; Huang, 1984:118-120; Huang, 1990[ed.]:198-201; Huang et al., 1995:13-17; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Huo et al., 1990:162; Huo et al., 1991:19-21; Jiang et Yeh, 1985:450-451; Jiang et al., 1999, 15(3):146; Kao et Tseng, 1984:431-432; 1987:163; Lee et Chu, 1989:312; Lee et Li, 1988:346-350; Li, 1981(1-2):34-36; Li, Li, 1982, 19(5):17-20; 1987, 3(3):127-128; Li, 1989:91; Li, 1991, 18(3):235-239; Li, 1992, 14(1):25-29; Li et Chu, 1992:246-255; Li et Zhang, 1980(3):1-4; Li et al., 1983:1-5; Li et al., 1986, (1):29-31; Li et al., 1989:31-35; Li et al., 1991, 13(2:51-53; Li et al., 1997, 13(4):184; Li et al., 1999, 21(4):152-155; Liao et al., 1987:201; Lin, 1987:99;Lin,:48, 317; Liu 1987:148;Liu et Wang, 1982:25; Liu et Wu, 1982:160-163; Liu et al., 1985(3):2-5; Liu et al., 1987, 5(1,2):49; Liu et al., 1987, 5(1,2):51; Liu et al., 1988, 4(4):145-148; Liu et al., 1988:165; Liu et al., 1988, 15(4):265-272; Liu et al., 1992:61-63; Liu et al., 1996, 18(1):23-25; Liu et al., 1998, 14(3):139-140; Lo et Chen, 1995:368; Lo et Wu, 1989:182; Lu et Long, 1979:16-24; Nan et al., 1987:125; Pang, 1985:41; Pang et Chen, 1980(1):33, 34; Pu et al., 1955:1-35; Pu et al., 1981(3):6-9; Qian et Chao, 1981(4):2; Qu et Nie, 1991:57; Ren, 1982 4(3):42-45; She et He, 1988:6; Shen, 1986:80; Shen et Li, 1987:136-137; Shen et al., 1992:101-103; Sheng, 1989:95; Shi, 1980[ed.]:119-121; Song et al., 1982 4(4):16-18; Song et al., 1985(4):40; Song et al., 1991:89; Su et al., 1986:36; Sun et al., 1980(4):22; Tong, 1981(3):34; Tseng et Kao, 1987:170-171; Wang, 1996, 22(1):8-10; Wang et Yan, 1980(3):18-23; Wang et al., 1985, 7(1):13-17; Wei, 1987:78-80; Wu-xing,(ASRI), 1979:47-51; Xia, 1957:296; Xiao, 1985(2):26; Xie, 1993, 9(1):20; Xie et Zhu, 1989:77-81; Xie et al., 1999, 21(2):86; Xu et Zhang, 1989:136-138; Yang et al., 1996, 18(3):109-111; Zhang, 1981(3):14-18; Zhang, 1984:28-38; Zhang, 1987[ed.] 2:85; Zhang, 1989:48-51; Zhang, 1996, 18(3):121-123; Zhang, 1997, 19(1):11-14; Zhang, 1999, 21(4):150-151; Zhang et Lin, 1995, 17(3):125-127; Zhang et Pang, 1995, 2:84-87; Zhang et You, 1980(1):52; Zhang et Zhao, 1986:215-219; Zhang et al., 1990:50; Zhang et al., 1996(4):14; Zhao, 1986:126; Zhao, 1988:90; Zhong et Zhang, 1989:101-103; Zhou, 1985, 7(2):63-69; Zhou et al., 1983:150-157; Zhou et al., 1995:65; Zhu, 1981(1-2):86; Zhu et Zhang, 1987:111-114; Zhong et Zhang, 1992:145-147; Zong et al., 1981(1-2):82)

Trichogramma chilonis Ishii, 1941:169-176.
=*Trichogramma australicum*, Nagarkatti et Nagaraja, 1971:13-31. Misidenrif.
=*Trichogramma confusum* Viggiani, 1976:182-183.

別 名：*擬澳洲赤眼蜂*。

寄 主：鱗翅目的夜蛾科、天蛾科、燈蛾科、捲蛾科、細蛾科、螟蛾科、枯葉蛾科、弄蝶科等16 科 60 種多卵(Lin, 1994:317-319)，包括：

Leguminivora glycinivorella Matsumura 大豆食心蟲
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Scirpophaga nivella (Fabricius) 白螟
Chilo sacchariphaga (Bojer) 條螟
Tetraomoera schistaceana (Snellen) 黃螟
Chilo hyrax 棘禾草螟(荻蘆)
Chilo infuscatellus (Snellen) 二點螟
Diaphania indica Sauders 瓜螟
Hedylipta indicata (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)
Algedonia coclesalis Walker 竹織葉野螟
Adoxophyes orana 蘋果捲葉蛾
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
Lithacodia disinguenda Staudomger 條紋螟蛉
Creatonotus transiens 八點灰燈蛾
Spilarctia obligua 塵白灰燈蛾

Corcyra cephalonica (Stainton) 米蛾
Euproctis flavinata 星黃毒蛾
Porthesia kurosawai 戟盜毒蛾
Cophoprora sp. 肉桂雙瓣捲蛾
Homona coffearia (Nietner) 褐帶長捲蛾
Polychrosis cunninghamiacola Lin et Pei 杉梢小捲蛾
擬小黃捲蛾
Ectropis obliqua Warren 茶尺蠖
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲
黃地老虎
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Pectinophora gossypiella (Saunders) 紅鈴蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
鳥咀夜蛾
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶
Simyra albovenosa (Goeze) 稻毛蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Sogatodes furcefera (Horváth) 白背飛蝨
Ampittia dioscorides 小黃斑弄蝶
Parnara ganga Evans 曲紋稻苞蟲
Parnata guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Parnara naso bada (Moore) 么紋稻苞蟲
Pelopidas mathias oberthueri Evans 隱紋稻苞蟲
Potanthus confucius angustatus (Matsumura) 弄蝶
Telicota bambusae horisha Evans 弄蝶
Udaspes folus Cramer 蝶
Papilo demoleus libanius Fruhstorfer 鳳蝶
Papilo memnon heronus Fruhstorfer 鳳蝶
Papilio xuthus Linnaeus 鳳蝶
Princeps demoleus 蝶
Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、遼寧、吉林；日本、菲律賓、越南、泰國、印度、巴基斯坦等東洋區其它國家。

Trichogramma choui Chan et Chou 根清毛小蜂 (Chan et Chou, 2000 (2):138-140)

Trichogramma choui Chan et Chou, 2000, (2):138-140.
寄 主：*Ariadne ariadne pallidior* (Fruhstorfer) 波蛺蝶。
分 佈：臺灣。

Trichogramma closterae Pang et Chen 舟蛾赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:363; ASZI et al., 1978:103; Chen, 1989:49; Gou,

1986:113; He et al., 1991:54; Huang, 1984:118-120; Huang, 1990[ed.]:198-201; Huang et al., 1994, 16(4):156-159; 1995:13-17; Huang et al., 1996, 23(3):209-212; Huo et al., 1990:166; Liao et al., 1987:201; Li et al., 1983:1-5; Lin,:47, 319; Pang, 1985:42; Pang et Chen, 1974:444; Qian et Chao, 1981(4):2; Shen et al., 1992:101-103; Tian et al., 1993, 15(4):156; Tian et al., 1998, 14(4):186; Tian et al., 1998, 20(3):106-111; Wu et Chen, 1980(4):45; Xia, 1980(1):7-16; Xiao, 1985(2):26; Yang et Li, 1984:219-226; Yunn., 1987:1309; Zhang, 1984:23-28; Zhang et You, 1980(1):52; Zhang et al., 1990:50; Zhou, 1985:63-69)

Trichogramma closterae Pang et Chen, 1974:444-445.

寄 主：(Lin, 1994 :319)

Cerura erminea menciana Moore 楊二尾舟蛾(卵)
Clostera anachoreta (Fabricius) 楊扇舟蛾(卵)
Clostera anastomosis (Linnaeus) 分月舟蛾(卵)
Micromelalopha trogzodyta Graeser 小楊天社蛾 (卵)
Monema flavescens (Walker) 黃刺蛾
Gastropacha quercifolia (Linnaeus) 櫟枯葉蛾(卵)
Smerinthus caecus Menetries 柳灰天蛾(卵)
Smerinthus planus Walker 柳天蛾(藍目天蛾)(卵)
Euproctis similis Fueessllly 盜毒蛾(卵)
Leucoma candida Staudinger 柳毒蛾(卵)
Stilpnotia salicis (Linnaeus) 柳毒蛾(卵)
Parum colligata saturata Clark 构星天蛾(卵)
Gastropacha quercifolia Linnaeus 李枯葉蛾(卵)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵)
Algedonia coclesalis Walker 竹織葉野螟
Corcyra cephalonica (Stainton) 米蛾
Dendrolimus punctatus Walker 松毛蟲
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞玉米螟(卵)
Actia aelene ningpoana Felder 水青蛾
Antheraea pernyi (Guerin-Meneville) 柞蠶
Philosamia cynthia ricini Donovan 蓖麻蠶
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Agrotis ypsilon Rottemberg 小地老虎
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(卵)
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶(卵)。

分 佈：雲南、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧、黑龍江(海林)。

Trichogramma dendrolimi Matsumura 松毛蟲赤眼蜂 (AAS, Zheng-zhou Fruit Res. Inst., 1987:398-401; ASZI, 1987, 2:363; ASZI, et aL 1978:103; Chan et Chou, 2000, (2):140; Chen, 1989:49; Chen et Luo, 1990:81; Chen et al., 1993:143; Chen et al., 1994:58; Cheu, 1955:181; Chou et al., 1994:328; Chu, 1955:379-383; Dai, 1992:42; Dai et al., 1990:319-322; Du, 1987, 5(1,2):18; Famg. 1993:184-185; Feng et Zhang, 1988:344-347; Feng et al., 1977:253-258; Feng et al., 1985:5-12; Feng et al., 1985:31-32; Feng et al., 1988:152-154; Feng et al., 1989:56-59; Gou, 1986:113; Guan et al., 1978:122-126; Guangtung, 1974:269-280; Guangxi, 1974: 129-134; Guo, 1992, 14(1):6-12; 1992, 14(4):158-165; 1993, 15(2):51-59; Guo et Zhang, 1993, 15(2):51-59; Guo et Zhu, 1996, 18(1):7-12; Han et al., 1993:10-13; Han et al., 1994, 16(2):73-76; He et al., 1988:22; He et al., 1990:66-70; He et al., 1991:54; Hou et al., 1990:162; Hsia, 1982:167-172; Hsia et Wang, 1979:30-33; Huang, 1990[ed.]:198-201; Huang et Gao, 1996:184; Hubei CRGAHET,

1979:301-309; Huang. 1984:118-120; Huang et al., 1995, 17(3):106-108; Kong et al., 1988:50-54; Lee et Lee, 1981, 8(3):215-216; Li, 1986:238-241; Li, 1992, 18(3):58-60;Li et Zhang, 1980(3):1-4; Li et al., 1983:1-5; Li et al., 1989:31-35; Li et al., 1989:89; Li et al., 1999, 21(4):152-155; Liang, 1991, 13(4):171-174; Liao et al., 1987: 200; Lin, 1987:99; Lin,:46, 320; Lin et Hu, 1985:10; Liu, 1987:148; Liu et He, 1991, 28:103-105; Liu et Wang, 1982:25; Liu et Wu, 1982:160-163; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Liu et al., 1957:48; Liu et al., 1979, 6(2):17-24; Liu et al., 1988:145-148; Liu et al., 1990:148-150; Liu et al., 1993, 15(3):112-115; Liu et al., 1994, 10(4):145-150; Liu et al., 1998, 14(3):139-140; Lu, 1991:46; Lu et al., 1979:361-363; Pang, 1985:44; Pang et Chen, 1974:444; Peng et al., 1984:39-47; Pu et al., 1981(3):6-9; Qian et Chao, 1981(4):2; Qiu, 1990, 12(3):116-122; Qiu et al., 1990:116-122; 1995 1-6; Qiu et al., 1999, 21(2):49-54; Shen et Li, 1987:136-137; Shen et al., 1991:141; Shen et al., 1992:101-103; Sheng, 1989:95; Shi, 1980[ed.]:119-121; Shi et al., 1982 4(4):1-8; Shi et al., 1993, 9(2):60-62; Shi et al., 1993, 9(3):97-101; Shi et al., 1994, 10(1):1-6; Shi et al., 1994, 13(4):328-333; Shu et Yu, 1985:93; Song et al., 1982 4(4):16-18; Song et al., 1985(4):40; Su et al., 1986:36; Sun et Liu, 1958:235; Tian et al., 1995, 21(4):26-27; Tong, 1981(3):34; Tong et al., 1988:118-122; Tseng, 1965:407; Wang, 1990:173; Wang, 1996, 22(1):8-10; Wang et Yan, 1980(3):18-23; Wang et Zhang, 1984:207-210; Wang et al., 1985(4):2-7; Wang et al., 1985:13-17; Wang et al., 1989:43; Wang et al., 1991:22-23; Wang et al., 1995, 21(6):39-42; Wu, 1993:182-183; Wu, 1994:352-353; Wu et Qin, 1982:363-372; Wu et al., 1980:232; Wu et al., 1989:145-155; Wu et al., 1994:237-240; Xia, 1957:297; Xiao, 1985(2):26; Xie et Zhu, 1989:77-81; Xu et He, 1994, 10(2):49-51; Xu et Liu, 1993, 9(2):54-59; Xu et al., 1993, 9(2):54-59; Xu et al., 1993, 10(2):49-51; Yang et Gu, 1995:229; Yang et al., 1996, 18(3):109-111; Yuan, 1985:129-132; Zhang, 1987[ed.] 2:85; Zhang, 1993, 15(3):101-105; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22; Zhang et Shu, 1995:64-67; Zhang et Xu, 1991:175-177; Zhang et You, 1980(1):52; Zhang et al., 1990:50; Zhang et al., 1990:107-109; Zhang et al., 1991, 13(4):175-177; Zhao, 1986:126; Zhao et Huang, 1990:186-187; Zhou, 1985:63-69; Zhou et Zhang, 1995, 21(3):44-45; Zhou et al., 1983:150-157; Zhu, 1981(1-2):86)

Trichogramma dendrolimi Matsumura, 1926:45.

寄 主：枯葉蛾科、夜蛾科、小捲蛾科、麥蛾科、燈蛾科、大蠶蛾科、毒蛾科、螟蛾科、刺蛾科、天蛾科、舟蛾科、尺蛾科、弄蝶科、鳳蝶科、灰蝶科等 16 科 80 種害蟲卵(Lin,:320-322)，包括：

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲(卵)
Dendrolimus spectabilis (Butler) 赤松毛蟲(卵)
Dendrolimus tatulaefornis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)
Lampronadata cristata (Butler) 黃二星舟蛾(卵)
Phalere assimilis (Bremer et Grey) 櫟掌舟蛾(卵)
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(卵)
Chilo hyrax 棘禾草螟(卵)(荻蘆)
Chilo lutellus 蘆螟(卵)
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(卵)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵)
Diaphania indica (Saunders) 瓜螟(卵)
Algedonia coclesalis Walker 竹織葉野螟(卵)
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟(卵)
Adoxophyes orana 蘋果小捲蛾(卵)
Homona coffearia 褐帶長捲蛾(卵)
擬小黃捲蛾(卵)
棗尺蠖
Buzura suppressaria Guenée 油桐尺蛾(卵)
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(卵)
Malacosoma neustria testacea Motschulsky 天幕毛蟲
Micromelalopha troglodyta 楊小舟蛾(卵)

Marumba gaschkewitschi 桃天蛾(卵)
Agrotis ypsilon (Rottemberg) 小地老虎(卵)
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(卵)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(卵)
Creatonotus transiens 八點灰燈蛾(卵)
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(卵)
Erionota torus 香蕉弄蝶(卵)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(卵)
Papilio spp. 橘鳳蝶(卵)
Oulema oryzae (Kuwayama) 稻負泥蟲(卵)
Cydia moleslta (Busck) 梨小食(桃折心螟) (卵)
桃蛀螟(卵)
Adoxophyes orana 茶小捲蛾(卵)
Homona magnanima Diakonoff 茶捲蛾(卵)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林、大興安嶺北部、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、東洋區。

Trichogramma dendrolimi liliyingae Voegele, et al. (Lin, 1994:322)

Trichogramma dendrolimi liliyingae Voegele, et al., 1984:369-370.

寄 主：*Ephestia kuehniella* 螟蛾(卵)。

分 佈：北京。

Trichogramma embryophagum (Hartig) (Chen, 1994:293-299; Gou, 1986:113; Lin, 1994:322; Pang et Chen, 1980(1):35; Tseng, 1965:407)

Encyrtus embryophagus Hartig, 1838:250.

寄 主：多達 30 餘種(Lin, 1994:322-323)。

分 佈：中國；蘇聯、希臘、捷克、波蘭、法國，本種爲古北區種類。

Trichogramma euproctidis (Girault) 暗黑赤眼蜂 (ASZI et al., 1978:106, Gou, 1986:113; Lin, 1994:323; Pang et Chen, 1974:449; Shansi 1978: 103-107; Zhang, 1981(3):14-18)

寄 主：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲
Agrotis segetum (Denis et Schiffermüller) 黃老虎。
據記載：(Lin, 1994:323-324)
夜蛾科
毒蛾科
螟蛾科

分 佈：江蘇、山西；蘇聯、波蘭、意大利、法國。

Trichogramma evanescens Westwood 廣赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:364; ASZI et al., 1978:105; Feng et al., 1985:10; Gou, 1986:113; He et al., 1991:55; Hu, 1983:288; Huo et al., 1990:163; Huo et al., 1991:19-21; Lee, 1960:339-354; Li, 1961, 10(4-6):339-354; Li et al., 1983:1-5; Liao et al., 1987:202; Lin,:52, 324-328; Liu et Wu, 1980(1):57; Pang et Chen, 1974:447; 1980(1):35; Pu, 1987:60; Shen et al., 1992:101-103; Shi, 1980[ed.]:119-121; Wang, 1990:174; Wang, 1996, 22(1):8-10; 1Wang et Yan,

1980(3):18-23; Wang et al., 1995, 21(6):39-42; Wu et Chen, 1980(4):45; Xiao, 1985(2):26; Xie et al., 1999, 21(2):86; Yang et al., 1996, 18(3):109-111; Yin et al., 1989:90; Ying et al., 1990:141; Zhang et al., 1990:50; Zhao, 1988:90; Zhao et al., 1986:42; Zheng et Li, 1983:6-9; Zhong, 1985(4):42)

Trichogramma evanescens Westwood, 1833:444.

=*Trichogramma vitripennis* Walker, 1851:211.

=*Trichogramma rhenaana* Voegele et Russo, 1981:536.

寄 主：21 科 180 多種昆(卵)(Lin, 1994:324-328)

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟

Lampronadata cristata (Butler) 黃二星舟蛾

Phalere assimilis (Bremer et Grey) 櫟掌舟蛾

Mamestra brassicae (Linnaeus) 甘藍夜蛾

夜蛾科

Pieris rapae (Linnaeus) 菜粉蝶

Papilio polytes Linnaeus 玉帶鳳蝶。

據記載：菜蛾科

螟蛾科

卷蛾科

燈蛾科

夜蛾科

鳳蝶科

食蚜蠅科

分 佈：湖南、湖北、陝西、山東、山西、北京、內蒙古、遼寧、吉林；西北亞洲、古北區、埃及、廣佈歐洲、美國(引進)。

附 註：國外引進。

Trichogramma eziguum Pinto et Platner 擬暗褐赤眼蜂 (Zhang et al., 1990:50)

寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟(卵)。

分 佈：遼寧。

Trichogramma fasciatum (Gou, 1986:113)

寄 主：

分 佈：中國。

Trichogramma forcipiformis Zhang et Wang 鋏突赤眼蜂 (Gou, 1986:113; Lin, 1994:61, 328; Pang, 1985:46; Zhang et Wang, 1982: 50; Zhang et al., 1990:50)

Trichogramma forcipiformis Zhang, et Wang, 1982:50.

寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟(卵)。

分 佈：遼寧(鐵嶺)。

Trichogramma fuzhouense Lin 福州赤眼蜂 (Lin, 1994:62, 329)

Trichogramma fuzhouense Lin, 1994:62.

寄 主：

分 佈：福建(福州)。

Trichogramma ivalae Pang et Chen 毒蛾赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:363; ASZI et al., 1978:102; Chen, 1989:49; Gou, 1986:114; He et al., 1991:55; Huo et al., 1990:165; Liao et al., 1987:200; Lin, 1994:46, 329; Pang, 1985:44; Pang et Chen, 1974:443; Zhang et al., 1990:50)

Trichogramma ivalae Pang et Chen, 1974:443-444.

寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟(卵)
Callambullyx tatarinovii Bremer et Grey 榆綠天蛾(卵)
Clostera anachoreta 舟蛾
Cnidocampa flavescens (Walker) 黃刺蛾(卵)
Ivala ochropoda Eversman 榆毒蛾(卵)
Leucoma salicis 柳毒蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(卵)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：江蘇、安徽、湖北、陜西、河北、北京、遼寧。

Trichogramma japonicum Ashmead 稻螟赤眼卵蜂 (ASZI, 1987, 2:365; ASZI et al., 1978:107; Chan et Chou, 2000, (2):140-143; Chen, 1987:54; Chen et Chiu, 1983:287; Chen et Hung, 1969:180; Cheng, 1953:190; Chou et al., 1994:328; Gou, 1986:114; Guangtugn, 1974:269-280; Guo, 1985, 7:192-200; Guo, 1992:6-12; Guo et Zhang, 1993, 15(2):51-59; Guo et Zhu, 1996, 18(1):7-12; He et al., 1991:55; Hu, 1956:235-245; Hu et Wu, 1987:187; Huang et al., 1994, 16(4):156-159; Huang et al., 1996, 23(3):209-212; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Lei, 1994:187; Li, 1989:91; Li et al., 1983:1-5; Li et al., 1986:187-194; Li et al., 1989:31-35; Liao et al., 1987:206; Lin, 1987:101; Lin, 1994:60, 330-331; Lin, 1985:209; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:24, 25; Liu et al., 1983:38; Liu et al., 1983:166-170; Pang, 1985:44; Pang et Chen, 1974:450; Pu et al., 1981(3):6-9; Qian et Chao, 1981(4):2; She et He, 1988:6; Sheng, 1989:95; Shi, 1980[ed.]:119-121; Sun et al., 1980(4):22; Wang, 1996, 22(1):8-10; Wang et al., 1985:13-17; Xia, 1957:296; Xie, 1993, 9(1):20; Xie et Zhu, 1989:77-81; Xu, 1988:120-121; Xu et al., 1986:150-154; Xu et al., 1987:220-222; Zhang, 1987[ed.] 2:85; Zhang et Zhao, 1986:215-219; Zhang et Jin, 1988:139-145; Zhang et You, 1980(1):52; Zhang et You, 1980(1):52; Zhang et al., 1997, 24(2):164-168; Zhao, 1986:126; Zhu, 198191-2):86; Zhu et Zhang, 1987:111-114)

Trichogramma japonicum Ashmead, 1904:164-165.

寄 主：鱗翅目：螟蛾科、尺蛾科、枯葉蛾科、燈蛾科、夜蛾科、弄蝶科、灰蝶科、鳳蝶科；雙翅目：沼蠅科、水蠅科 10 科 401 種(卵)(Lin, 1994:330-331)
Nephotettis virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Sogatela furcifera (Horváth) 白背飛蝨
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(卵)
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(卵)
Chilo auricilius (Dudgeon) 臺灣稻螟(卵)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵)
Marasmia exigua (Butler) 稻顯紋縱捲水螟
Corcyra cephalonica (Stainton) 米蛾
Ostrinia furnaoalis (Guenée) 玉米螟
稻筒巢螟
褐邊螟(卵)
夜蛾科(卵)
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Jaspida poryza incertulas 條紋螟蛉
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(卵)

Simyra albovenosa (Goeze) 稻毛蟲(夜蛾科)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(卵)
Creatonotus transiens 八點灰燈蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Lampides boeticus (Linnaeus) 小灰蝶(卵)(Lycaenide)
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶
Spedon sauteri 沼蠅(卵)
Notiphila dorsopunctata Wd. 沼刺水蠅(卵)
Oulema oryzae (Kuwayama) 稻負泥蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧；朝鮮、日本、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、印度、印尼、法國、美國。

Trichogramma leucaniae Pang et Chen 粘蟲赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:364; ASZI et al., 1978:105; Gou, 1986:114; He et al., 1991:55; Huo et al., 1990:166; Liao et al., 1987: 203; Lin, 1994:54, 332; Pang, 1985:45; Pang et Chen, 1974:448; Qian et Chao, 1981(4):2; Wang et Yan, 1980(3):18-23; Yin et al., 1988:110; Yin et al., 1990:141; Zhang et al., 1990:50)

Trichogramma leucaniae Pang et Chen, 1974:448.

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(卵)
Clostera anachoreta 舟蛾(卵)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(卵)
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(卵)
Mamestra brassicae (Linnaeus) 甘藍夜蛾
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(卵)
Ostrinia furnalis (Guenée) 亞洲米玉螟(卵)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(卵)
稻紅瓢蟲(卵)
針緣蝽(卵)。

分 佈：廣東、浙江、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧、吉林。

Trichogramma lingulatum Pang et Chen 舌突赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:364; ASZI et al., 1978:106; Gou, 1986:114; Liao et al., 1987: 204; Lin, 1994:57, 332; Pang et Chen, 1974:449)

Trichogramma lingulatum Pang et Chen, 1974:449.

寄 主：*Leucoma candida* 柳毒蛾(卵)。

分 佈：安徽、山東、山西、吉林。

Trichogramma longxishanense Lin 龍棲山赤眼蜂 (Chan et Chou, 2000, (2):143-145; Lin, 1994:62, 332)

Trichogramma longxishanense Lin, 1994:62.

寄 主：*Suastus gremius* 弄蝶 (on *Rhapis excelsa*)
Macroglossum pyrrhostictum (Butler) 黑長喙天蛾 (on *Paederia scandens* var. *maairei*)。

分 佈：臺灣、福建(將樂龍棲山)。

Trichogramma maidis (Wang et al., 1995, 21(6):39-42; Yin et Chang, 1987:45-47; Yin et al., 1989:90)

寄 主：*Pieris rapae* (Linnaeus) 菜粉蝶
Mamestra brassicae (Linnaeus) 甘藍夜蛾。
分 佈：山西(自法國引進)。

Trichogramma minutum 微小赤眼蜂 (Pu, 1987:60; Qian et Chao, 1981(4):2; Wang, 1990:175)
寄 主：
分 佈：
附 註：國外引進。

Trichogramma nagarkattii 納氏赤眼蜂 (Li et al., 1983:1-5)
寄 主：
分 佈：
附 註：國外引進。

Trichogramma neuropterae Chan et Chou 草蛉卵毛小蜂 (Chan et al., 1996:144)
Trichogramma neuropterae Chan et Chou, 1996:144-146.
寄 主：Chrysopidae 草蛉(卵)
Mallada basilis (Walker) 基徵草蛉 及 *Mallada boninensis* (Okamoto) 安平草蛉 卵在室內寄生。
分 佈：臺灣。

Trichogramma nubilale Erle et Davis 歐洲玉米螟赤眼蜂 (Li et al., 1984, 6:13-19; Li et al., 1987:33-44; Liu et al., 1983:166-170; Wang et al., 1995, 21(6):39-42; Zhu et Zhang, 1987:111-114)
寄 主：*Argyroploce schistaceana* (Snellen) 黃螟
Chilo sacchariphagus (Bojer) 條螟
Ostrinia nubalalis Hübner 歐洲玉米螟。
分 佈：臺灣、廣東；美國。
附 註：1983 年自美國引進廣東。

Trichogramma ostriniae Pang et Chen 玉米赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:364; ASZI et la., 1978:105; Chan et Chou, 2000, (2):145-147; Chang et Chen, 1995:369-370; Chen, 1985(1):53; Chen, 1994:293-299; Chen et Chang, 1991:148-153; Chen et Yu, 1992:294-300; Chen et al., 1993:141; Chen et al., 1994:330-332; Chiu et Chen, 1985:449; 1986:23-30; Chu et Lee, 1990:357; 1991:214-226; Feng et al., 1977:253-258; Feng et al., 1985:10; Gou, 1985(4):20-21; 1986:114; 1986:148-152; Guan et al., 1987:126; Han et al., 1999, 21(1):9-12; Huang, 1990[ed.]:198-201; Huang et al., 1994, 16(4):156-159; 1995:13-17; Huang et al., 1996, 23(3):209-212; Huo et al., 1990:163; Kao et Tseng, 1987:163; Lee et Chu, 1989:312; Li, 1986:238-241; Li et Chu, 1992:246-255; Li et al., 1983:1-5; Li et al., 1989:31-35; Li et al., 1997, 13(4):184; Liao et al., 1987:203; Lin, 1987:100; Lin, 1994:54, 339-340; Liu et al., 1980(2):64; Lo et Chen, 1995:368; Lu, 1991:46; Pang, 1985:45; Pang et Chen, 1974:448; 1980(1):36; Qian et Chao, 1981(4):2; Qian et al., 1984:287-293; Shen et Li, 1987:136-137; Shen et al., 1986:152-154; Shen et al., 1992:101-103; Shi, 1980[ed.]:119-121; Song et al., 1985(4):40; Tseng, 1965:405; Tseng, 1990:101-107; Tseng, 1990:115-123; Tseng et Kao, 1987:170-171; Tseng et Wu, 1988:185; 1992:353; Wang, 1996, 22(1):8-10; Wang et Yan, 1980-(3):18-23; Wang et al., 1982 4(3):1-4; Wang et al., 1984:294-301; Wang et al., 1985:13-17; Wang et al., 1995, 21(6):39-42; Wang et al., 1996, 12(4):145-149; Wang et al., 1996, 23(4):373-374; Wu, 1992, 29(1):14-15; Wu et Ji, 1989:151-155; Xie et Zhu, 1989:77-81; 1990:56-61; Yu et Chen, 2000, (12):30; Yu et al., 1992:295-310; Zhang, 1981(3):14-18; Zhang et al., 1979, 16(5):207-211; Zhang et al., 1983:129-134; Zhang et al., 1987, 3(2):96; Zhang et al., 1990, 6(2):49-53; Zhang et al., 1990:50; Zhao, 1991, (5):47-49; Zhong, 1987:112-113; Zhou et al., 1980, 7(2):113-122; Zhou et al., 1997, 12(1):1-5; Zhou et al., 1997, 13(2):49-52; Zhou et al., 1997, 13(3):97-100; Zong et al., 1987, 6:325-327; Zong et al., 1990, :123-130)

Trichogramma ostriniae Pang et Chen, 1974:448.
寄 主：已有 45 種記錄(Lin, 1994:339-340)
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟(卵) (on *Zea mays*)
Corcyra cephalonica (Stainton) 米蛾
Monema flavescens (Walker) 黃刺蛾(卵)
Adoxophyes orana (Fischer von Roslerstamn) 柑橘捲蛾(卵)
Adoxophyes fasciata 柑橘捲蛾(卵)
Clostera anachoreta 楊扇舟蛾
Lampronadata cristata (Butler) 黃二星舟蛾
Leguminivora glycinivorella 大豆食心蟲
Callambulyx latarinovi 榆綠天蛾
Macroglossum pyrrhostictum 具斑天蛾(卵)
Smerithus planus 藍目天蛾
楊白眉天蛾
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(卵)
Mythimna separata (Walker) 粘蟲
Agrauli vanillae
Papilio spp. 鳳蝶
Danaus plexippus 斑蝶(卵)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧；蘇聯、美國、夏威夷。

Trichogramma pangi Lin 龐氏赤眼蜂 (Lin, 1987:98; Lin, 1994:50, 340)
Trichogramma pangi Lin, 1987:98.
寄 主：
分 佈：福建、遼寧。

Trichogramma parnarae Hue 稻苞蟲赤蜂 (Huo, 1986:175; Lin, 1994:49, 340)
Trichogramma parnarae Hue, 1986:175.
寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 直紋稻苞蟲(卵)。
分 佈：陝西(岐山)。

Trichogramma pintoi Voegele 暗黑赤眼蜂 (Lin 1994:58, 341; Pang, 1985:45; Wang et Zhang, 1988:149-151; Zhang et al., 1990:50)
=*Trichogramma euproctidis* Pang et Chen, 1974:449. (*nec* Girault)
=*Trichogramma* sp. Pang et Chen, 1987:205.
Trichogramma pintoi Voegele, 1992:165.
寄 主：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲(卵)
Euxoa segetum (Denis et Schiffermüller) 黃老虎(卵)
Aglossa dimidiata 螟蛾(卵)
Ascotis selenar dianeria 夜蛾(卵)
Corcyra cephalonica Stainton 米蛾(卵)
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟(卵)

Helicoverpa assulta Guenée　煙青蟲(卵)
Helicoverpa zea (Boddie)　穀實夜蛾(卵)
Plusia agnata Staudinger　銀紋夜蛾(卵)
捲蛾
夜蛾科。
分 佈：山西、內蒙古、遼寧；印度、日本、歐洲。

Trichogramma poliae Nagaraja 蔗二點螟赤眼蜂 (Zhang et al., 1990:50)
寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée)　亞玉米螟(卵)。
分 佈：遼寧、吉林。

Trichogramma polychrosis Chen et Pang 杉捲蛾赤眼蜂 (Gou, 1986:114; Huo et al., 1990:165; Liao et al., 1987:206; Lin, 1994:50, 341; Pang, 1985:45; Sheng, 1989:96; Zhang, 1987[ed.] 2:85)
Trichogramma polychrosis Chen et Pang, 1981:330.
寄 主：*Polychrosis cunninghamiacola* Liu et Pai　杉梢小卷蛾(卵)。
分 佈：江西。

Trichogramma pretiosum Riley 短管赤眼蜂 (Hou et al., 1990:163; Li et Zhang, 1980:31-36; Li et al., 1983:1-5; Liu et Wu, 1980(1):57; Pu, 1987:60; Yin et Chang, 1987:45-47)
寄 主：稻縱捲葉螟
燕尾天蛾
玉米夜蛾。
分 佈：廣東、江蘇、湖北、山西；澳洲、夏威夷群島、新大陸。
附 註：1979 年由美國引進

Trichogramma psocopterae Chan et Chou 嚙蟲赤眼蜂 (Chan et Chou, 1996:146)
Trichogramma psocopterae Chan et Chou, 1996:146.
寄 主：Psocoptera　嚙蟲。
分 佈：臺灣。

Trichogramma raoi Nagaraja 微突赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:365; ASZI et al., 1978:106; Chan et Chou, 2000, (2):147; Chen, 1989:49; Gou, 1986:114; Liao et al., 1987:205; Lin, 1987:100; Lin, 1994:58, 342; Pang, 1985:46; Pang et Chen, 1974:449)
Trichogramma raoi Nagaraja, 1973:279-280.
寄 主：*Acraea issoria formosana* (Fruhstorfer)　苧麻珍蝶
Naranga aenescens Moore　稻螟蛉(卵)
Trhchoplusia ni (Hübner)　擬尺蠖
一種鱗翅目(卵)(蔗田)
Corcyra cephalonica Stainton　米蛾(卵)。
分 佈：臺灣、福建、廣東(廣州)；印度。

Trichogramma semblidis (Aurivillius) 顯棒赤眼蜂 (Gou, 1986:114; Liao et al., 1987:207; Lin, 1994:53, 343-344; Pang, 1985:46; Qian et Chao, 1982(4):2)
Oophthora semblidis Aurivillius, 1897:253-255.

Trichogramma semblidis, Nagarkatti et Nagaraja, 1971:27.
=*Trichogramma schuberti* Voegele et Russo, 1981:537.
寄 主：鱗翅目、雙翅目、鞘翅目、廣翅目、膜翅目等 30 餘種卵(Lin, 1994:343-344)
虻(卵)。
分 佈：廣東、江蘇、河南；印度、蘇聯、波蘭、德國、法國、北美。

Trichogramma sericini Pang et Chen 鳳蝶赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:365; ASZI et al., 1978:106; Chen, 1989:49; Gou, 1986:114; Huo et al., 1990:164; Liao et al., 1987:206; Lin, 1994:59, 345; Pang, 1985:46; Pang et Chen, 1974:450; Sheng, 1989:96; Zhong, 1985(4):42)
Trichogramma sericini Pang et Chen, 1974:450.
寄 主：*Sericinus telamon* Donovan 圓尾鳳蝶
Papilio polytes Linnaeus 玉帶鳳蝶
軟尾鳳蝶。
分 佈：江西、湖北、山東、山西、北京。

Trichogramma shaanxiensis Huo 陝西赤眼蜂 (Huo, 1991:231; Lin, 1994:51, 345)
Trichogramma shaanxiensis Huo, 1991:231-232.
寄 主：*Parnara guttata* (Bremer et Grey) 直紋稻苞蟲(卵)。
分 佈：陝西。

Trichogramma taiwanense Chan et Chou 臺灣毛小蜂 (Chan et Chou, 2000, (2):147-150)
Trichogramma taiwanense Chan et Chou, 2000, (2):147-150.
寄 主：*Trichoplusia ni* (Hübner) 擬尺蠖。
分 佈：臺灣。

Trichogramma tielingensis Zhang et Wang 鐵嶺赤眼蜂 (Gou, 1986:114; Lin, 1994:60, 346; Pang, 1985:46; Zhang et Wang, 1982: 49; Zhang et al., 1990:50)
Trichogramma tielingensis Zhang et Wang, 1982:49.
寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟(卵)。
分 佈：遼寧(鐵嶺)。

Trichogramma sp. 暗黑赤眼蜂 (ASZI, 1987, 2:365; Liao et al., 1987:205)
寄 主：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲
Agrotis segetum (Denis et Schiffermüller) 黃地老虎
據記載：卷蛾科
毒蛾科
夜蛾科。
分 佈：山西、內蒙古；日本、歐洲。

Trichogramma sp. 赤眼蜂 (Wang et al., 1998, 25(1):20-26)
寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus) 小菜蛾。
分 佈：浙江。

Trichogramma sp. 叉斜紋網蛾赤眼蜂 (Chen, 1993:42)

寄 主：*Striglina bifida* Chu et Wang　叉斜紋網蛾。
分 佈：浙江。

Trichogramma sp. 稻毛蟲赤眼蜂 (He et al., 1991:55)
寄 主：*Simyra albovenosa* (Goeze)　稻毛蟲(夜蛾)。
分 佈：雲南。

Trichogramma sp. 菜粉蝶赤眼蜂 (Chen et al., 1991:111)
寄 主：*Pieris rapae* (Linnaeus)　菜粉蝶(卵)。
分 佈：雲南。

Trichogramma sp. 菜蛾赤眼蜂 (Chen et al., 1991:111)
寄 主：*Plutella xylostella* (Linnaeus)　菜蛾(卵)。
分 佈：雲南。

Trichogramma sp. 蘋果蠹蛾赤眼蜂 (Chang et al., 1960:40-53)
寄 主：*Carpocapsa pomonella* Linnaeus　蘋果蠹蛾(卵)。
分 佈：新疆(伊寧)。

Trichogramma sp. (Mao et al., 1999, 21(1):46)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål)　褐飛蝨(卵)。
分 佈：廣東。

Trichogramma sp. (Mao et al., 1999, 21(1):46)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål)　褐飛蝨(卵)。
分 佈：廣東。

Trichogramma sp. (Mao et al., 1999, 21(1):46)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål)　褐飛蝨(卵)。
分 佈：廣東。

Trichogramma sp. 草蛉毛小蜂 (Lo et Wu, 1989:183)
寄 主：*Chrysopa boninensis*　安平草蛉。
分 佈：臺灣。

Trichogramma spp. 赤眼蜂 (Chen, 1989:44-71; Liu et al., 1980(3):15-17; Liu et al., 1991:38-40; Wang et al., 1991:183; Zhang et al., 1991:71-73; Zhejiang, Jin-hua, 1980(3):73-74)
寄 主：
分 佈：廣東、浙江、江蘇、吉林。

Trichogrammatoidea armegera Nagaraja 棉鈴蟲分索赤眼蜂 (Lin, 1994:64, 347)
Trichogrammatoidea armegera Nagaraja, 1978:499.
寄 主：印度寄生麥蛾科、螟蛾科、夜蛾科、灰蝶科等 5 科 8 種(卵)。

分 佈：福建；菲律賓、印度、巴布亞新幾內亞。

Trichogrammatoidea bactrae Nagaraja 捲蛾分索赤眼蜂 (Lin, 1994:65, 348)

Trichogrmmatoidea bactrae Nagaraja, 1978:501.

寄 主：國外記錄寄生夜蛾、天蛾、小卷蛾、螟蛾、弄蝶、沼蠅等 17 種主卵。

分 佈：臺灣、福建；菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、印度、巴基斯坦。

Trichogrammatoidea nana (Zehntner) 爪哇分索赤眼蜂 (Lin, 1994:66)

Chaetostricha nana Zehntner, 1896:14-16.

Trichogrammatoidea nana, Girault, 1911:15-19.

寄 主：一種細蛾(卵)。

據記載有：細蛾科、麥蛾科、螟蛾科、斑蛾科、小卷蛾科、灰蝶科、半翅目的 Kerridae、鞘翅目鐵甲蟲等近 20 多種害蟲卵

分 佈：臺灣、廣東；菲律賓、馬來西亞、印度、印尼、澳洲。

Trichogrammatoidea sp. (Lo et Chen, 1995:368)

寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟。

分 佈：臺灣。

Tumidiclava minoripenis Lin 小莖腫棒赤眼蜂 (Lin, 1994:86, 352)

Tumidiclava minoripenis Lin, 1991:47.

寄 主：

分 佈：福建、廣東、江西、湖北。

Tumidiclava simplicis Lin 簡基腫棒赤眼蜂 (Lin, 1994:87, 352)

Tumidiclava simplicis Lin, 1991:48.

寄 主：

分 佈：福建。

Tumidiclava tenuipenis Lin 細基腫棒赤眼蜂 (Lin, 1994:88, 353)

Tumidiclava tenuipenis Lin, 1991:50.

寄 主：

分 佈：福建。

Tumidifemur ramispinum Lin 枝刺腫腿赤眼蜂 (Lin, 1994:101, 353)

Tumidifemur ramispinum Lin, 1994:101-102.

寄 主：

分 佈：福建。

Ufens acuminatus Lin 細突寬翅赤眼蜂 (Lin, 1993:53; Lin, 1994:206, 353)

Ufens acuminatus Lin, 1993:53-55.

寄 主：

分 佈：福建(沙縣)。

Ufens anomalus Lin 異形腫棒赤眼蜂 (Lin, 1994:208, 354)

Ufens anomalus Lin, 1994:208-210.

寄 主：

分 佈：北京、遼寧。

Ufens cupuliformis Lin 杯狀寬翅赤眼蜂 (Lin, 1993:55; Lin, 1994:210, 354)

Ufens cupuliformis Lin, 1993:55-56.

寄 主：

分 佈：福建。

Ufens rimatus Lin 折翅寬翅赤眼蜂 (Lin, 1994:211, 355)

Ufens rimatus Lin, 1993:56-58.

寄 主：

分 佈：廣東(廣州)。

Ufens similis (Kryger) 相似寬翅赤眼蜂 (Lin, 1993:52; Lin, 1994:207, 355)

Neocentrobia similis Kryger, 1932:42.
=*Ufens megaloptila* Nowicki, 1940:624.
Ufens similis, Lin, 1993:51-53.

寄 主：

分 佈：福建、廣西；土耳其、埃及、波蘭。

Ufens rimatus Lin 折脈寬翅赤眼蜂 (Lin, 1993:56)

Ufens rimatus Lin, 1993:56-58.

寄 主：

分 佈：廣東(廣州)。

Uscana callosobruchi Lin 豆象尤氏赤眼蜂 (Lin, 1994:94, 357)

Uscana callosobruchi Lin, 1994:94-95.

寄 主：*Callosobruchus chinensis* 綠豆象(卵)。

分 佈：福建、遼寧。

Uscana latipenis Lin 寬莖尤氏赤眼蜂 (Lin, 1994:96, 358)

Uscana latipenis Lin, 1994:96-97.

寄 主：

分 佈：福建。

Uscana rugata Lin 紋胸尤氏赤眼蜂 (Lin, 1994:95, 358)

Uscana rugatus Lin, 1994:95-96.

寄 主：

分 佈：福建。

Uscana setifera Lin 毛角尤氏赤眼蜂 (Lin, 1994:97, 359)

Uscana setifera Lin, 1994:97-98.

寄 主：
分 佈：福建(武夷山)、廣東(廣州)。

Uscanoidea apiclavata Lin 尖棒異角赤眼蜂 (Lin, 1994:98, 359)
Uscanoidea apiclavata Lin, 1994:98-99.
寄 主：
分 佈：福建。

Uscanoidea ovata Lin 卵棒異角赤眼蜂 (Lin, 1994:99, 360)
Uscanoidea ovata Lin, 1994:99-100.
寄 主：
分 佈：福建(永春)。

Xiphogramma indicum Hayat 印度刀管赤眼蜂 (Lin, 1994:41, 361)
Xiphogramma indicum Hayat, 1980:205.
寄 主：
分 佈：福建；印度。

Zagella chrysomeliphila Lin 葉甲廣翅赤眼蜂 (Lin, 1994:123, 361)
Zagella chrysomeliphila Lin, 1994:123-124.
寄 主：*Ambrostoma quadriimpressum* 榆紫葉甲。
分 佈：內蒙古(達茂旗)。

Mymaridae 魅小蜂科(纓小蜂科)

Alaptus sp. 嚙蟲魅小蜂 (Shi et al., 1989-90:80)
Alaptus sp. Shi et al., 1989-90:80.
寄 主：*Rodamaius brevicornis* Okamoto 短角嚙蟲。
分 佈：上海。

Anagrus (Anagrella) albiclava Chiappini et Lin (Chiappini et Lin, 1998:554)
Anagrus (*Anagrella*) *albiclava* Chiappini et Lin, 1998:554-555.
寄 主：
分 佈：福建。

Anagrus (s. str.) **atomus** (Linnaeus) (Chiappini et Lin, 1998:561)
Ichneumon atomus Linnaeus, 1767:941.
Anagrus atomus (Linnaeus), Haliday, 1833:347.
=*Anagrus bartheli* Tullgren, 1916:8-11.
=*Anagrus minimus* Menozzi, 1942:38-39.
=*Anagrus ustulatus* Haliday, 1833: (misidentifed)
=*Anagrus tullgreni* Hedqvist, 1954:272-273.
=*Anagrus hundsheimensis* Soyka, 1955:24.
=*Anagrus lemonicolor* Soyka, 1955:24.
=*Anagrus stammeri* Soyka, 1955:24.

=*Anagrus varius* Soyka, 1955:24.
=*Anagrus devius* Soyka, 1955:25.
=*Anagrus gabitzi* Soyka, 1955:25.
=*Anagrus kressbachi* Soyka, 1955:25.
=*Anagrus levis* Soyka, 1955:25.
寄 主：
分 佈：福建、遼寧。

Anagrus (Anagrella) brevis Chiappini et Lin (Chiappini et Lin, 1998:554)
Anagrus (*Anagrella*) *brevis* Chiappini et Lin, 1998:554.
寄 主：
分 佈：福建。

Anagrus dalhousieanus Mani et Saraswat (Chiappini et Lin, 1998:552)
Anagrus dalhousieanus Mani et Saraswat, 1973:104-105.
寄 主：
分 佈：福建；印度。

Anagrus (s. str.) **flaviapex** Chiappini et Lin (Chiappini et Lin, 1998:562)
Anagrus (s. str.) *flaviapex* Chiappini et Lin, 1998:562-564.
寄 主：?*Sogatella furcifera* 白背飛虱(卵)。
分 佈：福建。

Anagrus (s. str.) **frequens** Perkins (Chiappini et Lin, 1998:561)
Anagrus (s. str.) *frequens* Perkins, 1905:198.
=*Anagrus armatus* (Ashmead), Girault, 1912:155-158. (in part)
寄 主：*Toya propinqua* 黃脊飛蝨。
分 佈：廣東。

Anagrus (Anagrella) hirashimai Sahad (Chiappini et Lin, 1998:557)
Anagrus hirashimai Sahad, 1982:198-201.
Anagrus (*Anagrella*) *hirashimai*, Chiappini et al. 1996:563-564.
寄 主：
分 佈：福建；日本(九州)。

Anagrus incarnatus Haliday (Chen, 1991:439; 1993:267-275; 1996:30; Chen et Yu, 1989:312)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Laodelphax striatellus (Fallèn) 斑飛蝨。
分 佈：臺灣。

Anagrus longitubulosus Pang et Wang 長管魅小蜂 (He et al., 1991:55; Jin et Zhang, 1980(3):51-57; Li et He, 1991:156-161; Mao et al., 1999, 21(1):46; Pang et Wang, 1985: 181; Sheng, 1989:98; Sun et al., 1980(4):22; Zhao, 1986:126)
Anagrus longitubulosus Pang et Wang, 1985:181.
別 名：*長管纓小蜂*，*長管稻虱纓小蜂*。
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)

Sogatella furcifera (Horváth)　白背飛蝨(卵)
Laedeophax striatella (Fallén)　斑飛蝨(卵)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Anagrus (s. str.) **minutus** Chiappini et Lin (Chiappini et Lin, 1998:564)
Anagrus (s. str.) *minutus* Chiappini et Lin, 1998:564—566.
寄 主：
分 佈：福建。

Anagrus nilaparvatae Pang et Wang 稻虱魅小蜂 (Chiappini et Lin, 1998:566; Guan et al., 1994, 20(2):39-40; He et al., 1991:55; Hu et Lin, 1991:97-98; Jin et Zhang, 1980(3):51-57; Li et He, 1991:156-161; Lin, 1970:187; 191; Lin et Kuo, 1970:192; Lou et Cheng, 1993:75-76; Luo et Cheng, 1994, 21(4):327-332; Luo et Cheng, 1996, 7(1):61-66; Luo et Zhu, 1980:44-59; 105-109; Mao et al., 1999, 21(1):46; Pang et Wang, 1985:176; Sheng, 1989:98; Sun et al., 1980(4):22; Wang, 1990:40-47; Wang et Pang, 1986:225-229; Xu et Cheng, 1988:102-105; 1989:53-59; Zhao, 1986:126; Zhu et al., 1990:51-55; 1993:430-437)
Anagrus nilaparvatae Pang et Wang, 1985:176-178.
=*Anagrus* nr. *flaveolus* Waterhouse, Ötake, 1968:161-169.
=*Anagrus flaveolus* Waterhouse, Subba Rao, 1983:388-390.
=?*Anagrus incarnatus* Haliday, Sahad et Hirashima, 1984:45-50.
=?*Anagrus flaveolus* Haliday, Sahad et Hirashima, 1984:55-58.
別 名：*稻虱纓小蜂*。
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål)　褐飛蝨(卵)
Sacharosydne procerus　長綠飛蝨
Sogatella furcifera (Horváth)　白背飛蝨
Sogatella panicicola　中稗飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén)　斑飛蝨
Sogatella longifurcifera (Ksak. et Ishihara)　稗飛蝨
Nilaparvata bakeri (Muir)　擬褐飛蝨
Nilaparvata muiri China　僞褐飛蝨
Toya propinqua (Fieber)　黑邊飛蝨
Toya tuberculosa (Distant)　黑面飛蝨
Kakuna sapporonis　大褐飛蝨。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西；日本、印尼。

Anagrus optabilis (Perkins) 蔗蝨魅小蜂 (Pang et Wang, 1985:182)
Paranagrus optabilis Perkins, 1905:199.
Anagrus optabilis, Annecke et Doutt, 1961:7-8.
寄 主：*Perkinsiella saccharicida* Kirkaldy　甘蔗飛蝨。
分 佈：廣東；澳洲(昆士蘭)、斐濟、泰國。

Anagrus (s. str.) **paranagrosimilis** Chiappini et Lin (Chiappini et Lin, 1998:564)
Anagrus (s. str.) *paranagrosimilis* Chiappini et Lin, 1998:564.
寄 主：
分 佈：福建。

Anagrus paranilaparvatae Pang et Wang 擬稻蝨魅小蜂 (Chiappini et Lin, 1998:558; Guan et al., 1994, 220(2):39-40; He et al., 1991:55; Hu et Lin, 1991: 97-98; Jin et Zhang, 1980(3):51-57; Li et He, 1991:156-161; Luo et Zhu, 1980:44-59; 105-109; Mao et al., 1999, 21(1):46; Pang et Wang, 1985:178; Sheng, 1989:98; Xu et Cheng, 1988:102-105)

Anagrus paranilaparvate Pang et Wang, 1985:178.

別 名：*擬稻虱纓小蜂*。

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)

Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨

Sogatella longifurcifer (Ksak. et Ishihara) 稗飛蝨

Nilaparvata muiri China 僞褐飛蝨

Toya propinqua (Fieber) 黑邊飛蝨

Toya tuberculosa (Distant) 黑面飛蝨

Nilaparvata bakeri (Muir) 擬褐飛蝨

Kakuna sapporonis 大褐飛蝨。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、浙江、江蘇、湖北。

Anagrus (Paranagrus) perforator (Perkins) (Chiappini et Lin, 1998:557)

Paranagrus perforator Perkins, 1905:199.

=?*Anagrus longitubulosus* Pang and Wang, 1985:181.

Anagrus (*Paranagrus*) *perforator* (Perkins), Chiappini et al., 1996:567-568.

寄 主：*Nilaparvata* sp. 飛蝨(卵)。

分 佈：福建、廣東。

Anagrus (Anagrella) semiglabrus Chiappini et Lin (Chiappini et Lin, 1998:555)

Anagrus (*Anagrella*) *semiglabrus* Chiappini et Lin, 1998:555-557.

寄 主：

分 佈：遼寧。

Anagrus (s. str.) **setosus** Chiappini et Lin (Chiappini et Lin, 1998:562)

Anagrus (s. str.) *setosus* Chiappini et Lin, 1998:562.

寄 主：

分 佈：福建。

Anagrus shortitubulosus Pang et Wang 短管稻蝨魅小蜂 (Mao et al., 1999, 21(1):46)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛虱(卵)。

分 佈：廣東。

Anagrus toyae Pang et Wang 僞稻蝨魅小蜂 (He et al., 1991:55; Pang et Wang, 1985:179)

Anagrus toyae Pang et Wang, 1985:179.

別 名：*僞稻蝨纓小蜂*。

寄 主：*Toya propinqua* (Muir) 黑邊飛蝨。

分 佈：廣東。

Anagrus (s. str.) **striatus** Chiappini et Lin (Chiappini et Lin, 1998:566)

Anagrus (s. str.) *striatus* Chiappini et Lin, 1998:566.

寄 主：

分 佈：福建、遼寧。

Anagrus toyae Pang et Wang 僞稻蝨魅小蜂 (He et al., 1991:55; Mao et al., 1999, 21(1):46; Pang et Wang, 1985:179)

Anagrus toyae Pang et Wang, 1985:179.

別 名：*僞稻蝨纓小蜂*。

寄 主：*Toya propinqua* (Muir) 黑邊飛蝨。

分 佈：廣東。

Anagrus (s. str.) sp. (Chiappini et Lin, 1998:569)

Anagrus (s. str.) sp. Chiappini et Lin, 1998:569.

寄 主：

分 佈：福建。

Anagrus sp. 飛蝨魅小蜂 (Gu et al., 1987:286-288; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Liao et al., 1987:213; Lin, 1974:94, 99; Lin et Hu, 1985:1-4; Luo et Zhuo, 1983:61; 1986:72; Wu et Yang, 1987:49; Wu et al., 1982:36-38; Zhang, 1987[ed.] 2:86)

別 名：*飛蝨纓小蜂*。

寄 主：*Laedelphax striatella* (Fallén) 斑飛蝨(卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)
Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨(卵)
Nephotettix spp. 黑尾葉蟬(卵)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北。

Anagrus sp. 短管魅小蜂 (Sheng, 1989:98; Sun et al., 1984:119; Zhang, 1987[ed.] 2:86)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)。

分 佈：江西、廣東。

Anagrus sp. 片盾蚧魅小蜂 (Su et al., 1986:35)

寄 主：*Paratoria* sp. 片盾蚧(馬尾松)。

分 佈：廣東。

Anaphes nipponicus Kuwayama 負泥蟲魅小蜂 (ASZI, 1987, 2:367; ASZI et al., 1978:99; He et al., 1991:56; Liao et al., 1987:212; Sheng, 1989:98; Zhang, 1987[ed.] 2:85)

寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲(卵)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、浙江、湖北、黑龍江；日本。

Emoymas sp. 稻蝨黃魅小蜂 (He et al., 1991:56)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)。

分 佈：廣西。

Erythmelus sp. (Chou et Chou, 1990:70-75)

Erythmelus sp. Chou et Chou, 1990:70-75.
寄 主：*Idioscopus clypealis* (Lethierry) 檬果葉蟬
Idioscopus niveosparsus (Lethierry) 檬果葉蟬。
分 佈：臺灣。

Gonatocerus longicrus Kieffer 葉蟬魅小蜂 (ASZI et al., 1978:100; He et al., 1991:56; Hunan, Shii-men, 1980(3):60; Liao et al., 1987:211; Lin, 1970:187; 191; Lin, 1974:94; Sheng, 1989:96; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:86; Zhao, 1986:126)
寄 主：*Nephotettix* spp. 黑尾葉蟬(卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(卵)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西；東印度群島。

Gonatocerus narayani (Subba Rao et Kaur) 納氏柄翅小蜂 (Xu et al., 1999, 21(4):171)
Lymaenon narayani Subba Rao et Kaur, 1959:227.
Gonatocerus narayani, Subba Rao et Hayat, 1983:136.
寄 主：*Erosomyia mangicola* Shi 檬果癭蚊。
Eucoccosterphus tubercultus 角蟬(國外)
分 佈：廣東；泰國、孟加拉、印度。

Gonatocerus sp. (Chou et Chou, 1990:70-75; Wen et Lee, 1980:245-250)
Gonatocerus sp., Wen et Lee, 1980:248.
Gonatocerus sp. Chou et Chou, 1990:70-75.
寄 主：*Idioscopus clypealis* (Lethierry) 檬果葉蟬
Idioscopus niveosparsus (Lethierry) 檬果葉蟬。
分 佈：臺灣。

Gonatocerus sp. 大青葉蟬魅小蜂 (He et al., 1991:56; Yang, 1990:169)
Lymaenon sp. Yang, 1990:169.
別 名：*大青葉蟬纓小蜂，葉蟬寬柄翅小蜂*。
寄 主：大青葉蟬(卵)。
分 佈：陝西、北京。

Gonatocerus sp. 稻蝨黃魅小蜂 (ASZI, 1987, 2:366; Chen, 1996:31; He et al., 1991:56; Mao et al., 1999, 21(1):46; Sun et al., 1980(4):22)
別 名：*稻蝨黃纓小蜂*。
寄 主：*Nephotettix* spp. 黑尾葉蟬(卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)。
分 佈：臺灣、廣東、廣西。

Mymar taprobanicum Ward 南方魅小蜂 (He et al., 1991:56; Lin, 1970:187; 191; Lin, 1974:94, 99; Mao et al., 1999, 21(1):46)
=*Mymar indica* Mani
別 名：*印度纓小蜂*。

寄 主：*Nephtettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬
Nephotettis spp. 黑尾葉蟬(卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(卵)。
分 佈：臺灣；印度。

Mymar sp. 黑腹魅小蜂 (He, et al., 1991:56)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)
Nephotettis spp. 黑尾葉蟬(卵)。
分 佈：廣西、上海。

Neurotes sp. (Mao et al., 1999, 21(1):46)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)
分 佈：廣東。

Omyomymar breve Lin et Chiappini (Lin et Chiappini, 1996:305)
Omyomymar breve Lin et Chiappini, 1996:305.
寄 主：
分 佈：福建。

Omyomymar glabrum Lin et Chiappini (Lin et Chiappini, 1996:302)
Omyomymar glabrum Lin et Chiappini, 1996:303.
寄 主：
分 佈：福建。

Omyomymar longidigitum Lin et Chiappini (Lin et Chiappini, 1996:306)
Omyomymar longidigitum Lin et Chiappini, 1996:306.
寄 主：
分 佈：福建。

Ooctonus sp. 稻蝨黃腰魅小蜂 (He et al., 1991:56)
別 名：*稻蝨黃腰纓小蜂*。
寄 主：稻飛蝨(卵)。
分 佈：廣西。

Pseudanaphes zhaoi Lin 趙氏寬翅纓小蜂 (Lin, 1997:98)
Pseudanaphes zhaoi Lin, 1997:98-100.
寄 主：
分 佈：陝西。

Mymarommatidae 雙節魅蜂科(柄腹纓小蜂科)

Palaeomymar anomatum (Blood et Kryger) 異形腹柄纓小蜂 (Lin, 1994:121)
Petiolaria anomata Blood et Kryger, 1922:229.
Palaeomymar anomatum, Doutt, 1973:225.

寄 主：
分 佈：福建；希臘、歐洲。

Palaeomymar chaoi Lin 趙氏腹柄纓小蜂 (Lin, 1994:123)
Palaeomymar chaoi Lin, 1994:123.
寄 主：
分 佈：福建。

Roproniidae 窄腹細蜂科

Hsiufuropronia chaoi Yang 趙修復窄腹細蜂 (Yang, 1997:102)
Hsiufuropronia chaoi Yang, 1997:102-105.
寄 主：
分 佈：北京。

Ropronia bituberculata He et Tong 雙瘤窄腹細蜂 (He, Zhu et Tong, 1988:210; Hun., 1992:1294)
Ropronia bituberculata He et Tong, 1988:210.
寄 主：
分 佈：福建、湖南。

Ropronia brevicornis Townes 短角窄腹細蜂 (Lin, 1987:43)
Ropronia brevicornis Townes, 1948:88-89.
寄 主：*Periclista* sp. 葉蜂(Tenthredinidae 葉蜂科)。
分 佈：臺灣、福建、山西；日本。

Ropronia insularis Lin 寶島窄腹細蜂 (Lin, 1987:44)
Ropronia insularis Lin, 1987:44-46.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Ropronia pectipes He et Zhu 斑足窄腹細蜂 (He et Zhu, 1988:208)
Ropronia pectipes He et Zhu, 1988:208.
寄 主：
分 佈：浙江(天目山)。

Ropronia rufiabdominalis He et Zhu 紅腹窄腹細蜂 (He et Zhu, 1988:207; Hun., 1992:1295)
Ropronia rufiabdominalis He et Zhu, 1988:207.
寄 主：
分 佈：湖南、貴州。

Ropronia szechuanensis Chao 四川窄腹細蜂 (Chao, 1962:378; Lin, 1987:43)
Ropronia szechuanensis Chao, 1962:378.
寄 主：
分 佈：福建、四川(峨嵋山)。

Ropronia undaclypeus He et Zhu 浪唇窄腹細蜂 (He et Zhu, 1988:208; Hun., 1992:1295)

Ropronia undaclypesu He et Zhu, 1988:209.

寄 主：

分 佈：福建、湖南。

Ropronia zhejiangensis He 浙江窄腹細蜂 (He, 1983:279)

Ropronia zhejiangensis He, 1983:279.

寄 主：

分 佈：浙江(天目山)。

Heloridae 柄腹細蜂科

Helorus anomalipes Panzer 大草蛉柄腹細蜂 (Wan, 1985:264)

寄 主：*Chrysopa pallens* (Rambur)(=*Chrysopa septempunctata* Wesmeal) 大草蛉。

分 佈：陝西；蒙古、歐洲、北美洲。

Helorus chinensis He 中華柄腹細蜂 (Hun., 1992:1295)

寄 主：*Chrysopa pallens* (Rambur) 大草蛉。

分 佈：湖南、浙江。

Serphidae 細蜂科

Maaserphus basalis Lin 基徵馬細蜂 (Lin, 1988:17)

Maaserphus basalis Lin, 1988:17.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Maaserphus brevicaudus Lin 短管馬細蜂 (Lin, 1988:20)

Maaserphus brevicaudus Lin, 1988:20.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Maaserphus fuscipes Lin 暗足馬細蜂 (Lin, 1988:19)

Maaserphus fuscipes Lin, 1988:19.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Maaserphus longicaudus Lin 長管馬細蜂 (Lin, 1988:20)

Maaserphus longicaudus Lin, 1988:20.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Maaserphus striatus Lin 皺馬細蜂 (Lin, 1988:18)
Maaserphus striatus Lin, 1988:18.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Nothoserphus admirabilis Lin 短角前溝細蜂 (Lin, 1987:57)
Nothoserphus admirabilis Lin, 1987:57.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Nothoserphus aequalis Townes 悅前溝細蜂 (Lin, 1987:55; Townes, 1981:66)
Nothoserphus aequalis Townes, 1981:66.
寄 主：
分 佈：臺灣、尼泊爾。

Nothoserphus debilis Townes 抵前溝細蜂 (Lin, 1987:56; Townes, 1981:66)
Nothoserphus debilis Townes, 1981:66.
寄 主：
分 佈：臺灣；尼泊爾。

Nothoserphus epilachnae (Pschorn-Walcher) 瓫前溝細蜂 (Lin, 1987:56; Townes, 1981:67)
Watanabeia epilachnae (Pschorn-Walcher, 1958:725, 727, 728.
Nothoserphus epilachnae, Townes, 1981:67.
寄 主：*Epilachna admirabilis* Crotch 瓜茄瓢蟲
Henosepilachna vigintioctopnctata (Fabricius) 茄二十八星瓢蟲。
分 佈：臺灣、雲南；越南、印尼。

Nothoserphus fuscipes Lin 暗足前溝細蜂 (Lin, 1987:54)
Nothoserphus fuscipes Lin, 1987:54.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Nothoserphus mirabilis Brues 珍奇前溝細蜂 (Hun., 1992:1294; Lin, 1987:58; Tong, 1990:185)
Nothoserphus mirabilis Brues, 1940:263.
寄 主：瓢蟲
Lemnia (s. str.) *saucia* (Mulsant) 黃斑瓢蟲(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、浙江；尼泊爾、爪哇。

Nothoserphus partitus Lin 分前溝細蜂 (Lin,1987:53)
Nothoserphus partitus Lin, 1987:53.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Nothoserphus townesi Lin 湯氏前溝細蜂 (Lin, 1987:53)

Nothoserphus townesi Lin, 1987:53.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Phaneroserphus chaoi Fan et He 趙氏脊額細蜂 (Fan et He, 1991:64)
Phaneroserphus chaoi Fan et He, 1991:64-65.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山區)。

Phaneroserphus yunnanensis Fan et He 雲南脊額細蜂 (Fan et He, 1991:64)
Phaneroserphus yunnanensis Fan et He, 1991:63-64.
寄 主：
分 佈：雲南(昆明)。

Phoxoserphus chikoi Lin 奇哥福細蜂 (Lin, 1988:22)
Phoxoserphus chikoi Lin, 1988:22.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Phoxoserphus vescus Lin 廣福細蜂 (Lin, 1988:21)
Phoxoserphus vescus Lin, 1988:21.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Serphus brachypterus Schrank 短翅細蜂 (Hun., 1992:1294; Townes, 1981:172)
Serphus brachypterus Schrank, 1780:307.
=*Ichneumon divagator* Olivier, 1792:192.
=*Ichneumon campanulator* Fabricius, 1798:227.
=*Ichneumon emarciator* Fabricius, 1798:227.
=*Proctotrupes brevipennis* Latreille, 1802:232.
=*Erodorus bimaculatus* Walckenaer, 1802:47.
=*Proctotrupes gladiator* Curtis, 1829:109.
=*Proctotrupes bicolor* Curtis, 1829:109.
=*Proctotrupes gravidator* Haliday, 1839:10.
=*Proctotrupes gladiator* Haliday, 1839:10.
=*Serphus* (s. str,) *sulcatus* Kieffer, 1908:290.
=*Serphus* (s. str.) *divagator* var. *microptera* Kieffer, 1908:291.
=*Serphus* (s. str.) *divagator* Kieffer, 1908:292.
=*Serphus micropterus* Kieffer, 1914:9.
=*Serphus hofferi* Tomisik, 1944:137.
=*Serphus azarbajdehanicus* Samedov, 1954:581.
寄 主：玉米距步甲
紅足婪步甲。
分 佈：湖南、浙江、江蘇、湖北；蘇聯、歐洲。

Sinicivanhornia quizhouensis He et Chu 貴州華顎細蜂 (He et Chu, 1990:102)

Sinicivanhornia quizhouensis He et Chu, 1990:102.
寄 生：
分 佈：貴州(惠水)。

Scelionidae 棱腹細蜂科

Telenominae 黑卵蜂亞科

(Cao et al., 1988:125-128)

Asolcus mitsukurii (Ashmead) 稻綠蝽黑卵蜂 (Huang et al., 1955:158; Zhang, 1987[ed.] 2:86)
寄 主：稻綠蝽(卵)
Lagynotomus assimulans Distant 稻褐蝽(卵)。
分 佈：江西、湖南。

Gryon sp. 稻蛛緣蝽黑卵蜂 (He et al., 1991:57)
寄 主：稻蛛緣蝽(卵)。
分 佈：雲南。

Scelio facialis Kieffer 顏黑卵蜂 (He et al., 1991:57)
寄 主：*Locusta migratoria manilensis* (Meyen) 東亞飛蝗(卵)。
分 佈：臺灣。

Scelio oryzae Timberlake 稻蝗黑卵蜂 (Chiu et Chou, 1974:119; He et al., 1991:57)
寄 主：*Oxya intricata* Stål 小稻蝗
長翅稻蝗
Oxya universalis 臺灣稻蝗。
分 佈：臺灣、廣東、廣西。

Scelio uvarovi Ogloblin 飛蝗卵蜂 (ASZI, 1987, 2:437; ASZI et al., 1978:110; Feng et al., 1991:18; Feng et al., 1994, 10(3):142; He et al., 1991:57; Ji, 1985:153-159; Wang et al., 1989:114)
寄 主：*Locusta migratoria manilensis* (Meyen) 東亞飛蝗(卵)
土蝗
Oxya chinensis 中華稻蝗
負蝗。
分 佈：湖南、浙江、江蘇、安徽、河南、山東、山西、河北。

Synopeas (Sactogaster) tarsa Walker 癭蚊廣腹細蜂 (Song et Cai, 1991:107)
寄 主：*Contarinia* sp. 茉莉花癭蚊。
分 佈：湖南。

Telenomus (Aholcus) abnormis Crowford 桑毛蟲黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:432; ASZI et al., 1978:109; Wu et Chen, 1980:79)
Telenomus abnormis Crowford

寄 主：*Arctornis chrysorrhoa* 桑毛蟲(卵)。
分 佈：浙江、江蘇。

Telenomus acrobates Giard 草蛉黑卵蜂 (Chen, 1979:214; Dang et Tong, 1990:177; He et al., 1991:57; Zhao, 1985(1):54 1986:146-149)
寄 主：*Chrysopa pallens* (Rambur) 大草蛉(卵)
Chrysopa frmosa Brauer 麗草蛉
Chrysopa sahnssiensis Kuwayama 晉草蛉
Chrysoperlas carnea carnea (Stephen) 中華草蛉。
分 佈：湖南、浙江、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆；蘇聯、西歐。

Telenomus (Aholcus) adenyus Nixon 梧桐毒蛾黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:430; Wu et Chen, 1980:81)
Telenomus adenyus Nixon
寄 主：梧桐毒蛾(卵)。
分 佈：浙江。

Telenomus adoxophyae Wu et Chen 柑橘捲蛾黑卵蜂 (Wu et Chen, 1985:151)
Telenomus adoxophyae Wu et Chen, 1985:151.
寄 主：*Adoxophyes cyrtosema* Meyrick 柑橘捲蛾(卵)。
分 佈：浙江(溫州)。

Telenomus ampullaceus Johnson et Bin 瓶狀黑卵蜂 (Chou et Wu, 1988:342; Lo et Wu, 1993:32; Wu et Lo, 1988:371-378)
Telenomus ampullaceus Johnson et Bin, 1982:197.
寄 主：*Chrysopa boninensis* Okamoto 安平草蛉。
國外：*Chrysopa tripunctata* McLahlan
Chrysopa edwardsi Banks
分 佈：臺灣；澳洲南部。

Telenomus angustatus Thomson 黃胸黑卵蜂 (Chen, 1979:214)
寄 主：*Tabanus amaenus* Walker 土灰虻。
分 佈：廣東、四川、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、遼寧。

Telenomus bambusae Chou et al. 竹盲蝽黑卵蜂 (Chou et al., 1989:43)
Telenomus bambusae Chou et al., 1989:43-47.
寄 主：*Mecistoscelis scirtetoides* Reuter 竹盲蝽。
分 佈：臺灣。

Telenomus (Phanurus) beneticiens Zehntner 螟黑卵蜂 (Cheng, 1953:290; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Xia, 1957:299; Zhang et Zhao, 1986:215-219)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(卵)
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(卵)。
分 佈：湖南、廣東、雲南、湖北。

Telenomus buzurae Wu et Chen 油桐尺蠖黑卵蜂 (Hun., 1992:1293; Wang, 1987:46; Wu et Chen, 1985:149)

Telenomus buzurae Wu et Chen, 1985:149.

寄 主：*Buzura suppressaria* Guenée 油桐尺蠖(卵)。

分 佈：湖南、四川。

Telenomus cantonensis 廣東粘蟲黑卵蜂

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(卵)。

分 佈：廣東。

Telenomus chilocolus Wu et Chen 二化螟黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:435; He et al., 1991:57; Wu et al., 1979:396; Zhang, 1987[ed.] 2:86; Zhao, 1986:126)

Telenomus chilocolus Wu et Chen, 1979:396.

=*Telenomus dignus* Gahan, Misidentified

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(卵)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、湖北、陝西。

Telenomus chilotraeae Wu et Chen 二點螟黑卵蜂 (Wu et Chen, 1985:150)

Telenomus chilotraeae Wu et Chen, 1985:150.

寄 主：*Chilotraea infuscatellus* Snellen 二點螟(卵)。

分 佈：廣東。

Telenomus chrysopae Ashmead 草蛉黑卵蜂 (Chou et Wu, 1988:340; Lo et Wu, 1989:183)

Telenomus chrysopae Ashmead, 1893:159.

寄 主：*Chrysopa boninensis* . 安平草蛉。

國外：*Chrysopa phyllochroma* Wesmael

Chrysopa oculata Say

Meleoma emuncta (Fitch)(?)

分 佈：臺灣；日本、意大利、荷蘭、加拿大、美國。

Telenomus cirphivorus Liu 粘蟲黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:436; ASZI et al., 1978:108; He et al., 1991:57; Liu et al., 1960:283-288; Lu, 1988:48-51; Lu et Lan, 1983:247; Wu et al., 1979:393)

Telenomus cirphivorus Liu, 1958:

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(卵)。

分 佈：福建、貴州、四川、江蘇、安徽、山東、北京、遼寧、吉林、黑龍江。

Telenomus (Aholcus) closterae Wu et Chen 楊扇舟蛾黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:431; Wu et Chen, 1980:83; Dang et Tong, 1990:174; Tian et al., 1993, 15(4):156; Wu et al., 1989:155; Xiao, 1985(2):27)

Telenomus (*Aholcus*) *closterae* Wu et Chen, 1980:83.

寄 主：*Clostera anachoreta* (Fabricius) 楊扇舟蛾(卵)

Clostera anastomosis (Linnaeus) 分月扇舟蛾(卵)

尺棲舟蛾

Dendrolimus spp. 松毛蟲

苧麻夜蛾。

分 佈：湖南、廣西、貴州、陝西、山東、河北、北京、黑龍江(海林)。

Telenomus (Aholcus) dalmani Ratzeburg 古毒蛾黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:429)

寄 主：古毒蛾(卵)。

分 佈：陝西；歐洲。

Telenomus dasychiri Chen et Wu 松茸毒蛾黑卵蜂 (Chen et Wu, 1981:111; Dang et Tong, 1990:178; Hun., 1992:1292; Lung et al., 1957:273-278; Tong et al., 1988:118-122; Wu et al., 1989:155; Xiao, 1985(2):27)

Telenomus dasychiri Chen et Wu, 1981:111.

寄 主：*Dasychira axutha* Collenette 松茸毒蛾(卵)

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Telenomus dazhulanensis Chen et Wu 大竹嵐黑卵蜂 (Chen et Wu, 1980:427)

Telenomus dazhulanensis Chen et Wu, 1980:427.

寄 主：芭蕉弄蝶(卵)。

分 佈：福建(大竹嵐)。

Telenomus (Aholcus) dendrolimusi Chu 松毛蟲黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:432; ASZI et al., 1978:108; Cheu, 1955:181; Chen et Wu, 1981:109; Chu, 1955:373-379; Dang et Tong, 1990:174; Du, 1987, 5(1,2):18; Fang, 1993:184-185; Hun., 1992:1292; Liu et Shih, 1957:257; Lung et al., 1957:262-273; Peng et al., 1984:39-47240; Su et al., 1986:36; Sun et Liu, 1958:235; Tong et al., 1988:118-122; Wang, 1960:381-394; Wang et al., 1956:271-285; Wu et Chen, 1980:79; Wu et al., 1989:155; Xiao, 1985(2):27; Zhang, 1987[ed.] 2:87)

Telenomus dendrolimusi Chu

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)(Chu, 1955:373-379; Hu, 1991:105; Liu et al., 1957:48; Lung et al., 1957:262-273; Wang, 1960:381-394)

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)

Dasychira axutha Collenette 松茸毒蛾(卵)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河南、河北、遼寧。

Telenomus dignoides Nixon 擬等腹黑卵蜂 (He et al., 1991:57)

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(卵)。

分 佈：臺灣。

Telenomus dignus Gahan 等腹黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:436; ASZI et al., 1978:108; He et al., 1991:57; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Li, 1989:91; Liu et Wang, 1982:24; Sun et al., 1980(4):22; Wang, 1987:79-83; Wu et al., 1979:393; Xia, 1957:299; Zhang, 1987[ed.] 2:86; Zhang et Zhao, 1986:215-219; Zhao, 1986:126)

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(卵)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西。

Telenomus (Aholcus) euproctidis Wilcox 茶毛蟲黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:429; Chen et al., 1999, 15(3):121; Dang

et Tong, 1990:175; Hun., 1992:1293; Ou et al., 1997, 13(4):145-150; Ou et al., 1998, 20(1):13-18; Wang, 1981, 24(4):384-389; Wang, 1990:176; Wu et Chen, 1980:79; Xiao, 1985(2):27)

Telenomus euproctidis Wilcox

別 名：*油茶毒蛾黑卵蜂*。

寄 主：*Euproctis conspersa* (Butler) 茶毛蟲(卵)

Euproctis angulata Matsumura 帶黃毒蛾(卵)

Euproctis varians Walker 幻帶毒蛾(卵)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、浙江、湖北；日本、印度。

Telenomus euxoae Wu et Chen 地老虎黑蜂 (Wu et Chen, 1985:147)

Telenomus euxoae Wu et Chen, 1985:147.

寄 主：*Euxoa segetum* (Schiffermüller) 黃地老虎(卵)。

分 佈：內蒙古(巴彥淖爾盟)。

Telenomus fengningensis Chen et Wu 豐寧黑卵蜂 (Chen et Wu, 1981:112; He et al., 1988:22; Wu et al., 1989:155; Xiao, 1985(2):27)

Telenomus fengningensis Chen et Wu, 1981:112.

寄 主：*Dendrolimus superans* (Bütler) 落葉松毛蟲

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)

Dendrolimus spectabilis (Bütler) 赤松毛蟲(卵)。

分 佈：河北、北京。

Telenomus funingensis Chen et Wu 撫寧黑卵蜂 (Chen et Wu, 1980:427-428)

Telenomus funingensis Chen et Wu, 1980:427-428.

寄 主：

分 佈：河北。

Telenomus gifuensis Ashmead 稻蝽小黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2,434; ASZI et al., 1978:109; He et al., 1991: 58; Qiao, 1989:45; Sun et al., 1984:110; Wu et al., 1979:393; Zhang, 1987[ed.] 2:86)

寄 主：*Scotinophara larida* (Bumeister) 稻黑蝽(卵)

稻褐蝽(卵)

稻綠蝽(卵)

Aelia sibirica 西北麥蝽

Piezodorus rubrofasciatus 小黃蝽(卵)

Eysarcoris ventralis 黑腹蝽(卵)

Dolycoris baccarum 細毛蝽(卵)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西。

Telenomus guangdongensis Chen et Liao 廣東黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:437; He et al., 1991:58; Lu et Lan, 1983:247; Wu et al., 1979:397)

Telenomus guangdongensis Chen et Liao, 1979:397.

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(卵)。

分 佈：廣東、貴州、四川、江蘇、山東、北京、遼寧、吉林、黑龍江。

Telenomus gynaephorae Chen et Wu 黃斑草毒蛾黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:437; Chen et Wu, 1979: 471)
寄 主：*Gynaephora alpherakii* Gr.-Gr. 黃斑草毒蛾(卵)(草原毛蟲)。
分 佈：青海(玉樹)。

Telenomus holcoceri Wu et Chen 蠹蛾黑卵蜂 (Wu et Chen, 1985:149)
Telenomus holcoceri Wu et Chen, 1985:149.
寄 主：*Holcocerus vicarius* Walker 榆木蠹蛾。
分 佈：山東。

Telenomus kolbei Mayr 舟蛾黑卵蜂 (Deng, 1995, 11(2):95; Feng et al., 1985:10; Chen, 1979:214; Dang et Tong, 1990:179)
寄 主：*Clostera anachoreta* (Fabricius) 楊扇舟蛾(卵)
Lampronodata cristata (Butler) 黃二星舟蛾
Leucoma salicis Linnaeus 楊毒蛾(卵)
柳毒蛾
Phalerre assimilis (Bremer et Grey) 櫟掌舟蛾
Phalera flavescens (Bremer et Grey) 舟形刺蛾(卵)
模毒蛾
刺槐尺蠖
茶蠶。
分 佈：安徽、湖北、陝西、河北、北京、黑龍江；蘇聯、西歐。

Telenomus laelia Wu et Huang 蘆毒蛾黑卵蜂 (Huang et al., 1993:94)
Telenomus laelia Wu et Huang, 1993:94.
寄 主：*Laelia coenosa candida* Leech 蘆毒蛾(卵)。
分 佈：湖南。

Telenomus (Aholcus) lebedae Chen et Tong 油茶枯葉蛾黑卵蜂 (Chen et Tong, 1980:310; Dang et Tong, 1990:176; Hun., 1992:1292; Tong et Lao, 1982 4(2):13-17; Tong et al., 1988:118-122; Wu et al., 1989:155; Xiao, 1985(2):27)
Telenomus (*Aholcus*) *lebedae* Chen et Tong, 1980:310-311.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)
Dendrolimus punctatus wenshanensis Tsai et Liu 文山松毛蟲
Lebeda nobilis Walker 油茶枯葉蛾
竹鏤舟蛾
Dasychira axutha Collenette 松茸毒蛾(卵)
Lymantria dissoluta 條毒蛾。
分 佈：湖南、廣東、雲南。

Telenomus manolus Nixon 四川黑卵蜂 (Chen, 1979:214)
寄 主：
分 佈：四川(成都)。

Telenomus (Aholcus) monodactylus Liu 柳扇舟蛾黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:432; Wu et Chen, 1980: 80)
Telenomus (*Aholcus*) *monodactylus* Liu
寄 主：*Pygaerarula* 柳扇舟蛾(卵)。
分 佈：雲南。

Telenomus (Aholcus) monticola Kieffer 古毒蛾黑卵蜂 (Wu et al., 1980:81)
Telenomus monticola Kieffer, 1913:4.
寄 主：*Orgyia antiqua* Linnaeus 古毒蛾(卵)。
分 佈：陝西。

Telenomus nitidulus Thomson 楊毒蛾黑卵蜂 (Chen, 1979:214; Dang et Tong, 1990:179)
寄 主：*Leucoma salicis* Linnnaeus 楊毒蛾(卵)。
分 佈：陝西、新疆；蒙古、蘇聯、中亞、西歐。

Telenomus ostriniae Chen et Wu 玉米螟黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:435; Wu et al., 1979:396)
Telenomus ostriniae Chen et Wu, 1979:396-397.
寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenee) 亞洲玉米螟(卵)。
分 佈：臺灣、四川、河南等省。

Telenomus othus Haliday 海南舟蛾黑卵蜂 (Chen, 1979:214; Dang et Tong, 1990:180)
寄 主：舟蛾。
分 佈：海南、陝西；蘇聯、中亞、英國、匈牙利、西歐、北歐。

Telenomus (Aholcus) parnarae Wu et Chen 稻苞蟲黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:433; Chou et al., 1994:328; He et al., 1991:57; Wu et Chen, 1980:80; Liu, 1987:148; Sun et al., 1980(4):22; Wu et al., 1979:395; Zhang, 1987[ed.] 2:86; Zhao, 1986:126)
Telenomus (*Aholcus*) *parnarae* Wu et Chen, 1979:395.
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(卵)
Parnara ganga Evans 曲紋稻苞蟲(卵)
Parnara naso bada (Moore) 么紋稻苞蟲(卵)
Borbo cinnara (Wallace) 臺灣秈弄蝶(卵)
Suastus gremius (Fabricius) 素弄蝶(黑星弄蝶)(卵)。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西。

Telenomus remus Nixon 槳黑卵蜂 (Chou, 1987:15)
Telenomus remus Nixon, 1937:471.
Telenomus sp. Chiu et al., 1978:62.
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。
國外：*Achaea janata*
Agrotis ypsilon
Agrotis spinifera
Autographa nigrisigna
Corcyra cephalonica

Elaphria chalcedonia
Elaphria festivoides
Feltia suberranea
Helicoverpa armigera
Helicoverpa zea
Mythina loreyi
Spodoptera dolichos
Spodoptera eridania
Spodoptera exigua
Spodoptera frugiperda
Spodoptera latifascia
Spodoptera littoralis
Spodoptera mauritia

分 佈：臺灣；馬來半島、沙勞越、新幾內亞、西薩摩亞。

Telenomus (Aholcus) rondotiae Wu et Chen 桑蟥黑卵蜂蜂 (ASZI, 1987, 2:433; Wu et Chen, 1980:82)

Telenomus (*Aholcus*) *rondotiae* Wu et Chen, 1980:82-83.

寄 主：*Rondotia menciana* Moore 桑蟥(卵)。

分 佈：浙江。

Telenomus rowani Gahan 長腹黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:436; ASZI et al., 1978:107; He et al., 1991:58; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Liu et Wang, 1982:24; Sun et al., 1980(4):22; Wu et al., 1979:393; Xia, 1957:300; Zhang, 1987[ed.] 2:86; Zhang et Zhao, 1986:215-219; Zhao, 1986:126)

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(卵)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(卵)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東。

Telenomus scirpophae Wu et Chen 白螟黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:434; Wu et al., 1979:395-396; Zhang, 1987[ed.] 2:87)

寄 主：*Scirpophaga excarptalis* (Walker) 白螟(卵)。

分 佈：江西、廣西、雲南、浙江、江蘇。

Telenomus sesamiae Wu et Chen 大螟黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:434; He et al., 1991:58; Wu et al., 1979: 393)

Telenomus sesamiae Wu et Chen, 1979:393-395.

寄 主：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟(卵)。

分 佈：福建、江西、廣東、四川、浙江、河南。

Telenomus (Aholcus) stigis Nixon 天蛾黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:430; Wu et Chen, 1980:80)

Telenomus stigis Nixon

寄 主：天蛾(卵)。

分 佈：海南。

Telenomus strelzovi Vassiliev 盲蝽黑卵蜂 (Chen, 1979:214)

寄 主：三點盲蝽。
分 佈：河南(安陽)。

Telenomus talaus Nixon (Chou et al., 1994:328)
Telenomus talaus Nixon
寄 主：*Byasa alcinous mansonensis* (Fruhstorfer) 鳳蝶
Papilio demoleus libanius Fruhstorfer 鳳蝶
Papilio memnon heronus Fruhstorfer 鳳蝶
Papilio polyctor thrasymedes Fruhstorfer 鳳蝶
Papilo xuthus Linnaeus 鳳蝶。
分 佈：臺灣。

Telenomus terbraus (Ratzeburg) 天幕毛蟲黑卵蜂 (Chen, 1979:214; Dang et Tong, 1990:181)
寄 主：*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲(卵)。
分 佈：陝西、山東、北京。

Telenomus tetratomus Thomson 落葉松毛蟲黑卵蜂 (Chen et Wu, 1981:110; Dang et Tong, 1990:181; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Wu et al.,1989:155; Xiao, 1985(2):27; Yang et Gu, 1995:224)
Telenomus tetatomus Thomson, 1860:174.
=*Telenomus gracilis* (Mayr), Kolomiets, 1962:136.
寄 主：*Dendrolimus superans sibiricus* Tschetverikov 落葉松毛蟲(卵)
Dendroimus spectabilis (Bütler) 赤松毛蟲(卵)
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)
Gastropacha quercifolia Linnaeus 李枯葉蛾(卵)
Macrothylacia rabi Linnaeus 雜灌枯葉蛾(卵)
Dasychira albodentata Bremer 白齒草毒蛾(卵)
Orgyia antiqua (Linnaeus) 古毒蛾(卵)
榆毒蛾。
分 佈：安徽、陝西、山東、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、大興安嶺北部、黑龍江；蘇聯(西伯利亞、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭)、西歐。

Telenomus (Aholcus) theophilae Wu et Chen 野蠶黑卵蜂 (ASZI, 1987, 2:431; Gao et Hu, 1993:183-184; Hu et al., 1987, 5(1,2):50; Liang et Hu, 1987, 5(1,2):51; Wu et al., 1980:81)
Telenomus (*Aholcus*) *theophilae* Wu et Chen, 1980:81-82.
寄 主：*Bombyx mandarina* (Moore) 野蠶(卵)(Chen et al.,1991:104; Hu, 1991:103)。
分 佈：浙江、北京。

Telenomus wengyuanensis Chen et Wu 翁源黑卵蜂 (Chen et Wu, 1980:428)
Telenomus wengyuanensis Chen et Wu, 1980:428-429.
寄 主：竹葉上蝶卵。
分 佈：廣東。

Telenomus sp. 禾灰翅夜蛾黑卵蜂 (He et al., 1991:58; Sun et al., 1980(4):23)

寄 主：禾灰翅夜蛾。
分 佈：廣東。

Telenomus sp. 稻苞蟲卵細蜂 (Xie, 1993, 9(1):20)
寄 主：稻苞蟲(卵)。
分 佈：福建。

Telenomus sp. 大稻緣蝽黑卵蜂 (He et al., 1991:58)
寄 主：大稻緣蝽(卵)。
分 佈：廣西。

Telenomus sp. 蛛緣蝽黑卵蜂 (He et al., 1991:58)
寄 主：大稻緣蝽(卵)。
分 佈：廣西。

Telenomus sp. 蛛緣蝽黑腿黑卵蜂 (He et al., 1991:58)
寄 主：蛛緣蝽(卵)。
分 佈：廣西。

Telenomus sp. 黃角黑卵蜂 (He et al., 1991:58)
寄 主：稻蝽(卵)。
分 佈：廣西。

Telenomus sp. 稻毛蟲黑卵蜂 (He et al., 1991:58)
寄 主：*Simura albovenosa* (Goeze) 稻毛蟲(卵)。
分 佈：廣西。

Telenomus sp. 稻眼蝶黑卵蜂(He et al., 1991:58)
寄 主：*Mycalesis gotama* 稻眼蝶(卵)。
分 佈：福建、廣西。

Telenomus sp. 針緣蝽黑卵蜂 (He et al., 1991:59; Zhang, 1987[ed.] 2:87)
寄 主：稻針緣蝽(卵)。
分 佈：江西。

Telenomus sp. 稻蝽黑卵蜂 (He et al., 1991:59)
寄 主：黃斑蝽(卵)。
分 佈：安徽。

Telenomus sp. 斜紋夜蛾黑卵蜂 (Chiu et al., 1978:62)
Telenomus sp. Chiu et al., 1978:62.
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。

分 佈：臺灣。

Telenomus sp. 鳳蝶黑卵蜂 (Lo et Wu, 1989:182)
寄 主：*Princeps demoleus libanius* Fruhstorfer 無尾鳳蝶(卵)。
分 佈：臺灣。

Trissolcus angustatus Thomson 黃胸黑卵蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:87)
寄 主：虻(卵)(稻田)。
分 佈：江西。

Trissolcus dricus Kozlov et Le 麻皮蝽溝卵蜂 (Dang et Tong, 1990:182)
寄 主：麻皮蝽。
分 佈：陝西；蘇聯。

Trissolcus flavipes (Thomson) 黃足溝卵蜂 (Dang et Tong, 1990:182)
寄 主：茶翅蝽
麻皮蝽。
分 佈：陝西；古北區。

Trissolcus kozlovi Rjachovsky 考氏溝卵蜂 (Dang et Tong, 1990:183)
寄 主：紅足真蝽(栗蝽)(卵)。
分 佈：陝西；蘇聯。

Trissolcus pseudoturesis (Rjachovsky) 扁盾蝽溝卵蜂 (Dang et Tong, 1990:183)
寄 主：顯頭扁盾蝽(卵)。
分 佈：陝西；蒙古、蘇聯、中亞。

Trissolcus simoni (Yin et al., 1994, 10(3):144)
寄 主：*Eurydema ornata* Linnaeus 甘藍蝽象(卵)。
分 佈：山西。

Trissolcus sp. 稻蝽溝卵蜂 (He et al., 1991:59; Sun et al., 1984:110; Zhang, 1987[ed.] 2:87; Zhao, 1986:126)
Telenomus mitsukurii, Xia, 1957: Misidentified.
寄 主：稻褐蝽(卵)
稻綠蝽(卵)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東。

Trissolcus sp. 擬稻蝽溝卵蜂 (He et al., 1991:59)
寄 主：稻蝽(卵)。
分 佈：廣西。

Trissolcus sp. 斑須蝽黑卵蜂 (Sun et al., 1984:111)

寄 主：*Dolycoris baccarum* (Linnaeus) 斑須蝽。

分 佈：廣東。

Trissolcus sp. 麗盾蝽卵蜂 (Wang et al., 1988:139)

寄 主：*Chrysocoris grandi* (Thunberg) 麗盾蝽(油桐)。

分 佈：廣西。

Trissolcus sp. 麻皮蝽溝卵蜂 (Chen, 1993:45)

寄 主：*Erthesina fullo* (Thunberg) 麻皮蝽

Hallyomorpha halys (Stål) 茶翅蝽。

分 佈：浙江。

Platygasteridae 扁腹細蜂科

Amitus hesperidum Silvestri 刺粉虱扁腹細蜂 (An et al., 1994:222; Chien et Chiu, 1986:277; Chiu et Lo, 1985:4; He et al., 1996(4):34; Huang, 1990[ed.]:205-206; Huang et Gao, 1996:172; Lin et al., 1975:55-61; Lo et Chiu, 1986:20; Yang, 1995(2):41; Zhang, 1987[ed.] 2:87)

Amitus hesperidum Silvestri

別 名：*刺粉蝨黑蜂*。

寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 柑橘刺粉虱(Song et Cai, 1991:107)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、山東；馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。

Amitus hesperidum variipes Silvestri 黑刺粉虱扁腹細蜂 (Shi et al., 1989-90:81; 1991:72)

Amitus hesperidum variipes Silvestri

寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 黑刺粉虱。

分 佈：上海。

Amitus longiconis Forster 長角扁腹細蜂 (Chen et al., 1999, 15(3):122; Li, 1993:355; Li et al., 1993:45-50)

寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 黑刺粉虱。

分 佈：湖南。

Platygaster oryzae Cameron 稻癭蚊扁腹黃細蜂 (He et al., 1991:59; Mo et al., 1985:159-162; Sun et al., 1980(4):22; Sun et al., 1084:110; Zhang, 1987[ed.] 2:87)

別 名：*稻癭蚊黃柄黑蜂*。

寄 主：*Pachydiplosis oryzae* (Wood-Mason) 稻癭蚊(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州。

Platygaster sp. 稻癭蚊單胚扁腹細蜂 (He et al., 1991:59; Liu et al., 1981:275)

別 名：*稻癭蚊單胚黑蜂*。

寄 主：*Pachydiplosis oryzae* (Wood-Mason) 稻癭蚊(蛹)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南。

Platygaster sp. 柳癭蚊廣腹細蜂 (Shi, 1990:185)

寄 主：柳癭蚊。

分 佈：河南。

Synopeas sp. 檬果癭蚊廣腹細蜂 (Xu et al., 1999, 21(4):172)

寄 主：*Erosomyia mangicola* Shi 檬果癭蚊。

分 佈：廣東。

Diapriidae 臺細蜂科(錘角細蜂科)

Pantoclis sp. 突顏錘角細蜂 (Zhang et al., 1995, 17(4):176)

寄 主：?小卷蛾卵。

分 佈：大興安嶺。

Trichopria sp. 廄螫蠅臺細蜂 (Guo et al., 1997, 13(3):106-109)

寄 主：*Stomoxys sitiens* 廄螫蠅。

分 佈：上海。

Ceraphronidae 圓細蜂科(分盾細蜂科)

Calliceras sp. 圓細蜂 (Chien et Chiu, 1985:347)

Calliceras sp., Chien et Chiu, 1985:347.

寄 主：*Apanteles plutellae* Kurdj. 小菜蛾絨繭蜂。

分 佈：臺灣。

Ceraphron manilae Ashmead 菲島圓細蜂 (ASZI, 1987, 2:438; ASZI et al., 1978:110; He et al., 1991:59; Hun., 1992:1293; Wang et al., 1998, 25(1)::20-26; Xie, 1993, 9(1):21; Zhang, 1987[ed.] 2:87; Zhao, 1986:126)

別 名：*菲島黑蜂，菲島分盾細蜂*。

寄 主：螟蛉懸繭益蜂(繭)

中華鈍唇益蜂

Cotesia plutellae Linnaeus 菜蛾絨繭蜂

縱捲葉螟絨繭蜂

螟蛉絨繭蜂(繭)

多絲絨繭蜂

Apanteles baoris 弄蝶絨繭蜂

螟蛉脊繭蜂(繭)

稻眼蝶脊蜂

螟蛉懸繭蜂(繭)

粘蟲懸繭蜂

縱捲葉螟長體繭蜂

稻苞蟲皺腰繭蜂

長體繭蜂(繭)
腫腿蜂(繭)
稻虱紅螯蜂(繭)
黑腹螯蜂
稻虱鄰螯蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Ceraphron nidae 長背圓蜂 (Gao, 1991:178)
寄 主：大豆蚜。
分 佈：吉林。

Ceraphron sp. 叉斜紋網蛾圓細蜂 (Chen, 1993:42)
寄 主：*Striglina bifida* Chu et Wang 叉斜紋網蛾。
分 佈：浙江。

Ceraphron sp. 化念圓細蜂 (He et al., 1991:60)
別 名：*化念分盾細蜂*。
寄 主：螟蛉絨繭蜂。
分 佈：雲南。

Ceraphron sp. 溫州圓細蜂 (He et al., 1991:60; Zhang, 1987[ed.] 2:87; Zhao, 1986:126)
別 名：*溫州黑黑蜂*，*溫州分盾細蜂*。
寄 主：螟蛉懸繭益蜂
稻毛蟲花繭益蜂
縱捲葉螟絨繭蜂
弄蝶絨繭蜂
螟蛉絨繭蜂
縱捲葉螟長體繭蜂
擬螟蛉絨繭蜂
螯蜂。
分 佈：江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、湖北。

Ceraphron sp. (Chen et Chiu, 1983:287)
Ceraphron sp., Chen et Chiu, 1983:287.
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)。
分 佈：臺灣。

Ceraphron sp. (Chen et Chiu, 1983:289)
Ceraphron sp., Chen et Chiu, 1983:289.
寄 主：Braconidae 繭蜂科(ex *Cnaphalocorcis medinalis* (Guenée))。
分 佈：臺灣。

Ceraphron sp. (Chen et Chiu, 1983:289)

Ceraphron sp., Chen et Chiu, 1983:289.

寄 主：Braconidae 繭蜂科(ex *Cnaphalocorcis medinalis* (Guenée))。

分 佈：臺灣。

Lygocerus koebelei Ashmead 長角圓細蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:87)

別 名：*長角黑蜂*。

寄 主：棉蚜繭蜂。

分 佈：江西。

Megaspilidae 痣細蜂科

Dendrocerus carpenteri (Curtis) 卡氏痣細蜂 (Liu et al., 1990:5; Shi et al., 1989-90:80)

Dendrocerus carpenteri (Curtis)

寄 主：*Myzus persicae* (Sulzer) 桃蚜。

分 佈：浙江、上海。

Dendrocerus (Atritomellus) leticeps Hedicke 黃足痣細蜂 (He et al., 1991:60; Li, 1988:183)

寄 主：*Sitobion avenae* (Fabricius) 麥長管蚜(重寄生)。

分 佈：福建、湖南、浙江。

Dendrocerus (Macrostigma) sp. 黑足痣細蜂 (He et al., 1991:60)

寄 主：*Sitobion avenae* (Fabricius) 麥長管蚜(重寄生)。

分 佈：湖南。

Dendrocerus sp. 痣細蜂 (Shi, 1980:216)

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜。

分 佈：上海。

Bethylidae 腫腿蜂科

Goniozus japonicus Ashmead 捲蛾腫腿蜂 (Dang et Shi, 1990:190; Tong, 1981(3):35)

寄 主：*Polychosis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小捲蛾。

分 佈：湖南、河南、山東；日本。

[**Goniozus legneri** Gordh 粉螟劈蜂 (Lee, 1992:193-199)]

寄 主：*Anagasta kuehniela* 地中海粉螟。

分 佈：加州。

Goniozus sp. 縱捲葉螟腫腿蜂 (He et al., 1991:62; Zhu, 1981(1-2):86)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟

Susumia exogia 稻顯紋縱捲葉螟。
寄生蜂：絨繭金小蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、湖北。

Goniozus sp. 三紋螟蛾腫腿蜂 (Chien et al., 1984:186)
Goniozus sp. Chien et al., 1984:186.
寄 主：*Hedylepta indicata* (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)。
分 佈：臺灣。

Goniozus sp. 廣東腫腿蜂 (He et al., 1991:62; Zhang, 1987[ed.] 2:87)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)。
分 佈：江西、廣東。

Scleroderma guani Xiao et Wu 管氏腫腿蜂 (Chen, 1989:76-84; Chen et al., 1996, 12(2):52-54; Cheng et al., 1989:145-148; Dang et Shi, 1990:189; Hun., 1992:1297; Li, 1988:88; Li et al., 1984:14-15; Li et al., 1994, 16(1):6-7; Qiu, 1999(1):8-11; Wei, 1990:116-117; Wen et al., 1996, 18(4):151-154; Xiao, 1985(2):27; Xiao et Wu, 1983:81-82; Xiao et al., 1983:81-83; Xu, 1985:24; Zhang, 1983:11-12; Zhang, 1984, 1:27-29; Zhang et al., 1982: ; Zhang et al., 1983:177-180; 1984:244-247; 1985, 1(4):39-40; Zhang et al., 1985, (21)3:328-330; Zhang et al., 1987, 3(3)::114-116; 1991:155, 117; 1985(3):31-41)
別 名：*杉天牛腿蜂*，*天牛腫腿蜂*。
寄 主：*Aromia bungii* 桃紅頸天牛
Asias halodendri (Pallas) 紅緣天牛
Chreonon fortunei Thomson 梨眼天牛
Monochmus alternatus 松墨天牛(傳播 *Bursaphelechus xylophilus* 松材線蟲)
Saperda populnea Linnaeus 青楊天牛
Semanotus bifasciatus sinoauster Gressitt 粗鞘雙條杉天牛(幼蟲、蛹)
Trichoferus campestris (Falder) 家茸天牛
Xylotrechus grayii White 咖啡虎天牛(金銀花 *Lonicera japonica* Thun-berg)
榆虎天牛
花椒天牛
吉丁蟲
Tenebrio molitor Linnaeus 黃粉甲
Kylorrhinus immixtus Motschulsky 檸條豆象
木蠹蛾。
分 佈：廣東、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、遼寧。

Scleroderma sichuanensis Xiao 川硬皮腫腿蜂 (Xiao, 1995, 8(Spec. Publ.):1-5; Yang et al., 1999, 15(3):140-141; Zhu et al., 1997, (3):50-54; 1997, (6):)
Scleroderma sichuanensis Xiao, 1995:
寄 主：*Semanotus sinoauster* Gressitt 粗鞘雙條杉天牛。
分 佈：四川。

Dryinidae 螯蜂科

Adryinus platycornis Xu et He 扁角異螯蜂 (Xu et He, 1995:307)

Adryinus platycornis Xu et He, 1995:307-308.

寄 主：

分 佈：廣東(廣州)。

Anteon baishanzhuense Xu et He 百山祖單爪螯蜂 (Xu et He, 1995:568)

Anteon baishanzhuense Xu et He, 1995:568-569.

寄 主：

分 佈：浙江。

Anteon biprocessum Xu et He 雙突單爪螯蜂 (Xu et He, 1997:107)

Anteon biprocessum Xu et He, 1997:107.

寄 主：

分 佈：貴州(梵凈山)。

Anteon cacumen Xu et He 山巔單爪螯蜂 (Xu et He, 1997:108)

Anteon cacumen Xu et He, 1997:108-109.

寄 主：

分 佈：貴州(梵凈山)。

Anteon chaoi Xu et He 趙氏單爪螯蜂 (Xu et He, 1997:106)

Anteon chaoi Xu et He, 1997:106-107.

寄 主：

分 佈：貴州(梵凈山)。

Anteon montanum Xu et He 山單螯蜂 (Xu et He, 1994:133)

Anteon montanum Xu et He, 1994:133-134.

寄 主：

分 佈：浙江(古田山)。

Anteon sylvaticum Xu et He 林棲單爪螯蜂 (Xu et He, 1997:108)

Anteon sylvaticum Xu et He, 1997:108.

寄 主：

分 佈：貴州(梵凈山)。

Aphelopus ochreus Olmi (Olmi, 1995:27)

Aphelopus ochreus Olmi, 1984:

寄 主：

分 佈：臺灣。

Aphelopus sabahnus Olmi (Olmi, 1995:27)

Aphelopus sabahnus Olmi, 1989:

寄 主：

分 佈：臺灣。

Chelogynus sp. 葉蟬黃足黑螯蜂 (He et al., 1991:60; Yang et al., 1982 4(2):7)

寄 主：*Nephotettix* spp.　黑尾葉蟬(若蟲、成蟲)。

分 佈：廣西。

Conganteon taiwanense Olmi 臺灣康螯蜂 (Olmi, 1995:25)

Conganteon taiwanense Olmi, 1989: (Meifen)

寄 主：

分 佈：臺灣。

Deinodryinus lini Olmi 林氏迪螯蜂 (Olmi, 1995:28)

Deinodryinus lini Olmi, 1995:28. ♂.

寄 主：

分 佈：臺灣(中部山區)。

Deinodryinus sinicus Olmi 秦迪螯蜂 (Olmi, 1995:29)

Deinodryinus sinicus Olmi, 1995:29. ♀.

寄 主：

分 佈：臺灣(大禹嶺)。

Dryinus olmii Xu et He 奧氏螯蜂 (Xu et He, 1994:132)

Dryinus olmii Xu et He, 1994:132-133.

寄 主：

分 佈：浙江(古田山)。

Dryinus sp. 斑衣蠟蟬螯蜂 (Shi, 1990:193; Dong, 1983:228-230)

寄 主：*Lycorma delicatula* White　斑衣蠟蟬(若蟲)。

分 佈：河南。

Echthrodelphax fairchildii Perkin 兩色益螯蜂 (ASZI et al., 1978:112; Guglielmino et Olmi, 1997:224, 225, 226; He et al., 1991:60; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Sun et al., 1980(4):22; Yang et al., 1982 4(2):3; Zhang, 1987[ed.] 2:87; Zhao, 1986:127)

Echthrodelphax fairchildii Perkin

=*Echthrodelphax bicolor* Esaki et Hashimoto

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål)　褐飛蝨

Sogatella furcefera (Horváth)　白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallén)　斑飛蝨

Saccharosydne procerus (Matusmura)　長綠飛蝨

Tarophagus proserpina (Kirkaldy)　飛蝨。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、吉林、黑龍江；日本。

Echthrodelphax rufus Olmi 赤益螯蜂 (Olmi, 1995:32)

Echthrodelphax rufus Olmi, 1984: ♀ ♂.

寄 主：
分 佈：臺灣(臺中)。

Epigonatopus sasakii Esaki et Hashimota 黑尾葉蟬前螯蜂 (He et al., 1991:62; Sun et al., 1984:110; Zhang, 1987[ed.] 2:87; Zhao, 1986:127)
寄 主：*Nephotettix* spp. 黑尾葉蟬(若蟲、成蟲)。
分 佈：江西、廣東、貴州、四川、浙江、安徽、湖北。

Fiorianteon choui Olmi 周氏惠螯蜂 (Olmi, 1995:20)
=*Fiorianteon rugosum* Olmi, 1989:128. partim ♂.
寄 主：
分 佈：臺灣(梅峰)。

Fiorianteon rugosum Olmi 皺惠螯蜂 (Olmi, 1995:22)
Fiorianteon rugosum Olmi, 1989:127. ♂.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Gonatopus camelinus Kieffer 駝色雙距螯蜂 (Xu et He, 1996, 18(3):126)
Gonatopus camelinus Kieffer, 1904:361.
寄 主：*Laodelphax striatella* (Fallen) 斑飛蝨。
分 佈：貴州。

Gonatopus flavifemur (Esaki et Hashimoto) 黃腿螯蜂 (Guglielmino et Olmi, 1977:224; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Sun et al., 1984:110; Xu et He, 1996, 18(3):125; Yang et al., 1982 4(2):4; Zhang, 1987[ed.] 2:87)
Pseudogonatopus flavifemur Esaki et Hashimoto
=*Dicondylus indicanus* Olmi, 1984:
Gonatopus flavifemur (Esaki et Hashimoto); Olmi, 1993:77.
別 名：*黃腿雙距螯蜂*。
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、貴州；菲律賓、馬來西亞、印度、日本。

Gonatopus hospes (Perkins) 僑雙距螯蜂 (Xu et He, 1996, 18(3):124)
Pseudogonatopus hospes Perkins, 1912:13.
=*Paragonatopus fulgori* (Nakagawa, 1906); Chen, 1985:43.
Gonatopus hospes (Perkins, 1912; Olmi, 1993:77.)
寄 主：Delphacidae 飛蝨科。
分 佈：貴州。

Gonatopus lini Olmi 林戈螯蜂 (Olmi, 1995:31)
Gonatopus lini Olmi, 1995:31. ♀.
寄 主：
分 佈：臺灣(基隆寶明寺)。

Gonatopus nudus (Perkins) 裸雙距螯蜂 (Guglielmino et Olmi, 1977:226; Xu et He, 1996, 18(3):127)

Pseudogonatopus nudus Perkins, 1912:12.
=*Pseudogonatopus sarawaki* Moczar, 1979:77.
Gonatopus nudus (Perkins, 1912); Olmi, 1993:77.
別 名：*黃帶黑腹螯蜂*。
寄 主：*Sogatella furcifera* (Horváth) 白背飛虱
Delphacidae 飛蝨科。
分 佈：臺灣、貴州；菲律賓。

Haplogonatopus apicalis Perkins 稻蝨紅螯蜂 (ASZI et al., 1978:111; Guglielmino et Olmi, 1997:225, 226; He et al., 1991:60; Luo et Zhuo, 1986:76; Sun et al., 1980(4):22; Xu et He, 1996, 18(3):128; Yang et al., 1982 4(2):2; Zhang, 1987[ed.] 2:87; Zhao, 1986:127)

Haplogonatopus apicalis Perkins, 1905:39.
=*Haplogonotopus orientalis* Rohwer
=*Haplogonatopus japonicus* Esaki et Hashimoto, 1931:25.
別 名：*稻蝨螯蜂*，*稻蝨褐螯蜂*，*稻蝨紅單節螯蜂*。
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)
Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨(若蟲、成蟲)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(若蟲、成蟲)
Tarophagus proserpina (Kirkaldy) 飛蝨。
重寄生蜂：粘蟲肩小蜂
絨繭金小蜂
毀螯跳小蜂
菲島分盾細蜂
白僵菌。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡。

Haplogonatopus atratus Esaki et Hashimoto 黑腹螯蜂 (ASZI et al., 1978:112; He et al., 1991: 61; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Sun et al., 1980(4):22; Yang et al., 1982 4(2):2; Zhang, 1987[ed.] 2:87; Zhao, 1986:127)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(成蟲，若蟲)
Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨(成蟲，若蟲)
Saccharosydne procerus (Matusmura) 長綠飛蝨。
重寄生蜂：粘蟲廣肩小蜂
絨繭金小蜂
毀螯跳小蜂
菲島分盾細蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、北京、遼寧、黑龍江；日本。

Haplogonatopus oratorius (Westwood) 黑腹單節螯蜂 (Xu et He, 1996, 18(3):129)

Gonatopus oratorius Westwood, 1833:496.
=*Haplogonatopus atratus* Esaki et Hashimoto, 1932:25.
Haplogonatopus oratorius (Westwood); Olmi et Currado, 1979:39.
別 名：*黑腹螯蜂，稻蝨黑腹螯蜂*。
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(成蟲，若蟲)。
分 佈：貴州。

Haplogonatopus solitarius Perkins 葉蟬螯蜂 (He et al., 1991:61; Yang et al., 1982 4(2):5)
寄 主：*Nephatettix* spp. 黑尾葉蟬
Inazuma dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛虱。
分 佈：廣西。

Haplogonatopus sp. 稻虱小黑螯蜂 (He, et al., 1991:61; Yang et al., 1982 4(2):3)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)
Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨(若蟲、成蟲)。
分 佈：廣西、雲南。

Lonchodryinus bimaculatus Xu et He 雙斑矛螯蜂 (Xu et He, 1994:128)
Lonchodryinus bimaculatus Xu et He, 1994:128-129.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

Lonchodryinus melaphelus Xu et He 黑滑矛螯蜂 (Xu et He, 1994:130)
Lonchodryinus melaphelus Xu et He, 1994:130-131.
寄 主：
分 佈：青海(門源)。

Lonchodryinus verticis Xu et He 山頂矛螯蜂 (Xu et He, 1994:129)
Lonchodryinus verticis Xu et He, 1994:129-130.
寄 主：
分 佈：貴州(梵淨山)。

Monogonatopus sp. 單螯蜂 (He et al., 1991:61)
寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)。
分 佈：臺灣。

Neodryinus taiwanensis Olmi 臺灣新螯蜂 (Olmi, 1995:30)
Neodryinus taiwanensis Olmi, 1995:30. ♀.
寄 主：
分 佈：臺灣(蓮花)。

Neogonatopus sp. 葉蟬新螯蜂 (He et al., 1991:61; Yang et al., 1982 4(2):6)

寄 主：*Nephotettix* spp. 黑尾葉蟬(若蟲、成蟲)

Inazuma dorsalis (Motschulsky) 電光葉蟬(若蟲、成蟲)。

分 佈：廣西。

Paragonatopus fulgori (Nakagawa) 稻蝨黑鄰螯蜂 (He et al., 1991:61; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987ed.(2):87; Zhao, 1986:127)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)

Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨(若蟲、成蟲)

Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨(若蟲、成蟲)。

重寄生蜂：毀螯跳小蜂

菲島分盾細蜂。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、北京。

Paragonatopus sp. 稻蝨大黑鄰螯蜂 (He, et al., 1991:61)

寄 主：*Sogatella furcefera* (Horváth) 白背飛蝨(若蟲、成蟲)

Laedelphax striatella (Falln) 斑飛蝨(若蟲、成蟲)

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)

擬褐飛蝨。

分 佈：廣西。

Pseudogonatopus lavifemur Esaki et Hashimota 黃腿螯蜂 (He et al., 1991:61; Zhao, 1986:127)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)

Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨(若蟲、成蟲)

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(若蟲、成蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Pseudogonatopus sp. 黃帶黑螯蜂 (He et al., 1991:61; Yang et al., 1982 4(2):5)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)

Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨(若蟲、成蟲)

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(若蟲、成蟲)

Nilaparvata bakeri (Muir) 擬褐飛蝨。

分 佈：廣西。

Pseudogonatopus sp. 稻蝨大黑螯蜂 (He et al., 1991:61; Yang et al., 1982 4(2):4)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲、成蟲)

Sogatella furcefera (Horváth) 白背飛蝨(若蟲、成蟲)

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(若蟲、成蟲)

Nilaparvata bakeri (Muir) 擬褐飛蝨(若蟲、成蟲)

Nilaparvata muiri China　僞褐飛蝨(若蟲、成蟲)。
分 佈：臺灣、廣西。

Sclerogibbidae 蜾蜂科

Caenosclerogibba sinica He 中華新蜾蜂 (He, 1984:318)
Caenosclerogibba sinica He, 1984:318-319.
寄 主：足絲蟻腹部環節之間，多寄生。
分 佈：廣西(南寧)。

Chrysididae 青蜂科

Praestochrysis shanghaiensis (Smith) 上海青蜂 (ASZI et al., 1978:112; Chen et al., 1993:145; He et Chen, 1987:184; Huang, 1990[ed.]:218; Hun., 1992:1297; Wu, 1993, 19(4):47-48; Xiao, 1985(2):27; Zhang, 1987[ed] 2:88)
Chrysis shanghaiensis Smith
寄 主：*Monema flavescens* Walker　黃刺蛾(幼蟲)
棗刺蛾。
分 佈：臺灣、江西、湖南、浙江、江蘇、上海、湖北、遼寧；日本、印度。
重寄生：*Eurytoma monemae* Rusch　刺蛾肩小蜂。

Chrysis sp. 青蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Diprion jinyuanensis*　靖遠松葉蜂(繭)
Neodiprion xianyunicus Xiao et Zhou　祥雲新松葉蜂(繭)。
分 佈：雲南、四川。

Cleptidae 尖胸青蜂科

Cleptes pinicola Lin 松葉蜂尖胸青蜂 (Lin, 1959, 12(3-4):205-208)
Cleptes pinicola Lin, 1959, 12(3-4):205-207.
寄 主：*Neodiprion japonica* Marlatt　松葉蜂(蛹)。
分 佈：臺灣。

Scoliidae 土蜂科

(Luo, 1981(1-2):95-98)

Campsomeris annulata (Fabricius) 白毛土蜂 (ASZI et al., 1978:115; Chen et al., 1993:144; Hun., 1992 1992: 1297; Wang, 1988:534; 1992:1370; Yunn., 1987 1987:1341; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
Campsomeris annulata (Fabricius, 1793:)
寄 主：大黑鰓金龜(幼蟲)
Anomala sp. 異麗金龜(幼蟲)
象甲(幼蟲)。
據記載實驗室還可寄生：方頭綠麗金龜(幼蟲)
櫻桃麗金龜

Anomala corputenta Motschulsky　銅綠金龜
日本麗金龜
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河北、北京；朝鮮、日本、菲律賓、印尼、印度、東南亞地區。

Campsomeris formosensis Betr. 臺灣長腹土蜂 (Hun., 1992:1298)
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、貴州、江蘇、上海。

Campsomeris phalerata Saussure 炫長腹土蜂 (Wang, 1992:1370; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
Campsomeris phalerata Saussure, 1858:
寄 主：
分 佈：江西、廣東、雲南、四川；印度、印尼、西里伯島。

Campsomeris prismatica (Smith) 金毛土蜂 (ASZI, 1987, 2:439; ASZI et al., 1978:115; Chen et al., 1993:144; Hun., 1992 1992:1298; Wang, 1988:534; Wang 1992:668; 1992:1370; Yunn., 1987:1342; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
Campsomeris prismatica (Smith, 1855:)
別 名：*金毛長腹土蜂*。
寄 主：方頭綠金龜(幼蟲)
櫻桃麗金龜(幼蟲)
銅色麗金龜(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東；朝鮮、日本、蘇聯、印度、印尼。

Campsomeris 4-fasciata Fabricius 四帶長腹土蜂 (Yunn., 1987:1341; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
寄 主：
分 佈：江西、廣東、雲南；菲律賓、馬來西亞、印尼、印度。

Campsomeris schulthersi Betrem 黑長腹土蜂 (Yunn., 1987:1342)
寄 主：
分 佈：廣西、雲南、四川、安徽；日本。

Campsomeris szetschwanensis Betrem 四川腹土蜂 (Wang, 1988:534)
寄 主：
分 佈：廣東、西藏、四川、浙江、安徽；日本、德國。

Scolia azurea rubiginosa Fabricius 褐赤土蜂 (Hun., 1992:1298; Yunn., 1987:1341)
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、安徽；越南、印尼。

Scolia clypeata Sickman 大斑土蜂 (ASZI, 1987, 2:440; ASZI, et al., 1978:114; Chen et al., 1993:145; Wang, 1978: 343-344)

寄 主：室內寄生：*Potosia* (*Liocola*) *brevitarsis* Lewis 白紋金龜(幼蟲)。
分 佈：四川、江蘇、安徽、山東、山西、河北、內蒙古；喜馬拉雅山脈、印度。

Scolia erythrosoma sikkimensis Micha 黑紅腹土蜂 (Hun., 1992:1299)
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：湖南、南海、貴州、雲南、安徽；馬六甲、印度、錫金。

Scolia histrionica (Fabricius) 黑體花斑土蜂 (ASZI, 1987, 2:442)
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：臺灣、江蘇、安徽、北京；日本、蘇聯、印尼。

Scolia japonica Smith 日本土蜂 (ASZI, 1987, 2:440; ASZI, et al., 1978:114; Hun., 1992:1299)
寄 主：油桐綠金龜(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、安徽、河南、山東、山西、河北、北京、甘肅、東北；朝鮮、日本、蘇聯。

Scolia 4-pustulata Fabricius 四點土蜂 (ASZI, 1987, 2:441; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
寄 主：室內寄生(北京)：
白紋銅花金龜(幼蟲)
蘋綠麗金龜(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、江蘇、上海、安徽、北京、吉林；日本、蘇聯。

Scolia oculata (Matsumura) 眼斑土蜂 (ASZI, 1987, 2:441; Wang, 1992:668)
寄 主：室內寄生(北京)
白紋銅花金龜(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、浙江、江蘇、湖北、山東、北京；朝鮮、日本、蘇聯。

Scolia ruficeps Smith 紅頭土蜂 (Hun., 1992:1299; Wang, 1992:668; Yunn., 1987:1341)
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：湖南、雲南、江蘇、安徽；越南、菲律賓、印尼。

Scolia sinensis Saussure 中華土蜂 (ASZI, 1987, 2:441; Hun., 1992:1300)
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：西藏、四川、湖南、浙江、江蘇、上海、山西、北京、東北地區；朝鮮、蘇聯。

Scolia superciliaeis Saussure 紅頭黑土蜂 (Hun., 1992:1300)
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、雲南、江蘇、上海、安徽、山西；越南。

Scolia vittifornis Sichel 黃葉帶土蜂 (ASZI, 1987, 2:442)
寄 主：金龜科(幼蟲)。

分 佈：江蘇、上海、安徽、河北、北京、東北；朝鮮、日本、蘇聯。

Scolia watanabei (Matsumura) 間色腹土蜂 (Hun., 1992:1300)
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、江蘇、上海、安徽、北京、吉林。

Tiphiidae 黑土蜂科

(Jiang, 1986:23-26; Lou, 1981:95-98; 1988:176-178; Sun, 1987:15-16)

Tiphia (Jaynesia) borealis Chen et Yang 北方黑土蜂 (Chen et Yang, 1990:253)
Tiphia (*Jaynesia*) *borealis* Chen et Yang, 1990:255.
寄 主：金龜科(幼蟲)。
分 佈：河南、陝西、寧夏、內蒙古(涼城、包頭、巴盟前旗、土左旗、烏前旗)。

Tiphia choui Chen et Yang 周氏黑土蜂 (Chen et Yang, 1991:116)
Tiphia choui Chen et Yang, 1991:116.
寄 主：
分 佈：陝西(太白山大殿)。

Tiphia communis A. et J. 普通鈎土蜂 (Mu et Niu, 1996, 18(2):71-73; Sun, 1987, 134):15-16)
寄 主：*Holoerichia trichophora* Fairmaire 毛黃鰓金龜(幼蟲)。
分 佈：浙江、江蘇、河南、山東、山西、河北、北京華。

Tiphia (s. str.) **mutata** Chen 多變黑土蜂 (Chen, 1995:108)
Tiphia (s. str.) *mutata* Chen, 1995:108.
寄 主：
分 佈：海南、雲南、安徽、山東。

Tiphia (s. str.) **oxycera** Chen et Yang 尖角黑土蜂 (Chen et Yang, 1990:256)
Tiphia (s. str.) *oxycera* Chen et Yang, 1990:256-257.
寄 主：
分 佈：內蒙古(哲盟)。

Tiphia phyllophagae A. et J. 弧麗福鰓鈎土蜂 (Luo et Jiang, 1996, 12(4):156-160)
寄 主：*Holotrichia parallela* Motschulsky 暗黑鰓金龜
Polillia atrocoerulea Bates 琉璃麗金龜
Popillia japonica Newman 日本麗金龜
Popillia quadriguttata Fabricius 四紋麗金龜
Popillia formosana Arrow 臺灣麗金龜。
分 佈：臺灣、山東。

Tiphia popilliavora Rohwer 弧麗鈎土蜂 (Luo et Jiang, 1996, 12(4):156-160)
寄 主：*Holotrichia oblita* Faldermann 華北大黑鰓金龜

(*Phyllophaga diomaphalia* Bates)
(*Phyllophaga* .sp.)。
分 佈：山東。

Tiphia (s. str.) **porata** Chen et Yang 具孔黑土蜂 (Chen et Yang, 1990:255)
Tiphia (s. str.) *portata* Chen et Yang, 1990:255.
寄 主：
分 佈：北京、內蒙古(固陽)、遼寧。

Tiphia retincisura Chen et Yang 網紋黑土蜂 (Chen et Yang, 1991:115)
Tiphia retincisura Chen et Yang, 1991:115.
寄 主：
分 佈：陜西(太白山蒿坪)。

Tiphia (s. str.) **yangi** Chen 楊氏黑土蜂 (Chen, 1995:106)
Tiphia (s. str.) *yangi* Chen, 1995:106.
寄 主：
分 佈：江西(牯嶺)、浙江(天目山)。

Tiphia sp. 黑土蜂 (Song et al., 1980(3):71-72)
Tiphia sp. Song et al., 1980(3):71.
寄 主：*Brahmina faldermanni* Kraatz 棕色鰓金龜
Holotrichia oblita (Faldermann) 大黑鰓金龜
Holotrichia titanis (Reit.) 暗黑鰓金龜。
分 佈：山東。

Sapygidae 寡毛土蜂

Sapyga coma Yasumatsu et Sugihara 叉唇寡毛土蜂 (Xu, 1994(2):26; Zhou, 1997(4):43)
寄 主：*Osmia excavata* Alfk. 凹唇壁蜂(果樹授粉蜂)
Osmia jacoti Ckll. 紫壁蜂 (果樹授粉蜂)。
分 佈：山東。

Formicidae 蟻科

Aphaenogaster sp. 小蟻 (Zhang, 1985:51; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
捕 食：*Eurostus validus* Dallas 碩蝽(卵)。
分 佈：江西。

Aphaenogaster sp. 盤腹蟻 (He et al., 1991:113)
捕 食：稻飛蝨。
分 佈：福建。

Camponotus compressus Fabricius 側扁木工蟻 (He et al., 1991:113)
捕 食：稻飛虱。
分 佈：福建。

Camponotus herculeanus japonicus Mayr 黑大蟻 (Tsai et al., 1979:49)
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：安徽。

Camponotus herculeanus obscuripes Mayr 黑螞蟻 (Guangdong, Foshan Area FSI., 1975, 12(3):44-45; Xu, 1985:24)
捕 食：杉天牛(卵、幼蟲)。
分 佈：長江以南。

Camponotus japonicus 日本弓背蟻 (Liu et Gu, 1996, 18(4):187; Wang, 1991, 4(4):405-408; Wu et al., 1989:172-173; Xiao et al., 1991:123)
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
Hemichroa crocea (Geoffroy) 紅黃半皮葉蜂。
分 佈：四川。

Camponotus pseudolendus 擬哀弓背蟻 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
捕 食：*Neodiprion xianyunicus* 祥雲新松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：

Camponotus sp. 木工蟻 (He et al., 1991:113)
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)。
分 佈：福建、湖南。

Cataulacus sp. 溝切葉蟻 (He et al., 1991:113)
捕 食：稻飛蝨。
分 佈：福建。

Cremastogaster artifex Mayr 圓梗舉腹蟻 (Hun., 1992:1307; Liu et al., 1999, 21(3):99; Wu et al., 1989:174-175; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):187)
別 名：*角柄舉腹蟻，黑褐舉腹蟻*。
捕 食：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木麻黃)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)
松茸毒蛾(蛹)
松針毒蛾
袋蛾。
分 佈：湖南、廣東、廣西；緬甸、斯里蘭卡。

Cremastogaster sp. 穴莖蟻 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
捕 食：*Neodiprion xianyunicus* 祥雲新松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：

Formica approkimans 類幹紅蟻 (Liu et Gu, 1996, 18(4):188)
捕 食：油松毛蟲。
分 佈：北京。

Formica fusca japonica Motschulsky 日本綠光褐蟻 (He et al., 1991:113)
捕 食：稻飛蝨
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟。
分 佈：湖南。

Formica japonica Motschulsky 日本黑褐蟻 (Huo et al., 1985, 5(4):243-245; Liu et Gu, 1996, 18(4):187; Wu et al., 1989:173-174; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
捕 食：*Neodiprion xianyunicus* 祥雲新松葉蜂(幼蟲)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：安徽。

Formica lemani Boadroit 黃褐情蟻 (Huo et al., 1983:243-245; Xiao, 1985(2):29; Yue, 1989:164-165)
Formica lemani Boadroit, 1917:
捕 食：*Matsucoccus matsumurae* (Kuwana) 松幹蚧(成蟲)。
分 佈：山東。

Formica sanguinea Latreille 血紅蟻 (Xiao et al., 1991:30)
捕 食：*Cephalcia lariciphila* (Wachtl) 落葉松腮扁葉蜂。
分 佈：河北

Formica superba Wheeler 紅胸黑斑蟻 (Xiao et al., 1991:30)
捕 食：*Cephalcia lariciphila* (Wachtl) 落葉松腮扁葉蜂。
分 佈：河北

Formica traskaucasia Wasonov 高加索蟻 (Xiao et al., 1991:30)
捕 食：*Cephalcia lariciphila* (Wachtl) 落葉松腮扁葉蜂。
分 佈：河北

Formica sp. 蟻 (Tian et al., 1993, 15(4):156)
Formica sp. Tian et al., 1993:156.
捕 食：*Clostera anastomosis* (Linnaeus) 分月扇舟蛾(卵、幼蟲)。
分 佈：黑龍江(哈爾濱、海林)

Iridomyrmex anceps (Roger) 扁平虹臭蟻 (Hun., 1992:1310; Liu et Gu, 1996, 18(4):187; Wu et al., 1989:174)

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、上海、安徽；馬來西亞、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Iridomyrmax sp. (He et al., 1991:113)

捕 食：*Nephotettix* spp. 黑尾葉蟬。

分 佈：臺灣。

Lasius fuliginosus Latreille 黑草蟻 (He et al., 1991:114)

捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。

分 佈：湖南。

Lasius niger (Linnaeus) 黑毛蟻 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

捕 食：*Neodiprion xianyunicus* 祥雲新松葉蜂(幼蟲)。

分 佈：

Monomorium sagei Forel 塞氏小黃蟻 (He et al., 1991:114)

捕 食：稻飛蝨。

分 佈：福建。

Oecophylla smaragdina Fabricius 紅樹蟻 (ASZI,1987, 2:517; ASZI et al., 1978:116; Chen, 1962:401-408; Chen et al., 1994:58; Cheng, 1981, 8(1):24; Li, 1997, 34(2):103-105; Pu, 1986, 8(3):175; Yang, 1982, (3):102-105; Yang, 1984:240-243; Yang, 1999, 21(4):186-187)

別 名：*織葉黃柑蟻，黃掠蟻，黃柑蟻*。

捕 食：*Rhynchocoris humeralis* Thunberg 大綠蝽
杉天牛(卵、幼蟲)
Podagricomela nigricollis Chen 潛葉甲
Hypomeaes squamosus Fabricius 粉綠象甲
Anomala cupripes Hope 銅綠金龜。

分 佈：江西、湖南、廣東、浙江、湖北；馬來西亞、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、印尼、澳洲。

Paratrechina longicornis Latreille 長角狂蟻 (He et al., 1991:114)

捕 食：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟。

分 佈：貴州。

Pheidole nodus Smith 寬結大頭蟻 (He et al., 1991:114; Hun., 1992:1305)

別 名：*小大頭蟻*。

捕 食：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲、卵)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、上海、山東、北京；日本、印度。

Pheidole rinac tipuna Forc 大頭蟻 (He et al., 1991:114)

捕 食：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟。
分 佈：貴州。

Plagiolepis rothneyi Forel 羅思尼氏斜結蟻 (Hun., 1992:1312)

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
多種鱗翅目初齡幼蟲。
分 佈：湖南、廣東；印度、孟加拉。

Polyrhachis affinis Smith 鼎突多刺蟻 (He et al., 1991:114)

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：湖南。

Polyrhachis dives Smith 雙齒多刺蟻 (Hun., 1992:1316; Liu et Gu, 1996, 18(4):187; Wu et al., 1989:173; Xiao, 1985(2):29; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
Diprion liuwanensis 六萬松葉蜂(幼蟲)。
分 佈：湖南、華南地區；菲律賓、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、澳洲。

Polyrhachis lamelidens Smith 赤胸多刺蟻 (He, et al., 1991:114)

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
螟蟲(幼蟲)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：湖南。

Polyrhachis vicina Roger 鼎突多刺蟻 (ASZI, 1987, 2:518; Liu et Gu, 1996, 18(4):188; Tang et al., 1993:164)

別 名：*黑刺蟻*。
捕 食：*Dendrolimus* spp. 松毛蟲(幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
稻薊馬(若蟲)。
分 佈：廣東、廣西、浙江；緬甸。

Polyrhachis sp. 多刺蟻 (Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Zhang et Li, 1982:228)

捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲。
分 佈：浙江、大興安嶺北部。

Polyrhachis spp. 蟻 (Xiao et al., 1991:121)

捕 食：*Trichiocampus cannabis* Xiao et Huang　大麻毛怪葉蜂。

分 佈：安徽。

Polyrhachis spp. 大黑蟻 (Yue, 1989:165-167)

捕 食：*Dendrolimus punctata* (Walker)　馬尾松毛蟲。

分 佈：廣東、廣西。

Pristomyrmex pungens Mayr 雙針蟻 (Tsai et al., 1979:49)

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker)　馬尾松毛蟲。

分 佈：安徽。

Technomyrmex gibbosus Wheeler 棕色小蟻 (Xu, 1985:25)

捕 食：天牛(卵、幼蟲)。

分 佈：江西、浙江、安徽、湖北、山東。

Tetramorium guineense Fabricius 紅螞 (ASZI, 1987, 2:518; ASZI et al., 1978:117; Cheng, 1981, 8(1):24; He et al., 1991:114; Liu, 1991:29; Lo, 1997:58;)

別 名：*紅螞蟻，竹筒蟻*。

捕 食：稻飛蝨

Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟

Chilo infuscatellus (Snellen)　甘蔗二點螟(臺灣)

Proceras venosata Walker　高粱條螟(臺灣)

Tetramoera schistaceana (Snellen)　甘蔗小捲蛾(黃螟)(臺灣)

Sesamia inferens (Walker)　大螟(臺灣)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、江蘇；日本、新加坡、印度、幾內亞、南非、印尼、新喀里多尼亞、夏威夷。

Tetramorium nursei Bingham 紐氏路舍蟻 (He et al., 1991:114)

捕 食：稻飛蝨。

分 佈：福建。

Vollenhovia sp. 黃色蟻 (Song et Cai, 1991:107)

捕 食：*Contarinia* sp.　茉莉花癭蚊。

分 佈：湖南。

Vespidae 胡蜂科

Eumeniinae 蜾蠃亞科

Allodynerus mandschuricus Bluthgen 寬全盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:454; Li, 1992:675)

捕 食 性。
分 佈:：湖南、貴州、內蒙古、遼寧。

Allorhynchius argentatum (Fabricius) 黑異喙蜾蠃 (Li, 1985:139; Yunn., 1987:1357)
Allorhynchius argentatum (Fabricius), 1804:260.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇；印尼、印度。

Allorhynchium chinensis (Saussure) 中華異喙蜾蠃 (Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:139; 1992:675; Yunn., 1987:1357)
Allorhynchium chinensis (Saussure), 1862:186.
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、貴州、雲南、四川。

Ancistrocerus antoni (Cameron) 黑溝蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:455; Hun., 1992:1321; Lee, 1988:541; Li, 1992: 675; Yunn., 1987:1355)
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏(墨脫格當)、四川、浙江。

Ancistrocerus parietinus (Linnaeus) 墻溝蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:456; Lee, 1988:541; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:118)
Ancistrocerus parietinus (Linnaeus), 1761:418.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密扎木)、四川、河北、東北；歐洲、北美。

Ancistrocerus parietus (Linnaeus) 川溝蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:455; Lee, 1996:291; Li, 1985:119)
Ancistrocerus parietus (Linnaeus, 1758:572.)
捕 食 性。
分 佈：四川、河北、新疆、東北；法國、歐洲、北美。

Ancistrocerus waltoni (Meade-waldo) 高原溝蜾蠃 (Lee, 1982:376; Li, 1985:118)
Ancistrocerus waltoni (Meade-waldo), 1910:104.
捕 食 性。
分 佈：雲南(江孜)、西藏；錫金。

Antepipona biguttata (Fabricius) 橢圓喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:453; Lee, 1981:198; Li, 1985:131; Li et al., 1990:131; Yunn., 1987:1356; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Antepipona biguttata (Fabricius), 1787:291.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、浙江；印度、斯里蘭卡。

Antepipona bipustulatus (Saussure) 畢喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:452; Yunn., 1987:1356)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Antepipona deflenda deflenda (S. S. Saunders) 巧啄蜾蠃 (Li, 1985:130)

Antepipona deflenda deflenda (S. S. Saunders), 1853:141.
捕 食 性。
分 佈：新疆；亞洲北部、歐洲中、南部。

Antepipona deflenda lepeletieri (Blüthgen) 平喙蜾蠃 (Li, 1985:130)
Antepipona deflenda lepeletieri (Blüthgen), 1841:631.
捕 食 性。
分 佈：河北；北非、歐洲、美洲。

Antepipona fragilis (Smith) 脆喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:452; Li, 1985:129; Yunn., 1987:1357)
Antepipona fragilis (Smith), 1857:61.
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南；緬甸、印度、印尼。

Antepipona rufescens (Smith) 淡喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:452; Yunn., 1987:1356)
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南、四川、河北；印尼。

Anterhynchium abdominale bengalense (Saussure) 孟加拉緣蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:451)
捕 食 性。
分 佈：廣西；孟加拉。

Anterhynchium (Dirhynchium) flavomarginatum flavomarginatum (Smith) 黃緣蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:451; Hun., 1992:1321; Lee, 1981:198; 1982:376; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:133; 1992:676; Li, et al., 1990:127; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Anterhynchium flavomarginatum (Smith), 1852:36.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、河北、遼寧、黑龍江；蒙古、印度、錫金。

Antodynerus limbatum (Saussure) 緣代盾蜾蠃 (Lee, 1988:541; Li, 1985:141; Yunn., 1987:1357, 1361)
Antodynerus limbatum (Saussure), 1852:117.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：雲南、西藏(墨脫背崩)、四川；馬達加斯加、非洲。

Coeleumenes burmanicus (Bingham) 斑柄蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:456; Li, 1985:114)
Coeleumenes burmanicus (Bingham), 1897:350.
捕 食 性。
分 佈：浙江；越南、馬來西亞、泰國、印度、錫金、斯里蘭卡。

Cyrtolabulus exiguus (Saussure) 簡細蜾蠃 (Li, 1985:89)
Cyrtolabulus exiguus (Saussure), 1853:237.
捕 食 性。
分 佈：廣東；亞洲、埃及、非洲。

Cyrtolabulus yunnanensis Lee 雲南細蜾蠃 (Li, 1985:90; Yunn., 1987:1354, 1359)

Cyrtolabulus yunnanensis Lee, 1982:83.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：廣東、雲南。

Delta campaniforme esuriens (Fabricius) 原野華麗蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:459; Lee, 1981:198; Li, 1985:108; Li et al., 1990:129; Yunn., 1987:1355; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Delta campaniforme esuriens (Fabricius), 1787:293.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、浙江；緬甸、印度、伊朗、沙特阿拉伯。

Delta companifrome gracile (Saussure) 黃盾華麗蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:459; Lee, 1982:376; Li, 1985:107; Yunn., 1987:1355; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Delta companifrome gracile (Saussure), 1852:57.

捕 食 性。

分 佈：江西、雲南、西藏；埃及、葉門、索馬里蘭、塞內加爾、非洲。

Delta conoideum (Gmelin) 銹色華麗蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:458; Li, 1985:105; Yunn., 1987:1355)

Delta conoideum (Gmelin)

捕 食 性。

分 佈：雲南；埃及、利比亞。

Delta petiolata (Fabricius) 大華麗蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:458; Lee, 1981:198; Li, 1985:106; Yunn., 1987:1355)

Delta petiolata (Fabricius), 1781:278.

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南；馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Dirhynchium flavomarginatum curvilineatum (Cameron) 常代喙蜾蠃 (Li, 1985:132; Yunn., 1987:1356, 1360; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：江西、廣西、雲南。

Discoelius japonicus Perez 日本元蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:460; Hun., 1992:1321; Lee, 1981:198; Li, 1985:81; Li et al., 1990:129; Yao et al., 1995:577; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Discoelius japonicus Perez, 1905:25, 85.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、浙江；日本。

Discoelius manchurianus Yasumatsu 東北元蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:460; Li, 1985:82)

Discoelius manchurianus Yasumatsu, 1934:3, 11.

捕 食 性。

分 佈：遼寧。

Epsilon fujianensis Lee 福建埃蜾蠃 (Lee, 1981:198; Li, 1985:134)

Epsilon fujianensis Lee, 1981:198.

捕 食 性。

分 佈：福建、四川。

Eumenes (s. str.) **buddha** Cameron 布蜾蠃 (Li, 1985:96; Yunn., 1987:1354, 1360)

Eumenes (s. str.) *buddha* Cameron, 1896:86.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：雲南；印度。

Eumenes (s. str.) **coarctatus coarctatus** (Linnaeus) 北方蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:444; Li, 1982 4(4): 56)

Eumenes coarctatus (Linnaeus), 1758:573.

捕 食 性。

分 佈：四川、江蘇、黑龍江；羅馬尼亞、捷克、西班牙、法國、瑞士、意大利、德國、瑞典、芬蘭。

Eumenes (s. str.) **coronatus coronatus** (Panzer) 冠蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:444; Li, 1985:99; Yunn., 1987:1354; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Eumenes coronatus (Panzer), 1799:12.

捕 食 性。

分 佈：江西、雲南、江蘇；波蘭、意大利、芬蘭。

Eumenes (**Oreumenes**) **decoratus** Smith 鑲黃蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:444; He et al., 1991:113; Hun., 1992:1321; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:92; 1992:674; Yao et al., 1995:577; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Eumenes decoratus Smith, 1852:36.

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟。

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、山東、山西、河北、遼寧、吉林；朝鮮、日本。

Eumenes (s. str.) **fraterculus** Dalla Torre 孿蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:445; Li, 1985:100)

Eumenes fraterculus Dalla Torre, 1873:195.

捕 食 性。

分 佈：浙江、江蘇、河北、新疆、黑龍江；日本。

Eumenes (s. str.) **labiatus sinicus** Giodani et Soika 中華唇蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:445; Hun., 1992:1322; Lee, 1981:198; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:102; 1992:675; Li et al., 1990:133; Yao et al., 1995:577; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Eumenes (s. str.) *labiatus sinicus* Giordani et Soika, 1941:141.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇；亞洲、歐洲、北非。

Eumenes (s. str.) **mediterraneus mediterraneus** Kriechbaumer 陸蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:446; Lee, 1996:291; Li, 1985:98; Yunn., 1987:1354)

Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879:95.

捕 食 性。

分 佈：雲南、江蘇、山東、山西、河北、新疆、吉林、黑龍江；土耳其、埃及、摩洛哥、阿爾巴尼亞、保加利亞、意大利。

Eumenes (s. str.) **micado** Cameron 米蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:447; Li, 1985:97)

Eumenes (s. str.) *micado* Cameron, 1904:35.

捕 食 性。

分 佈：河北；日本。

Eumenes (s. str.) **pedunculatus pedunculatus** (Panzer) 基蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:445; Li, 19824(4):56; Li, 1985:104)

Eumenes pedunculatus (Panzer), 1799:8.

捕 食 性。

分 佈：四川、浙江、江蘇、黑龍江；西班牙、捷克、波蘭、瑞典、芬蘭。

Eumenes (s. str.) **pomiformis pomiformis** (Fabricius) 點蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:447; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:101)

Eumenes pomiformis (Fabricius), 1781:467.

捕 食 性。

分 佈：四川、江蘇、河南、山東、河北、新疆；歐洲、非洲。

Eumenes (s. str.) **punctatus** Saussure 孔蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:445; Hun., 1992:1322; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:94)

Eumenes punctatus Saussure, 1852:37.

捕 食 性。

分 佈：湖南、四川、江蘇、河北、東北地區。

Eumenes (s. str.) **quadratus** Smith 方蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:447; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:95; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Eumenes quadratus Smith, 1852:37.

捕 食 性。

分 佈：江西、四川、浙江、江蘇、山東、河北；日本。

Eumenes (s. str.) **quadratus urainus** (Sonan) 天蜾蠃 (Li, 1992:675)

捕 食 性。

分 佈：湖南、雲南、四川。

Eumenes (s. str.) **rubronotatus** Perez 顯蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:446; Li, 1985:93; 1992:675)

Eumenes (s. str.) *rubronotatus* Perez, 1905:25, 85.

捕 食 性。

分 佈：貴州、四川、浙江、江蘇；日本。

Eumenes (s. str.) **species** Cameron 種蜾蠃 (Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:97; 1992:675; Yunn., 1987:1354, 1359)

Eumenes species Cameron

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：雲南、四川、浙江、湖北。

Eumenes (s. str.) **tosawae** Giordani Soika 多蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:444; Li, 1992:675; Yunn., 1987:1354)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、遼寧。

Eumenes (s. str.) **tripunctatus** (Christ) 三斑蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:447; Lee, 1996:291; Li, 1985:91)

Eumenes tripunctatus (Christ), 1791:317.

捕 食 性。

分 佈：新疆、內蒙古；亞洲(北部)。

Eumenes sp. 蜾蠃 (Chen, 1996, 18(1):21)

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Euodynerus (s. str.) **caspicus caspicus** (Morawitz) 卡佳盾蜾蠃 (Li, 1985:152)

Euodynerus caspicus (Morawitz), 1873:295.

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Euodynerus (s. str.) **dantici dantici** (Rossi) 單佳盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:449; Lee, 1996:292; Li, 1985:151)

Euodynerus dantici (Rossi), 1790:89.

捕 食 性。

分 佈：浙江、江蘇、河北、甘肅、新疆；日本。

Euodynerus (Pareuodynerus) nipanicus (Schulthess) 日本佳盾蜾蠃 (Li, 1982 4(4):56; Yunn., 1987:1357, 1361)

Euodynerus (Pareuodynerus) nipanicus (Schulthess), 1908:287.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；日本。

Euodynerus (Pareuodynerus) notatus notatus (Jurine) 顯佳盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:450; Hun., 1992:1322; Li, 1985:148; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Euodynerus notatus (Jurine), 1807:170.

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、江蘇；日本、土耳其、歐洲。

Euodynerus posticus posticus (Herrich-Schaeffer) 後佳盾蜾蠃 (Li, 1985:149)

Euodynerus posticus (Herrich-Schaeffer), 1841:pl. 9.

捕 食 性。

分 佈：黑龍江；意大利、德國。

Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus quadrifasciatus (Fabricius) 四帶佳盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:450; Li, 1985:146)

Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius), 1793:266.

捕 食 性。
分 佈：河北、黑龍江；蘇聯、土耳其、歐洲(中部、北部)。

Euodynerus trilobus (Fabricius) 三葉佳盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:449; Li, 1985:147)
Euodynerus trilobus (Fabricius), 1787:290.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江、江蘇；緬甸、印度、錫金、印尼。

Euodynerus (s. str.) **variegatus kruegeri** (Schulthess) 英佳盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:449; Li, 1985:150; Li et al., 1990: 130; Zhang, 1987[ed.] 2:90)
Euodynerus variegatus kruegeri (Schulthess), 1928:77.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：江西、廣東、廣西、浙江、江蘇、河北、黑龍江；意大利。

Jucancistrocerus tachkensis (Dalla Torre) 塔胡蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:456; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:124)
Jucancistrocerus tachkensis (Dalla Torre), 1889:125.
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江、江蘇、河北、印度。

Katamenes arbustorum arbustorum (Panzer) 樹黃斑蜾蠃 (Li, 1985:110)
Katamenes arbustorum (Panzer), 1799:5.
捕 食 性。
分 佈：越南、歐洲中南部、澳洲。

Katamenes indetonsus (Morawitz) 藏黃斑蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:458; Lee, 1982:375; Li, 1985:109)
Katamenes indetonsus (Morawitz), 1895:416.
捕 食 性。
分 佈：西藏(聶拉木、當雄)；錫金、斯里蘭卡、土耳其、澳洲。

Katamenes sesquicinctus sesquicinctus (Lichtenstein) 斷帶黃斑蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:458; Li, 1985:111)
Katamenes sesquicinctus (Lichtenstein), 1796:202.
捕 食 性。
分 佈：山東、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；亞洲(中部、東部)。

Labus humbertianus Saussure 土裸蠃 (Li et al., 1990:133)
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：廣西。

Odynerus diffinis Saussure 丫紋蜾蠃 (He et al., 1991:113)
捕 食：稻田害蟲。
分 佈：湖南。

Odynerus melanocephalus melanocephalus (Gmelin) 條腹盾蜾蠃 (Li, 1985:138)
Odynerus melanocephalus (Gmelin), 1790:2760.

捕 食 性。
分 佈：吉林；土耳其、伊朗、以色列。

Orancistrocerus aterrimus aterrimus (Saussure) 墨體胸蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:453; Hun., 1992:1322; Lee, 1981:198; Li, 1982 4(4):56; Li et al., 1990:134; Yunn., 1987:1356)
Orancistrocerus aterrimus (Saussure), 1852:121, 128.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、四川、江蘇、安徽。

Orancistrocerus aterrimus erythropus (Bingham) 黃額胸蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:454; Hun., 1992:1323; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:121; Yunn., 1987:1356)
Orancistrocerus aterrimus erythropus (Bingham), 1897:353.
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西、雲南、四川、湖南、浙江；泰國、緬甸、印度。

Orancistrocerus drewseni drewseni (Saussure) 黑胸蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:453; Hun., 1992:1323; Lee, 1981:198; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:123; Zhang, 1987[ed.] 2:90)
Orancistrocerus drewseni (Saussure), 1857:318.
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、山東、河北；日本。

Orancistrocerus drewseni opulentissimus (Giordani Soika) 麗胸蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:454; Li, 1985:122; Zhang, 1987[ed.] 2:90)
Orancistrocerus drewseni opulentissimus (Giordani Soika), 11941:238.
捕 食 性。
分 佈：江西、江蘇。

Pararrhynchium ornatum ornatum (Smith) 麗旁喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:455; Hun., 1992:1323; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:126)
Pararyrhynchium ornatum (Smith), 1852:36.
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川；日本。

Pararrhynchium ornatum guangxiensis Lee 廣西旁喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:454)
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Pararrhynchium ornatum infrenis Giordani Soika 前旁喙蜾蠃 (Li, 1985:128; Zhang, 1987[ed.] 2:90)
Pararrhynchium ornatum infrenis Giordani Soika, 1973:121.
捕 食 性。
分 佈：江西、江蘇、河北。

Pararrhynchium sinense (Schulthess) 華旁喙蜾蠃 (Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:127)
Pararrhynchium sinense (Schulthess)

捕 食 性。
分 佈：四川。

Pararrhynchium smithii (Saussure) 斯旁喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:455; Hun., 1992:1323; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:125; Yao et al., 1995:577)
Pararrhynchium smithii (Saussure), 1855:174.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、四川、浙江、江蘇。

Pareumenes (s. str.) **curvatus** Saussure 黑秀蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:461; Li, 1985:83; Yunn., 1987:1353; Zhang, 1987[ed.] 2:90)
Pareumenes curvatus Saussure, 1854:145.
捕 食 性。
分 佈：江西、雲南；菲律賓、緬甸。

Pareumenes (s. str.) **quadrispinosus acutus** Liu 棘秀蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:460; Lee, 1988:541; Li, 1985:87; Yunn., 1987:1353)
Pareumenes (s. str.) *quadrispinosus acutus* Liu, 1941:262-265.
捕 食 性。
分 佈：廣東、雲南、西藏(墨脫背崩)。

Pareumenes (s. str.) **quadrispinosus chinensis** Liu 中華秀蜾蠃 (Zhang, 1987[ed.] 2:90)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Pareumenes (s. str.) **quadrispinosus interruptus** Liu 間秀蜾蠃 (Yunn., 1987:1353; 1358)
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：廣東、雲南。

Pareumenes (s. str.) **quadrispinosus obtusus** Liu 鈍刺秀蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:460; Li, 1985:86; Li et al., 1990:128)
Pareumenes (s. str.) *quadrispinosus obtusus* Liu, 1941:259.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：廣東、海南、廣西。

Pareumenes (s. str.) **quadrispinosus quadrispinosus** (Saussure) 四秀蜾蠃 (Li, 1985:84)
Pareumenes quadrispinosus Saussure, 1855:134.
捕 食 性。
分 佈：山東；印度。

Pareumenes (s. str.) **quadrispinosus transitorus** Liu 傾秀蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:461; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:85)
Pareumenes (s. str.) *quadrispinosus transitorus* Liu, 1941:269.
捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、江蘇；菲律賓、緬甸。

Phi flavopunctatum continentale (Zimmermann) 弓費蜾蠃 (Hun., 1992:1323; Lee, 1981:198; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:88; 1992:675; Yunn., 1987:1353; Zhang, 1987[ed.] 2:90)

Phiflavopunctatum continentale (Zimmermann)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江；馬來西亞、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞。

Pseudepipona (s. str.) **herrichii** (Saussure) 赤足擬蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:448; Li, 1985:140)

Pseudepipona herrichii (Saussure), 1839:10, 16.

捕 食 性。

分 佈：江蘇、河北、內蒙古、東北；歐洲(南部)。

Pseumenes depressus (Saussure) 四刺飾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:456; Lee, 1981:198; Li, 1985:112; Li et al., 1990:132; Yunn., 1987:1354)

Pseumenes depressus (Saussure), 1855:135.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽；朝鮮、印度。

Pseumenes imperatrix (Smith) 隺飾蜾蠃 (Hun., 1992:1321; Lee, 1981:198; Li , 1985:113; Li, 1982 4(4):56; 1992:676)

Pseumenes imperatrix (Smith), 1857:24.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、四川、浙江、湖北。

Pterocheilus ecklonii Morawitz 黃腰羽蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:462)

捕 食 性。

分 佈：河北、黑龍江。

Pterocheilus quaesitus (Morawitz) 橙羽蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:462)

捕 食 性。

分 佈：內蒙古；蒙古、蘇聯。

Rhynchium bruneum Fabricius 黃唇蜾蠃 (ASZI et al., 1978:118; Xie et al., 1999, 21(2):86; Zhang, 1987[ed.] 2:90)

捕 食：*Naranga aenescens* Moore　稻螟蛉
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)　稻縱捲葉螟
Ostrinia furnacalis (Guenée)　亞洲玉米螟
Spodoptera litura (Fabricius)　斜紋夜蛾
Earias fittella (Fabricius)　棉金鋼鑽
紅鈴蟲
Helicoverpa armigera (Hübner)　棉鈴蟲
棉大造橋蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、浙江等省；亞洲南部各國。

Rhynchium fukaii Cameron 福喙蜾蠃 (Li, 1985:143)

Rhynchium fukaii Cameron, 1911:287.

捕 食 性。

分 佈：中國；日本。

Rhynchium mellyi Saussure 棕腹喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:448; Hun., 1992:1324; Li, 1985:142; Li et al., 1990:126; Yunn., 1987:1357)

Rhynchium mellyi Saussure, 1852:116.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南；緬甸、印度。

Rhynchium quinquecinctum (Fabricius) 黃喙蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:448; Hun., 1992:1324; Lee, 1981:198; 1988:541; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:144; Yunn., 1987:1357; Zhang, 1987[ed.] 2:90)

Rhynchium quinquecinctum (Fabricius), 1787:288.

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、西藏(墨脫格當)、四川、浙江、江蘇、河南、河北、遼寧、黑龍江；馬來西亞、印尼、緬甸、印度、孟加拉、斯里蘭卡、阿富汗、伊朗。

Rhynchium tahitense Saussure 黑背喙蜾蠃 (Hun., 1992 1992:1324; Li, 1985:144; 1992:676; Zhang, 1987[ed.] 2:90)

Rhynchium tahitense Saussure, 1867:7.

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、貴州、山西、河北；澳洲。

Stenodynerus bluethgeni Herrich-Schaetter 青直盾蜾蠃 (Li, 1985:136)

Stenodynerus bluethgeni Herrich-Schaetter, 1839:13.

捕 食 性。

分 佈：黑龍江；土耳其、歐洲

Stenodynerus chinensis (Saussure) 中華直盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:451; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:137)

Stenodynerus chinensis (Saussure), 1863:230.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、四川、河北。

Stenodynerus chinensis simillimus Gusenleither 近直盾蜾蠃 (Hun., 1992:1324; Li, 1992:675)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、貴州、四川、浙江、河北、吉林、黑龍江。

Stenodynerus dentisquama (Thomson) 齒直盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:450; Li, 1985:135)

Stenodynerus dentisquama (Thomson), 1970:86.

捕 食 性。

分 佈：浙江；荷蘭、德國、瑞典。

Stenodynerus frauenfeldi (Saussure) 福直盾蜾蠃 (ASZI, 1987,2:451; Hun., 1992:1325; Lee, 1988:541; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:136; 1992:675; Li et al., 1990:131)

Stenodynerus frauenteldi (Saussure), 1867:15.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：湖南、廣西、貴州、西藏(墨脫)、四川；日本。

Stenodynerus pappi Giordani Soika 毛直盾蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:451; Li, 1992:675)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、浙江。

Symmorphus (s. str.) **bifasciatus** (Linnaeus) 二帶同蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:457; Li, 1985:117)

Symmorphus bifasciatus (Linnaeus), 1761:419.

捕 食 性。

分 佈：江蘇；印尼、法國。

Symmorphus (s. str.) **foveolatus** Gussakovskij 坑同蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:457; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:115)

Symmorphus (s. str.) *foveolatus* Gussakovskij, 1933:55.

捕 食 性。

分 佈：四川；蘇聯。

Symmorphus multinensis Baldini 穆同蜾蠃 (ASZI, 1987, 2:457)

捕 食 性。

分 佈：江西、江蘇、遼寧、吉林、黑龍江；歐洲。

Symmorphus (s. str.) **sichuanensis** Lee 四川同蜾蠃 (Lee, 1981:423; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:116)

Symmorphus (s. str.) *sichuanensis* Lee, 1981:384-385.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山、灌縣)。

Zethus dolosus Bingham 細柄裸蠃 (Li et al., 1990:127)

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：廣西。

Stenogastrinae 狹腹胡蜂亞科

Cochlischnogaster daduogangensis Dong et Otsuka 大渡崗匙角狹腹胡蜂 (Dong et Otsuka, 1994:450-457)

Cochlischnogaster daduogangensis Dong et Otsuka, 1994:455.

捕 食 性。

分 佈：雲南(景洪)。

Eustenogaster eximia (Bingh.) 異真狹腹胡蜂 (Dong et Otsuka, 1994:450-457)

捕 食 性。

分 佈：雲南(勐海)。

Eustenogaster scitula (Bingh.) 麗真狹腹胡蜂 (Dong et Otsuka, 1994:450-457)

捕 食 性。

分 佈：廣東、廣西、雲南、貴州。

Holischnogaster micans (Saussure) 光全狹腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:481; Dong et Otsuka, 1994:450-457; Li, 1985:77; Yunn., 1987:1352)

Holischnogaster micans (Saussure), 1852:24.

別 名：*光真狹腹胡蜂*。

捕 食 性。

分 佈：雲南；印尼、緬甸、印度、錫金。

Liostenogaster nitidipennis (Saussure) 潔平狹腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:481; Dong et Otsuka, 1994: 450-457; Li, 1985:76; Yunn., 1987:1352)

Liostenogaster nitidipennis (Saussure), 1859:10.

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度。

Parischnogaster jacobsoni (Buysson) 杰柯側狹腹胡蜂 (Dong et Otsuka, 1994:450-457)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Parischnogaster mellyi (Saussure) 密側狹腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:481; Dong et Otsuka, 1994:450-457; Li, 1985:78; Yunn., 1987:1352)

捕 食 性。

分 佈：海南、雲南；越南、寮國、印尼。

Parischnogaster nigrifroms (Saussure) 黑額側狹腹胡蜂 (Dong et Otsuka, 1994:450-457)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Parischnogaster nigricans (Cameron) 黑側狹腹胡蜂 (Dong et Otsuka, 1994:450-457)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Parischnogaster serrei Buysson 齒側狹腹胡蜂 (Dong et Otsuka, 1994:450-457)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Stenogaster seitula (Bingham) 麗狹腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:481; Chen, 1996, 18(1):21; Li, 1985:75; 1992:674; Li et al., 1990:125; Yunn., 1987:1351)

Stenogaster seitula (Bingham), 1897:379.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：廣東、廣西、貴州、雲南；印度、錫金。

Polybiinae(Parapolybiinae) 異腹胡蜂科(擬馬蜂亞科)

Parapolybia indica bioculata van der Vecht 庫側異腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:480; Li, 1985:55; Yunn., 1987:1350; Zhang, 1987[ed.] 2:90)
Parapolybia indica bioculata van der Vecht, 1966:29.
捕 食 性。
分 佈：江西、雲南；緬甸。

Parapolybia indica indica (Saussure) 印度側異腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:480; Hun., 1992:1325; Lee, 1981:198; 1988:540; Li, 1982 4(4):55; Li, 1985:56; 1992:674; Li et al., 1990:115; Yao et al., 1995:577; Yunn., 1987:1349)
Parapolybia indica (Saussure, 1854:207)
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北；日本、馬來西亞、緬甸。

Parapolybia varia varia (Fabricius) 變側異腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:480; Chen, 1996, 18(1):21; Chen et al., 1993:129; Hun., 1992:1325; Lee, 1981:198; 1988:540; Li, 1985:57; 1992:674; Li et al., 1990:116; Yao et al., 1995:577; Yunn., 1987:1349)
Parapolybia varia (Fabricius), 1787:293.
捕 食：棗樹害蟲、鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、江蘇、湖北；菲律賓、馬來西亞、緬甸、孟加拉、印度、印尼。

Ropalidiinae 鈴腹胡蜂亞科

Ropalidia (Paraicaria) bicolorata bicolorata Gribodo 雙色鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:479; Li, 1985:53; Yunn., 1987:1349)
Ropalidia bicolorata Gribodo, 1892:249.
捕 食 性。
分 佈：雲南；泰國、緬甸。

Ropalidia (Paraicaria) bicolorata parvula van der Vecht 淡雙色鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:479; Li, 1985:54; Yunn., 1987:1349)
Ropalidia (*Paraicaria*) *bicolorata parvula* van der Vecht, 1962:39.
捕 食 性。
分 佈：雲南；馬來西亞(沙巴)。

Ropalidia (Anthreneida) fasciata (Fabricius) 帶鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:478; Lee, 1988:541; Li et al., 1990:114; Yunn., 1987:1348; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、雲南、西藏(墨脫)；日本、印尼、緬甸、印度。

Ropalidia (Anthreneida) ferruginea (Fabricius) 銹邊鈴腹胡蜂 (ASZI,1987, 2:478; Li, 1985:49; Li et al., 1990:114)

Ropalidia ferruginea (Fabricius), 1792:280.

Ropalidia (*Anthreneida*) *ferruginea* (Fabricius), Li, 1985:49.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：廣東、廣西；泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Ropalidia (Anthreneida) hongkongensis hongkongensis (Saussure) 香港鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:477; Chen, 1996, 18(1):21; Lee, 1981:198; Li, 1985:48; Li et al., 1990:112)

Ropalidia hongkongensis (Saussure), 1853:239.

Ropalidia (*Anthreneida*) *hongkongensis hongkongensis* (Saussure), Li, 1985:48.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、廣東、廣西。

Ropalidia (Icariolia) opifex van der Vecht 助鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:479; Li, 1985:51; Yunn., 1987:1348)

Ropalidia (*Icariolia*) *opifex* van der Vecht, 1962:68.

捕 食 性。

分 佈：雲南；馬來西亞、印尼。

Ropalidia (Anthreneida) speciosa (Saussure) 紅腰鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:479; Li, 1985:51; Yunn., 1987:1348)

Ropalidia speciosa (Saussure), 1855:374.

捕 食 性。

分 佈：雲南；馬來西亞、印尼、緬甸、印度。

Ropalidia (Anthreneida) sumatrae sumatrae (Weber) 刺鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:478; Li, 1985:50)

Ropalidia (*Anthreneida*) *sumatrae sumatrae* (Weber), 1941:181.

捕 食 性。

分 佈：廣東；緬甸、印度。

Ropalidia (Anthreneida) taiwana taiwana Sonan 臺灣鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:479; Li, 1985:52)

Ropalidia (*Anthreneida*) *taiwana* Sonan, 1935:201.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、浙江；日本。

Ropalidia (Anthreneida) variegata variegata (Smith) 多色鈴腹胡蜂 (ASZI, 1987, 2:478; Li et al., 1990:113; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：江西、廣東、廣西；印尼、印度、巴基斯坦。

Polistinae 馬蜂亞科

Polistes adustus Bingham 焰馬蜂 (Li, 1985:61; Yunn., 1987:1350, 1357)

Polistes adustus Bingham, 1897:397.

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：雲南；錫金。

Polistes antennalis Perez 角馬蜂 (ASZI, 1987, 2:464; Lee, 1981:197; Li, 1985:64; Li, 1992:673; Li et Li, 1989:135-136; Li et al., 1984:101-105; Li et al., 1990:121; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

Polistes antennalis Perez, 1905:24, 81.

捕 食：小菜蛾

Helicoverpa armegera (Hübner) 棉鈴蟲

煙青蟲

小地老虎

造橋蟲

鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、廣西、貴州、浙江、江蘇、安徽、山西、河北、甘肅、新疆、內蒙古、吉林；蘇聯、巴爾幹半島、土耳其、北非、西班牙、意大利、法國。

Polistes chinensis Fabricius 中華馬蜂 (ASZI, 2:464; Chen et al., 1993:130; He et al., 1991:112; Hun., 1992:1327; Li, 1985:66; Li et al., 1990:120; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

Polistes chinensis Fabricius, 1793:261.

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)

Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)

棗樹害蟲。

分 佈：江西、廣東、廣西、湖南、江蘇、山東；法國。

Polistes chinensis antennalis Perez 華角馬蜂 (Hun., 1992:1325; Lee, 1996:291)

Polistes chinensis antennalis Perez, 1905:24, 81.

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、貴州、浙江、江蘇、安徽、山西、河北、甘肅、新疆、內蒙古、吉林；北非、巴爾幹半島、土耳其、西班牙、意大利、法國、蘇聯。

Polistes fadwigae Dalla Torre 黑背馬蜂 (He et al., 1991:113; Hunan Shi-men, Cotton Sci. Res. Inst. 1980(1):49-51; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲

棉鈴蟲

鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：江西、湖南。

Polistes formosanus Sonan 臺灣馬蜂 (ASZI, 1987, 2, 465; He et al., 1991:112; Hun., 1992:1326; Lee, 1981:197; Li, 1982 4(4):55; Li, 1985:67; Li et al., 1990:117; Zhang, 1987[ed.] 2:89)

Polistes formosanus Sonan, 1938:68.

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇；日本。

Polistes gallicus gallicus (Linnaeus) 柞蠶馬蜂 (ASZI, 1987, 2:464; He et al., 1991:112; Li, 1985:64; Zhang, 1987[ed.]

2:89)
Polistes gallicus (Linnaeus), 1767:949.
捕 食：*Naranga aenescens* Moore　稻螟蛉(幼蟲)
柞蠶(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、江蘇、山西、河北、甘肅、新疆、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、土耳其、埃及、伊朗、敘利亞、比利時、荷蘭、法國、瑞典。

Polistes gigas (Kirby) 棕馬蜂 (ASZI, 1987, 2:463; Hun., 1992:1326; Lee, 1981:197; Li, 1982 4(4):55; 1992:673; Li et al., 1990:123; Yao et al., 1995:576; Yunn., 1987:1350; Zhang, 1988[ed.] 2:89)
Polistes gigas (Kirby), 1826:36, 633.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇；菲律賓、馬來西亞、緬甸、孟加拉、印度、印尼。

Polistes hebraeus Fabricius 亞非馬蜂 (ASZI, 1987, 2:465; Chen et al., 1993:130; He et al., 1991:112; Lee, 1981:197; Li, 1985:70; Li et al., 1990:117; Wu et al., 1989:171-172; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Polistes hebraeus Fabricius, 1787:292.
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　稻縱捲葉螟(幼蟲)
Dendrolimus spp.　松毛蟲
Naranga aenescens Moore　稻螟蛉(幼蟲)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey)　稻苞蟲(幼蟲)
棗樹害蟲
棉花鱗翅目害蟲(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、廣西、浙江、江蘇、河南、河北；緬甸、印度、毛里求斯、埃及、伊朗。

Polistes jadwigae Dalla Torre 家馬蜂 (Lee, 1981:197; Li, 1985:70; Lu et al., 1990:355; 1992:171-181)
Polistes jadwigae Dalla Torre
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、浙江、江蘇、河北、吉林；日本。

Polistes japonicus Saussure 日本馬蜂 (Li, 1985:67;1992:74; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Polistes japonicus Saussure, 1858:10, 260.
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇；日本。

Polistes jokohamae Rodeszkoweki 約馬蜂 (ASZI, 1987, 2:465; He et al., 1991:113; Lee, 1981:197; Li, 1982 4(4):55; Li, 1985:73; Li et al., 1990:119; Yao et al., 1995:577; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Polistes jokohamae Rodeszkoweki, 1887:435.
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　稻縱捲葉螟(幼蟲)
鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、河南、河北；日本。

Polistes macaensis Fabricius 澳門馬蜂 (ASZI, 1987, 2:464; Lee, 1981:197; Li, 1985:69; Li et al., 1990:118; Yao et al.,

1995:576)
Polistes macaensis Fabricius, 1793:259.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、廣東、廣西、浙江、江蘇、河北；日本、新加坡、緬甸、印度、孟加拉、伊朗。

Polistes mandarinus Saussure 柑馬蜂 (Hun., 1992:1326; Lee, 1988:540; Li, 1982 4(4):55; Li, 1985:63; 1992:674; Yunn., 1987:1350; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Polistes mandarinus Saussure, 1853:58.
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫、波密)、四川、湖北、河南、山西、河北、遼寧、吉林。

Polistes okinawansis Matsumura et Uchida 普通腳胡蜂 (Zong et al., 1986:119; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
捕 食：(油菜上)
分 佈：江西、湖北。

Polistes olivaceus (De Geer) 亞非馬蜂 (ASZI, 1987, 2:463; Hun., 1992:1327; Li, 1982 4(4):55; Li, 1985:68; 11992:674; Li et al., 1990:123; Qin et Lee, 1997:133-136; Yunn., 1987:1351; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Polistes olivaceus (De Geer), 1773:582.
別 名：*果馬蜂*。
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
Helicoverpa armigera (Hubner) 棉鈴蟲
鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、河北；緬甸、印度、埃及、伊朗、美洲。

Polistes (Megapostes) rothneyi grahami Vecht 陸馬蜂 (ASZI, 1987, 2:465; He et al., 1991:113; Hun., 1992:1326; Li, 1982 4(4):55; Li, 1985:74; 1992:673; Li et al., 1990:119; Qin et Lee, 1997:133-136; Wu et al., 1989:170-171; Yao et al., 1995:577; Yunn., 1987:1351; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Polistes (*Megapostes*) *rothneyi grahami* van der Vecht, 1968:104.
捕 食：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲
Dendrolimus spectabilis (Butler) 赤松毛蟲
Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)
其它鱗翅目幼蟲
葉蜂類。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、北京、遼寧、黑龍江。

Polistes (Megapostus) rothneyi hainanensis Vecht 海南馬蜂 (ASZI, 1987, 2:466; Li, 1985:72)
Polistes (*Megapostes*) *rothneyi hainanensis* van der Vecht, 1968:106.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：廣東、海南、廣西。

Polistes (Megapostes) rothneyi iwatai Vecht 和馬蜂 (ASZI, 1987, 2:466; Hun., 1992:1326; Li, 1985:71)
Polistes (*Megapostes*) *rothneyi iwatai* van der Vecht, 1968:104.
捕 食 性。
分 佈：湖南、河北；朝鮮、日本。

Polistes sagittarius Saussure 黃裙馬蜂 (ASZI, 1987, 2:463; Li, 1985:61; Li et al., 1990:125; Yunn., 1987:1350)
Polistes sagittarius Saussure, 1853:56.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：廣東、廣西、雲南；越南、緬甸、印度。

Polistes snelleni Saussure 斯馬蜂 (ASZI, 1987, 2:463; Hun., 1992:1327; Lee, 1981:197; Li, 1982 4(4):56; Li, 1985:62; Li, 1992:673; Li et al., 1990:122; Yunn., 1987:1350; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Polistes snelleni Saussure, 1862:140.
別 名：*黃腳馬蜂*。
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、山東、河北、甘肅；日本。

Polistes sulcatus Smith 畦馬蜂 (ASZI, 1987, 2:463; Hun., 1992:1327; Lee, 1981:197; 1988:540; Li, 1985:65; Li, 11992:673; Yao et al., 1995:576; Yunn., 1987:1351; Zhang, 1987[ed.] 2:89)
Polistes sulcatus Smith, 1852:38.
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、安徽。

Polistes stigma (Fabricius) 點馬蜂 (ASZI, 1987, 2:465; Li, 1985:60; Li et al., 1990:124)
Polistes stigma (Fabricius), 1793:275.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：廣東、廣西；馬來西亞、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Polistes sp. 馬蜂 (Liu et Zhang, 1993, 15(2):89)
Polistes sp. Liu et Zhang, 1993:89.
捕 食：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)。
分 佈：大興安嶺北部。

Polistes sp. 馬蜂 (Chen, 1996, 18(1):21)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Polistes sp. 馬蜂 (Xiao et al., 1991:121)
捕 食：*Trichiocampus cannabis* Xiao et Huang 大麻毛怪葉蜂。
分 佈：安徽。

Vespinae 胡蜂亞科

Dolichovespula media (Retzius) 中長黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:467; Li, 1985:42)
Dolichovespula media (Retzius), 1783:63.
捕 食 性。
分 佈：黑龍江；日本、蘇聯、歐洲中、北部。

Dolichovespula norvegica (Fabricius) 挪威長黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:467; Li, 1985:44)
捕 食 性。
分 佈：吉林；亞洲、歐洲、美國。

Dolichovespula norvegicoides (Sladen) 平長黃胡蜂 (Li, 1985:44)
Dolichovespula norvegicoides (Sladen)
捕 食 性。
分 佈：新疆；加拿大。

Dolichovespula nyalamensis Lee 聶拉胡蜂 (Lee, 1988:540)
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫、聶拉木)。

Dolichovespula pacifica xanthicincta Archer 藏長胡蜂 (Lee, 1988:540)
捕 食 性。
分 佈：西藏(米林派區、墨脫那木拉)、四川；緬甸。

Dolichovespula saxonica saxonica (Fabricius) 石長黃胡蜂 (Li, 1985:45)
Dolichovespula saxonica (Fabricius), 1767: T. 74.
Dolichovespula saxonica saxonica (Fabricius), Li, 1985:45.
捕 食 性。
分 佈：廣東；印度、巴基斯坦、印尼。

Dolichovespula sylvestris sylvestris (Scopoli) 樹長黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:468; Lee, 1996:290; Li, 1985:43)
Dolichovespula sylvestris (Scopoli), 1763:309.
Dolichovespula sylvestris sylvestris (Scopoli), Li, 1985:43.
捕 食 性。
分 佈：遼寧；歐洲。

Paravespula (s. str.) **flaviceps flaviceps** (Smith) 細側胡蜂 (Hun., 1992:1328)
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、江蘇；日本、印度、法國。

Paravespula (Rugovespula) koreensis koreensis (Radoszkowski) 朝鮮側紋黃胡蜂 (Hun., 1992:1328; Li, 1992:673)
捕 食 性。

分 佈：湖南、江西；朝鮮。

Paravespula (Rugovespula) koreensis salebrosa Archer 澀側胡蜂 (Hun., 1992:1328)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江。

Paravespula (s, str.) **structor** (Smith) 銹腹側黃胡蜂 (Hun., 1992:1329)
捕 食 性。
分 佈：四川、湖南；印度、錫金。

Provespa barthelemyi (Buysson) 平唇原胡蜂 (ASZI, 1987, 2:466; Yunn., 1987:1348)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南、四川、浙江、江蘇；日本、蘇聯、越南、寮國、緬甸、印度、不丹、法國。

Vespa affinis affinis (Linnaeus) 黃腰胡蜂 (ASZI, 1987, 2:477; He et al., 1991:112; Hun., 1992:1329; Lee, 1981:197; Li et al., 1990:110; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
稻田害蟲
鱗翅目(幼蟲)
蜜蜂等
為害葡萄等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、安徽；菲律賓、越南、印尼、泰國、緬甸、印度。

Vespa analis nigrans Buysson 擬大胡蜂 (ASZI, 1987, 2:472; Hun., 1992:1329; Yunn., 1987:1347)
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南；錫金。

Vespa analis parallela Andra 三齒胡蜂 (ASZI, 1987, 2:475; Li, 1982 4(4):55; 1992:672; Yunn., 1987:1346; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
Vespa analis parallela Andra, 1884:
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇；馬來西亞、尼泊爾。

Vespa auraria Smith 凹紋胡蜂 (ASZI, 1987, 2:470; Lee, 1982:377; Li, 1982 4(4):55; Yunn., 1987:1347)
Vespa auraria Smith, 1852:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(樟木)、四川；越南、印度。

Vespa basalis Smith 基胡蜂 (ASZI, 1987, 2:475; Lee, 1981:197; 1988:540; Li, 1982, 4(4):55; Li, 1992:672; Yunn., 1987:1345)
Vespa basalis Smith, 1852:
捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江；越南、泰國、緬甸、印度、錫金、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

Vespa bicolor bicolor Fabricius 黑盾胡蜂 (ASZI, 2:475; Hun., 1992:1329; Lee, 1981:197; 1982:376; 1988.539; Li, 1982 4(4):55; Yunn., 1987:1345; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

Vespa bicolor Fabricius, 1787:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏(察隅)、四川、浙江、陝西、河北；越南、印尼、泰國、緬甸、印度、錫金、尼泊爾、斯里蘭卡、法國。

Vespa binghami binghami Buysson 褐胡蜂 (ASZI, 1987, 2:474; Hun., 1992:1329; Li, 1982 4(4):55;Yunn., 1987:1345; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

Vespa binghami Buysson, 1904:

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、雲南、四川。

Vespa crabro crabro Linnaeus 黃邊胡蜂 (ASZI, 1987, 2:471; He et al., 1991:112; Lee, 1981:197; Li, 1982 4(4):55; 1992:672; Li et al., 1990:111; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

Vespa crabro Linnaeus, 1758:

捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、遼寧、黑龍江；日本、歐洲。

Vespa ducalis Smith 黑尾胡蜂 (ASZI, 1987, 2:471; Hun., 1992:1331; Lee. 1981:197; Li, 1982 4(4):55; Yunn., 1987:1347; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

Vespa ducalis Smith, 1852:

捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲、蛹)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、河北、遼寧、黑龍江；日本、印度、尼泊爾、法國。

Vespa flaviceps flaviceps (Smith) 細側黃胡蜂 (Lee, 1988:540; Li, 1992:673)

捕 食 性。

分 佈：湖南、貴州、雲南、西藏(墨脫、波密)、四川、浙江、江蘇、河北、遼寧、吉林、黑龍江；印度、日本、蘇聯、法國。

Vespa lewisii (Cameron) 易黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:468; He et al., 1991:112)

捕 食：蚜蟲

Mythimna separata (Walker) 粘蟲

Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶。

分 佈：湖南、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

Vespa magnifica Smith 大胡蜂 (ASZI, 1987, 2:474; Lee, 1982:377; 1988:539; Lee, 1981:197; Li, 1982 4(4):55; Yunn., 1987:1346)

Vespa magnifica Smith, 1852:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏(樟木)、四川；印尼、緬甸、印度、錫金。

Vespa mandarinia Smith 金環胡蜂 (Chen, 1996, 18(1):21; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

捕 食：昆蟲；吸食梨、葡萄等果汁。

分 佈：江西、廣東。

Vespa mandarinia japonica Radz. 日環胡蜂 (Hun., 1992:1330; Li, 1992:672)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、安徽、山東、河北；日本。

Vespa mandarinia mandarinia Smith 金環胡蜂 (ASZI, 1987, 2:472; Hun., 1992:1330; Li, 1982 4(4):55; 1992:672; Li et al., 1990:111; Yunn., 1987:1347)

Vespa mandarinia Smith, 1852:

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、遼寧；日本、法國。

Vespa mandarinia nobilis Sonan 顯胡蜂 (ASZI, 1987, 2:474; Hun., 1992:1330; Li, 1992:672)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、貴州。

Vespa nigrithorax Buysson 黑胸胡蜂 (ASZI, 1987, 2:472; He et al., 1991:112; Lee, 1981:197; 1982:377; Li, 1982 4(4):55; Li et al., 1990:110; Yunn., 1987:1346; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

Vespa nigrithorax Buysson, 1904:

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏(察隅)、貴州、四川、浙江、江蘇；印尼、印度、錫金。

Vespa orientalis Linnaeus 東方胡蜂 (ASZI, 1987, 2:476; Lee, 1996:290)

Vespa orientalis Linnaeus, 1771:540.

捕 食 性。

分 佈：新疆；印度、土耳其、埃及。

Vespa simillima Smith 近胡蜂 (ASZI, 1987, 2:473)

捕 食 性。

分 佈：東北；蘇聯、印度。

Vespa structor (Smith) 銹腹胡蜂 (Lee, 1988:540)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏(墨脫、波密)、四川；印度、錫金。

Vespa tropica ducalis Smith 黑尾胡蜂 (Li, 1992:673; Yao et al., 1995:576)

Vespa tropica ducalis Smith

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、河北、遼寧、黑龍江；日本、印度、尼泊爾、法國。

Vespa tropica haematodes Bequaert 小金箍胡蜂 (ASZI, 1987, 2:476; He et al., 1991:112; Hun., 1992:1339; Lee, 1981:197; Yunn., 1987:1346; Zhang, 1987[ed.] 2:88)

捕 食：蝗蟲

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(幼蟲)

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南；印尼、緬甸、印度。

Vespa tropica leefmansi van der Veht 大金箍胡蜂 (ASZI, 1987, 2:476; He et al., 1991:112; Lee, 1988: 539; Yunn., 1987:1346)

捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)。

分 佈：福建、雲南、西藏(墨脫)；越南。

Vespa variabilis variabilis Buysson 變胡蜂 (ASZI, 1987, 2:473; Hun., 1992:1330; Lee, 1981:197)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、浙江；印尼、印度。

Vespa velutina auraria Smith 凹紋胡蜂 (Lee, 1988:540)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏(波密)、四川；越南、印度。

Vespa velutina nigrithorax Buysson 黑胸胡蜂 (Hun., 1992:1330; Lee, 1988:539; Li, 1992:673; Yao et al.., 1995:576)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、湖北；印度、錫金、印尼。

Vespa vivax Smith 壽胡蜂 (ASZI, 1987, 2:473 Li, 1982 4(4):55)

Vespa vivax Smith, 1871:

捕 食 性。

分 佈：四川；印度。

Vespa vulgaris (Linnaeus) 常見黃胡蜂 (Yao et al., 1995:576)

Vespa vulgaris (Linnaeus)

捕 食 性。

分 佈：浙江、國內廣分布；亞洲、北非、歐洲、北美洲。

Vespa sp. 胡蜂 (Liu et Zhang, 1993, 15(2):89)

Vespa sp. Liu et Zhang, 1993:89.
捕 食：*Dendrolimus superans* (Butler)　落葉松毛蟲(幼蟲)。
分 佈：大興安嶺北部。

Vespula austriaca (Panzer) 澳黃胡蜂 (Li, 1985:38)
Vespula austriaca (Panzer), 1799:63.
捕 食 性。
分 佈：河北；歐洲。

Vespula flaviceps flaviceps (Smith) 細黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:468; Li, 1982 4(4):55; Li, 1985:41; Yunn., 1987:1348)
Vespula flaviceps (Smith), 1870:174, 191.
Vespula flaviceps flaviceps (Smith), Li, 1985:41.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、浙江、江蘇；日本、蘇聯、印度、法國。

Vespula germanica (Fabricius) 德國黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:468; Chen et al., 1993:130; Lee, 1988:81-82; I985:38)
Vespula germanica (Fabricius, 1793:256.)
捕 食：棗樹害蟲。
分 佈：江蘇、河南、河北、新疆、內蒙古、黑龍江；亞洲、非洲、歐洲、北美洲、澳洲。

Vespula (s. str.) **koreensis koreensis** (Radoszkowski) 朝鮮黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:470; Li et al., 1990:112; Li, 1985:40; Zhang, 1987[ed.] 2:88)
Vespula koreensis (Radoszkowski), 1887:432.
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：江西、廣西；朝鮮。

Vespula (s. str.) **koreensis orbata** (Buysson) 環黃胡蜂 (Li, 1985:34)
Vespula koreensis orbata (Buysson), 1902:140.
捕 食 性。
分 佈：福建、四川、浙江、黑龍江；蘇聯、緬甸、印度、錫金。

Vespula (s. str.) **koreensis salebrosa** Archer 澀黃胡蜂 (Yunn., 1987:1362)
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江。

Vespula maculifrons (Buysson) 額斑黃胡蜂 (Li, 1985:41)
Vespula maculifrons (Buysson), 1926:93-94.
捕 食 性。
分 佈：江蘇、河北；美國。

Vespula minuta arisana (Sonan) 臺灣黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:469; Li, 1985:39)
Vespula arisana Sonan, 1929:147.
Vespula minuta arisana (Sonan), Li, 1985:39.

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Vespula orbata (Buysson) 環黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:470; Lee, 1981:197; Li, 1982 4(4):55)
Vespula orbata (Buysson, 1902:)
捕 食 性。
分 佈：福建、四川、浙江、黑龍江；蘇聯、緬甸、印度、錫金。

Vespula (s. str.) **rufa grahami** Archer 川黃胡蜂 (Yunn., 1987:1362)
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Vespula rufa rufa (Linnaeus) 北方黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:470; Lee, 1996:290; Li, 1985:36)
Vespula rufa (Linnaeus, 1758:572.)
捕 食 性。
分 佈：浙江、江蘇、河北、新疆；非洲、歐洲。

Vespula rufa schrenckii (Radoszkowsky) 施黃胡蜂 (Li, 1985:37)
Vespula rufa schrenckii (Radoszkowsky), 1861:84.
捕 食 性。
分 佈：遼寧、黑龍江；朝鮮、日本。

Vespula structor (Smith) 銹腹黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:469; Lee, 1982:376; Li, 1982 4(4):55; Li, 1985:34)
Vespula structor (Smith), 1870:191.
捕 食 性。
分 佈：西藏(亞東)、四川；印度、錫金。

Vespula vulgaris (Linnaeus) 常見黃胡蜂 (ASZI, 1987, 2:469; Li, 1985:35)
Vespula vulgaris (Linnaeus), 1758:572.
捕 食 性。
分 佈：新疆；亞洲、北非、歐洲、北美。

Vespula sp. 黃胡蜂 (Wang et al., 1992:281; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):184)
Vespula sp. Wang et al., 1992:281.
捕 食：*Neodiprion dailingensis* Xiao et Zhou 帶嶺新松葉蜂(紅松)(幼蟲)。
分 佈：遼寧、黑龍江。

Sphecidae 細腰蜂科(泥蜂科)

(Cheng, 1981,8(1):24)

Alysson attenuatus Wu et Zhou 角瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:218)
Alysson attenuatus Wu et Zhou, 1987:218.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Alysson caeruleus Wu et Zhou 藍光瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:216)

Alysson caeruleus Wu et Zhou, 1987:215.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Alysson carinatus Wu et Zhou 脊胸瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:219)

Alysson carinatus Wu et Zhou, 1987:219.

捕 食 性。

分 佈：雲南(維西攀天閣)。

Alysson formosanus Tsuneki 麗瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:214)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Alysson harbinensis Tsuneki 紅腰瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:214)

捕 食 性。

分 佈：黑龍江。

Alysson nigrilabius Wu et Zhou 黑唇瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:219)

Alysson nigrilabius Wu et Zhou, 1987:219.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨嵋山金頂)

Alysson razenburgii Dablh. 褐足瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:215)

捕 食 性。

分 佈：黑龍江；歐洲。

Alysson sichuanensis Wu et Zhou 四川瘤泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:219)

Alysson sichuanensis Wu et Zhou, 1987:219.

捕 食 性。

分 佈：四川(紋川臥龍)。

Alysson spinosus (Panzer) 對斑瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:215)

捕 食 性。

分 佈：河北、內蒙古；歐洲。

Alysson taiwanus Sonan 臺灣瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:215)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Alysson tridentatus Wu et Zhou 三齒瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:218)

Alysson tridentatus Wu et Zhou, 1987:218.

捕 食 性。
分 佈：江西(牯嶺)。

Alysson verhoeffi Tsuneki 弗瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:215)
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Alysson yunnanensis Wu et Zhou 雲南瘤腿泥蜂 (Wu et Zhou, 1987:215)
Alysson yunnanensis Wu et Zhou, 1987:215.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Ammophila atripes atripes Smith 皺胸泥蜂 (ASZI, 1987, 2:484; Chen, 1996, 18(1):21; Hun., 1992:1333; Li et al., 1990:138; Li et al., 1993:40; Yunn., 1987:1366; Zhou et Wu, 1992:670; 1992:1375)
Ammophila atripes Smith, 1852:
別 名：*紅足泥蜂*。
捕 食：夜蛾(幼蟲)
尺蛾(幼蟲)
鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、河北；朝鮮、日本、寮國、緬甸、印度、斯里蘭卡，東洋區。

Ammophila borealis Li et Yang 北方沙泥蜂 (Li et Yang, 1990:263)
Ammophila borealis Li et Yang, 1990:263.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(海拉爾市、巴彥淖爾盟烏拉特前旗、巴盟烏拉山)、吉林。

Ammophila campestris Letreille 平原沙泥蜂 (Wu et Zhou, 1996:297)
Ammophila campestris Letreille, 1809:
捕 食 性。
分 佈：河北、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯。

Ammophila clavus Fabricius 棒腹泥蜂 (Zhou et Wu, 1988:543)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(墨脫背崩)、四川；澳洲。

Ammophila clypeola Yang et Li 突唇沙泥蜂 (Li et Yang, 1990:262)
Ammophila clypeola Yang et Li, 1990:262.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(東勝縣)。

Ammophila ganquana Yang et Li 甘泉沙泥蜂 (Yang et Li, 1989:105)

Ammophila ganquana Yang et Li, 1989:105.
捕 食 性。
分 佈：陝西(甘泉)。

Ammophila globifrontalis Li et Yang 瘤額沙泥蜂 (Li et Yang, 1995:574)
Ammophila globifrontalis Li et Yang, 1995:574-575.
捕 食 性。
分 佈：廣西、貴州、浙江、湖北。

Ammophila nigripes Smith 黑足沙泥蜂 (Chen, 1996, 18(1):21)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Ammophila obliquestriolae Yang et Li 斜細沙泥蜂 (Yang et Li, 1989:106)
Ammophila obliquestriolae Yang et Li, 1989:106.
捕 食 性。
分 佈：陝西(甘泉)。

Ammophila pachythoracalis Yang et Li 厚胸沙泥蜂 (Yang et Li, 1989:107)
Ammophila pachythoracalis Ynag et Li, 1989:107.
捕 食 性。
分 佈：陝西(甘泉)。

Ammophila planicollaris Li et Yang 平領沙泥蜂 (Li et Yang, 1990:259)
Ammophila planicollaris Li et Yang, 1990:259.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(伊克昭盟准格爾旗)。

Ammophila rubigegen Li et Yang 紅異沙泥蜂 (Li et Yang, 1990:260)
Ammophila rebigegen Li et Yang, 1990:260.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(伊克昭盟准格爾旗)。

Ammophila sabulosa infesta Smith 多沙泥蜂(騷擾亞種) (Li et al., 1993:40)
Ammophila sabulosa infesta Smith
捕 食 性。
分 佈：山東。

Ammophila sabulosa nipponica Tsuneki 砂泥蜂(日本亞種) (ASZI, 1987, 2:484; Yunn.:1366; Zhou et Wu, 1988:543; 1992:1375)
Ammophila sabulosa nipponica Tsuneki, 1967:
捕 食：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南、西藏(米林派區、波密易貢、林芝)、四川、浙江、江蘇、山東、山西、河北、吉林、黑龍江；朝鮮、日本，全北區。

Ammophila sabulosa vagabunda Smith 沙泥蜂 (Hun, 1992:1333; Zhou et Wu, 1992:670)

Ammophila sabulosa vagabunda Smith, 1856:

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：湖南、四川；廣佈南方各地；亞洲南部。

Ammophila untumoris Yang et Li 無瘤沙泥蜂 (Yang et Li, 1989:108)

Ammophila untumoris Yang et Li, 1989:108.

捕 食 性。

分 佈：陝西(甘泉)。

Ammophila vetuberosa Li et al. 缺突沙泥蜂 (Li et al., 1993:40)

Ammophila vetuberosa Li et al., 1993:40.

捕 食 性。

分 佈：山東。

Ampulex compressa Fabricius 綠長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:154; Zhou et Wu, 1988:543)

Ampulex compressa Fabricius

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫格當)；東洋區、澳洲區。

Ampulex dentata Matsumura et Uchida 齒長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:154)

Ampulex dentata Matsumura et Uchida

捕 食 性。

分 佈：四川；日本。

Ampulex dissector Thunberg 疏長背泥蜂 (Li et al., 1990:137; Wu et Chou, 1985:154; Yunn., 1987:1365)

別 名：*藍蠊*。

捕 食：蜚蠊。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇；朝鮮、日本、印度(大吉嶺)。

Ampulex kurarensia Yasumatsu 鈍齒長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:154)

Ampulex kurarensia Yasumatsu

捕 食 性。

分 佈：臺灣、四川、浙江。

Ampulex longiabdominalis Wu et Chou 長腹長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:158)

Ampulex longiabdominalis Wu et Chou, 1985:158.

捕 食 性。

分 佈：浙江(天目山)。

Ampulex longiclypeus Wu et Chou 長唇長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:160)

Ampulex longiclypeus Wu et Chou, 1985:160.

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川(峨嵋山)。

Ampulex quadraticollar Wu et Chou 方胸長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:159)
Ampulex quadraticollar Wu et Chou, 1985:159.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納、景東)。

Ampulex rotundioculus Wu et Chou 圓眼長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:155)
Ampulex rotundioculus Wu et Chou, 1985:155.
捕 食 性。
分 佈：雲南(普洱、景東)。

Ampulex seitzii Kohl 塞長背泥蜂 (ASZI, 1987, 2:483; Wu et Chou, 1985:155; Yunn., 1987:1365)
Ampulex seitzii Kohl
捕 食：小蜚蠊(若蟲)。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南；印度、日本。

Ampulex takeuchii Yasumatsu 猛長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:154)
Ampulex takeuchii Yasumatsu
捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川、浙江、安徽。

Ampulex yunnanensis Wu et Chou 雲南長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:156)
Ampulex yunnanensis Wu et Chou, 1985:156.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納、金平)。

Astata boops (Schrank) 紅腹異色泥蜂 (Li et al., 1990:138)
捕 食：蜡象。
分 佈：廣西。

Cerceris japonica Ashmead 日本節腹泥蜂 (Zhou et Wu, 1992:671)
捕 食 性。
分 佈：江西、貴州、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本。

Cerceris kwangtseniana Giner-Mari 斜突節腹泥蜂 (Zhou et Wu, 1992:671)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、浙江、江蘇、湖北。

Cerceris rufipes evecta Shestokov 叉突節腹泥蜂 (Lou et al., 1991:94)
捕 食：*Cleonus piger* Scopoli 歐洲方喙象(玫瑰、桑、榆、蘋果、酸棗等)
Piazomias validus Motschulsky 大球胸象(玫瑰、桑、榆、蘋果、酸棗等)
Sympiezomias velatus (Chevrolet) 大灰象(玫瑰、桑、榆、蘋果、酸棗等)。

分 佈：山東。

Cerceris strandi koulingensis Tsuneki 牯嶺節腹泥蜂 (Zhou et Wu, 1992:671)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、四川、湖北、河北。

Cerceris unifasciata Smith 單帶節腹泥蜂 (Li, et al., 1990:136)

捕 食：鞘翅目、膜翅目昆蟲。

分 佈：廣西。

Cerceris vischnu Cameron 毗濕紐泥蜂 (Pu, 1986:8)

捕 食 性。

分 佈：印度。

Chalybion (s. str.) **bengalense** Dhlbom 印度藍泥蜂 (ASZI, 1987, 2:486)

捕 食：蜘蛛。

分 佈：廣東、雲南；印度。

Chalybion dolichothorax Kohl 長胸藍泥蜂 (Zhou et Wu, 1992:670)

捕 食 性。

分 佈：湖南、貴州。

Chalybion (s. str.) **japonicum** (Gribodo) 日本藍泥蜂 (ASZI, 1987, 2:486; Hun., 1992:1332; Li et Yang, 1995:573; Yunn., 1987:1365; Zhou et Wu, 1992:670; 1992:1376)

Chalybion japonicum (Gribodo, 1883:)

捕 食：蜘蛛。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、山東、山西、河北、遼寧；朝鮮、日本、印度。

Chlorion lobatum (Fabricius) 綠泥蜂 (ASZI, 1987, 2:486; Li et al., 1990:136; Yunn., 1987:1365)

捕 食：蟋蟀。

分 佈：廣東、廣西、雲南；馬來西亞、緬甸、印度、斯里蘭卡、東洋區、非洲(西部)。

Crabro femoralis F. Morawitz (Leclercq, 1982:145)

捕 食 性。

分 佈：黑龍江；西伯利亞。

Crabro fratellus Kohl. (Leclercq, 1982:145)

捕 食 性。

分 佈：黑龍江。

Crabro funestus Kohl (Leclercq, 1982:146)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川。

Crabro ussuriensis Gussakovskij (Leclercq, 1982:146)
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Crabro werestschagini Gussakovskij (Leclercq, 1982:146)
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Crossocerus (Blepharipus) cinxius ssp. **omeinus** Leclercq (Leclercq, 1982:146)
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)

Dasyproctus agilis ssp. **orientalis** (Cameron) (Leclercq, 1982:146)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Dolichurus pempuchiensis Tsuneki 臺灣長背泥蜂 (Wu et Chou, 1985:154)
Dolichurus pempuchiensis Tsuneki
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Dolichurus taprobanae Smith 黑額瘤蠊 (Pu, 1986:8)
捕 食 性。
分 佈：廣西；緬甸、印度、錫金、斯里蘭卡。

Ectemnius (Cameronitus) ammanitus Leclercq (Leclercq, 1982:147)
捕 食 性。
分 佈：四川；越南。

Ectemnius (Metacrabro) chrysites Kohl 橫皺方頭泥蜂 (Hun., 1992:1335; Leclercq, 1982:147)
Ectumnius chrysites Kohl, 1892:
=*Crabro auricomus* Bingham, 1897:
=*Crabro khasianus* Cameron, 1902:
=*Ectemnius* (*Metacrabro*) *butuani* Leclercq, 1963:33.
捕 食：蠅類。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、四川、浙江；朝鮮、日本、蘇聯、菲律賓、印度。

Ectemnius (Hypocrabro) continuus (Fabricius) (Leclercq, 1982:148)
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Ectemnius (Metacrabro) insignis (Smith) (Leclercq, 1982:148)

Crabro insignis Smith, 1856:422.
捕 食 性。
分 佈：香港、四川。

Ectemnius (Metacrabro) konowi Kohl (Leclercq, 1982:149)
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Ectemnius (Cameronitus) melanotarsis (Cameron) (Leclercq, 1982:150)
Crabro melanotarsis Cameron, 1902:60.
=*Crabro elvinus* Cameron, 1905:14.
=*Crabro monozonus* Cameron, 1905:218.
Ectemnius (*Cameronitus*) *monozonus* + *melanotarsis* Leclercq, 1954:283
捕 食 性。
分 佈：四川；喜馬拉雅山。

Ectemnius (Hypocrabro) nielseni (Hohl) (Leclercq, 1982:152)
捕 食 性。
分 佈：江蘇、山東、北京。

Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri (Kohl) (Leclercq, 1982:153)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、澳門、四川、浙江、黑龍江。

Hoplammophila aemulans Kohl 犀角泥蜂 (Zhou et Wu, 1992:1376)
Hoplammophila aemulans Kohl, 1901:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、雲南、四川、浙江、吉林；朝鮮、日本。

Isodontia edax (Bingham) 大紅腹泥蜂 (Li et al., 1990:139; Pu, 1986:8)
捕 食：螽蟴。
分 佈：廣西；越南、印度、錫金、斯里蘭卡。

Larra ampulipennis Smith 寬額小唇沙蜂 (Zhou et Wu, 1992:671)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、河北；日本、泰國。

Larra fenchihuensis Tsuneki 刻臀小唇沙蜂 (Zhou et Wu, 1992:671; 1992:1376)
Larra fenchihuensis Tsuneki, 1967:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇。

Larra luzonensis Rohwer 紅腿小唇沙蜂 (Hun., 1992:1333; Yunn., 1987:1367; Zhou et Wu, 1992:671)

別 名：*異足沙蜂*。
捕 食：蟋蟀若蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、四川、浙江；日本、菲律賓、印尼。

Larra simillima (Smith) 黑尾小唇沙泥蜂 (Li et al., 1990:138; Pu, 1986:8)
捕 食：螻蛄。
分 佈：廣西；印度、蘇門答臘、蘇拉威西。

Leclercqia formosana Tsuneki (Leclercq, 1982:155)
Leclercqia formosana Tsuneki, 1968:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東。

Lestica alacer (Bingham) (Leclercq, 1982:155)
捕 食 性。
分 佈：廣西、四川。

Lestica alata (Panzer) (Leclercq, 1982:155)
捕 食 性。
分 佈：河南、山東、河北、黑龍江。

Lestica camelus (Eversmann) (Leclercq, 1982:155)
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lestica subterranea ssp. **ochotica** (A. Morawitz) (Leclercq, 1982:155)
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lindenius albilabris (Fabricius) (Leclercq, 1982:156)
捕 食 性。
分 佈：黑龍江(松江)。

Liris aurulenta (Fabricius) 金胸小唇沙蜂 (Li et al., 1990:137)
捕 食：蟋蟀。
分 佈：廣西。

Liris deplanata binghami 金毛小唇沙蜂(炳氏亞種) (Hun., 1992:1334)
捕 食：蟋蟀(若蟲)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、江蘇；日本、印度。

Liris docilia Smith 矛小唇沙蜂 (Hun., 1992:1334)
捕 食：沙螽(若蟲)。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南、江蘇；日本、菲律賓。

Liris rohweri Williams 白毛沙蜂 (Yunn., 1987:1367)
捕 食 性。
分 佈：雲南；日本、菲律賓。

Liris subtessellata (Smith) 紅腿角沙蜂 (Li et al., 1990:137; Pu, 1986:8)
捕 食：蟋蟀。
分 佈：廣西；泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡、亞洲西南部、東洋區、琉球群島、馬紹爾群島、夏威夷。

Liris surusumi Tsuneki 褐帶小唇沙蜂 (Zhou et Wu, 1992:671)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江西、四川；日本。

Liris tristis (Smith) 灰黑角沙蜂 (Pu, 1986:8)
捕 食 性。
分 佈：廣西；馬來西亞、加里曼丹、印度。

Lyroda formosa (Smith) 美小唇沙蜂 (Li et al., 1990:136; Pu, 1986:8)
捕 食：蟋蟀。
分 佈：廣西；菲律賓、緬甸、印度、錫金、蘇拉威西、所羅門。

Oxybelus fulvopilosus Cameron 黑叉方頭泥蜂 (Pu, 1986:8)
捕 食 性。
分 佈：廣西；印度。

Palmodesoccitanicus perplexus (Smith) 壯足唇葉泥蜂(困惑亞種) (Li et Yang, 1995:573)
Palmodesoccitanicus perplexus (Smith, 1856:)
捕 食：螽蟴。
分 佈：浙江、陝西、山東、甘肅。

Philanthus (s. str.) **coronatus** Fabricius 花冠大頭泥蜂 (ASZI, 1987, 2:486)
捕 食：蜜蜂。
分 佈：山東、河北、青海、新疆、黑龍江；歐洲。

Philanthus (s. str.) **hellmahni** Eversmann 菱斑大頭泥蜂 (ASZI, 1987, 2:487)
捕 食：蜜蜂。
分 佈：山西、河北、黑龍江；蒙古、蘇聯。

Philanthus (s. str.) **triangulum** Fabricius 山斑大頭泥蜂 (ASZI, 1987, 2:487)
捕 食：蜜蜂。

分 佈：新疆；蘇聯、法國、肯尼亞、埃及、阿爾及利亞。

Pison refale Smith 紫光短翅泥蜂 (Hun.1992:1333)

捕 食：蜘蛛。

分 佈：福建、湖南、四川、浙江。

Podalonia affinis Kirby 齒爪泥蜂 (Yunn.1987:1366; Zhou et Wu, 1992:1376)

Podalonia affinis Kirby, 1798:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川，全北區。

Podalonia affinis ulanbaatoensis Tsuneki 齒爪泥蜂(蒙古亞種) (ASZI, 1987, 2:485)

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：西藏、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江。

Podalonia andrei Morawitz 安氏長足泥蜂 (Wu et Zhou, 1996:297)

Podalonia andrei Morawitz, 1889:

捕 食 性。

分 佈：山西、河北、寧夏、青海、新疆、內蒙古；蒙古。

Podalonia gobiensis chahariana Tsuneki 戈壁泥蜂(河北亞種) (ASZI, 1987, 2:485)

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：河北、新疆、內蒙古。

Podalonia hirsuta Scopoli 多毛泥蜂 (Wu et Zhou, 1996:297; Yunn., 1987:1366; Zhou et Wu, 1992:1376)

Podalonia hirsuta Scopoli, 1763:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、雲南、西藏、河北、青海、新疆、內蒙古；蒙古、蘇聯、地中海、歐洲。

Podalonia obo Tsuneki 敖包泥蜂 (ASZI, 1987, 2:485)

捕 食：鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：河北、新疆、內蒙古；蒙古。

Pomphredom fuscipennis (Cameron) 縱脊黑泥蜂 (Pu, 1986:8)

捕 食 性。

分 佈：廣西；印度。

Sceliphron deforme Smith 駝腹泥蜂 (ASZI, 1987, 2:485; Hun., 1992:1332; Yunn., 1987:1365)

捕 食：蜘蛛。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、山東、河北、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(中亞)、東洋區。

Sceliphron destillatarium Illiger 黑柄泥蜂 (Zhou et Wu, 1988:543)
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫背崩)；全北區。

Sceliphron madraspatanum Fabricius 黃柄泥蜂 (Hun., 1992:1332; Yunn., 1987:1365; Zhou et Wu, 1992:670; 1992:1375)
Sceliphron madraspatanum Fabricius, 1787:
捕 食：蜘蛛。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、河北、新疆、黑龍江；舊北區、日本、菲律賓、印度、印尼。

Sceliphron tubifex Latrail 長柄泥蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:90)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Sceliphron sp. 長柄小腹泥蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:90)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Sphex argentatus Fabricius 白毛泥蜂 (Yunn., 1987:1366; Zhou et Wu, 1992:1375)
Sphex argentatus Fabricius, 1787:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、陝西、山東、河北；日本、菲律賓、印度。

Sphex aurullentus Fabricius 四脊泥蜂 (Zhou et Wu, 1992:1375)
Sphex aurullentus Fabricius, 1787:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣東、四川；日本、菲律賓。

Sphex flammitriehus Strand 黃毛泥蜂 (Hun., 1992:1331)
捕 食：直翅目(若蟲)。
分 佈：雲南、四川、湖南；日本。

Sphex haemoor hoidalis Fabricius 黑毛泥蜂 (Hun., 1992:1332)
捕 食：蝗蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、浙江、遼寧；朝鮮、日本、印度。

Sphex haemorrhoidalis Fabricius 紅足黑泥蜂 (Li et Yang, 1995:573)
Sphex haemorrhoidalis Fabricius, 1781:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、海南、貴州、四川、浙江、安徽；朝鮮、日本、亞洲南部、非

洲中北部。

Sphex sericeus Fabricius 褐毛泥蜂 (Yunn., 1987:1366)

捕 食 性。

分 佈：雲南；日本、菲律賓、印度。

Sphex subtruncatus Dahlbom 黑毛泥蜂 (Li et al., 1990:138; Yunn., 1987:1366; Zhou et Wu, 1992:670; 1992:1375)

Sphex subtruncatus Dahlbom, 1843:

別 名：*黑腳泥蜂*。

捕 食：蟋蟀。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫背崩)、四川、浙江、江蘇、遼寧；朝鮮、日本、菲律賓、泰國、印度。

Sphex sp. 短柄泥蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:90)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Tachytes astutus Nurae 四帶小唇沙蜂 (Zhou et Wu, 1992:1376)

Tachytes astutus Nurae, 1909:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、雲南；泰國、印度。

Tachytes modestus Smith 條胸小唇沙蜂 (Hun., 1992:1334; Li et al., 1990:139; Zhou et Wu, 1992:671)

捕 食：蝗蟲(若蟲)

直翅目。

分 佈：湖南、廣西、浙江、江蘇；朝鮮、日本、緬甸、印度。

Tachytes sinensis Smith 中華小唇沙蜂 (Hun., 1992:1335; Zhou et Wu, 1992:671)

捕 食：蝗蟲(若蟲)。

分 佈：湖南、四川、浙江、江蘇；朝鮮、日本、緬甸、印度。

Trirhogma caerulea Westwood 藍長背泥蜂 (ASZI, 1987, 2:484)

別 名：*藍額葉*。

捕 食：蜚蠊(若蟲)。

分 佈：臺灣、福建、雲南、浙江；緬甸、印度。

Trirogma balaensis Pu et Zhou 八臘額葉蠊蜂 (Pu et Zhou, 1989:304)

Trirogma balaensis Pu et Zhou, 1989:304.

捕 食：*Periplaneta* 大蠊。

分 佈：廣西(天峨八臘)。

Trirogma caerulea Westwood 藍長背泥蜂 (Wu et Chou,1985:153)

Trirogma caerulea Westwood

捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、雲南、浙江；東洋區。

Trirogma pingsheensis Pu et Zhou 平社長背泥蜂 (Pu et Zhou, 1989:303)
Trigogma pingsheensis Pu et Zhou, 1989:303.
捕 食：*Periplaneta* 大蠊。
分 佈：廣西。

Trypoxylon (s. str.) **bicolor** Smith 二色長柄泥蜂 (Pu, 1986:8)
捕 食 性。
分 佈：廣西；馬來西亞、新加坡、緬甸、印度、印尼、夏威夷。

Trypoxylon (s. str.) **intrudens** Smith 捕蛛長柄泥蜂 (Pu, 1986:8)
捕 食 性。
分 佈：廣西；緬甸、印度、斯里蘭卡。

Trypoxylon (s. str.) **pileatum** Smith 盾額黑泥蜂 (Pu, 1986:8)
捕 食 性。
分 佈：廣西；緬甸、印度、斯里蘭卡。

Apidae 蜜蜂科

Coelioxys brevis Eversmann 箭尖腹蜂 (Hun.1992:1344)
寄 主：
分 佈：福建、湖南、廣東、雲南、浙江、江蘇、安徽、山東、河北。

Coelioxys decipiens Spinola 圓尾尖腹蜂 (Hun., 1992:1344)
寄 主：
分 佈：湖南。

Coelioxys elongata Lep. 長尖腹蜂 (Wu, 1982:408)
寄 主：
分 佈：西藏(察雅吉塘)、河北、新疆；蘇聯(高加索)、歐洲、突尼斯。

Coelioxys fenestrata Smith 長板尖腹蜂 (Hun., 1992:1344)
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、江蘇、安徽、山東、河北、北京、東北地區。

Coelioxys mandibularis Nyl. 方顎尖腹蜂 (Wu, 1982:408)
寄 主：
分 佈：西藏(聶拉木)、河北；蘇聯(高加索)、歐洲。

Coelioxys refescens Lep. 黃帶尖腹蜂 (Wu, 1982:407)
寄 主：
分 佈：雲南、西藏(噶爾索賣)、四川、浙江、江蘇、河北、新疆。

Coelioxys ruficincta Cockerell 紅帶尖腹蜂 (Hun., 1992:1344; Wu, 1982:407; Yunn., 1987:1378)
別 名：*黃帶尖腹蜂*。
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖南、西藏(察隅)、貴州、浙江、江蘇、湖北、山西、河北。

Crocisa ramosa Lep. 枝盾斑蜂 (Hun., 1992:1351)
寄 主：
分 佈：湖南、雲南；印度、阿拉伯半島、北非。

Epeolus ventralis Meade-Waldo 白絨斑蜂 (Hun., 1992:1350)
寄 主：
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、山東、河北、內蒙古、遼寧；日本。

Melecta chinensis Cockerell 中國毛斑蜂 (Hun., 1992:1350)
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、河北、遼寧。

Nomada versicolor Smith 彩艷斑蜂 (Hun., 1992:1350)
寄 主：
分 佈：湖南、浙江、江蘇、陝西、河北。

Parevaspis abdominalis Smith 赤腹蜂 (Yunn., 1987:1378)
寄 主：
分 佈：雲南、西藏。

Parevaspis strandi Meyer 斯赤腹蜂 (Yunn., 1987:1378)
寄 主：
分 佈：雲南。

Stelis scutellaris Mor. 盾暗蜂 (Hun., 1992:1344)
寄 主：
分 佈：湖南、河北、內蒙古、吉林、黑龍江。

Megachilidae 切葉蜂科

Osmia cornifrns (Rad.) 角額壁蜂 (Bao, 1996(2):33; Bao, 1997(1):31; Qu et Liu, 1998(1):51; Wei et Zhao, 1995(2):15-16; Wang et al., 1994(4):4-5; Wei et al., 1990(1):31-32; 1992(3):106-108; 1994(2):20-21; 1995(2):15-16; Zhang et al., 1996(1):38; Zhou et al., 1992(6):15)

傳 粉：櫻桃、蘋果、梨。
分 佈：山東、河北(1987 年從日本引進)、遼寧；日本。

Osmia excavata Alfken 凹唇壁蜂 (Bao, 1996(2):33; Bao, 1997(1):31; Fei et al., 1997, 14(3):153-155; Gao et al., 1999(1):12; Lu et al., 1993(1):29-30; Lu et al., 1999(1):13; Wei et Zhao, 1995(2):15-16; Wang et al., 1994(4):4-5; Wang et al., 1997(2):37; Wei et al., 1990(1):31-32; 1992(3):106-108; 1994(2):20-21; 1995(2):15-16; Xu et al., 1994(3):153-156; Zhang et al., 1996(1):38; Zhou et al., 1992(6):15)
傳 粉：櫻桃、蘋果、梨。
分 佈：山東、河北、遼寧。

Osmia jacoti Ckll. 紫壁蜂 (Lu et al., 1993(1):29; Xu et al., 1994(3):153-156)
傳 粉：蘋果、梨、櫻桃。
分 佈：山東。

ARACHNEIDA 蛛形綱

ARANEIDA (Araneae) 蜘蛛目

(Feng et Li, 1989, 16(3):175-180; He et al., 1995, 21(6):19-22;
Heilongjian, Mudingjiang FS., [ed.]:132-133;
Hunan Teachers Coll., 1980(3):31-38; Liao et al., 1993:374-384;
Liiu et al., 1993:73-74; Mao et Liang, 1995, 21(2):42-44; Tang et Zhou, 1983, 5(4):207-214; Yue, 1989:169-178)

Heptathelidae 七紡器蛛科

Heptathela bristowei Gertsch 貝氏七紡蛛 (Chen et al., 1993:136; Hu, 1984:29)

Heptathela bristowei Gertsch, 1967:
棲 息：棗樹。
捕 食：棗害蟲。
分 佈：四川。

Heptathela hangzhouensis Chen et Zhu 杭七紡蛛 (Chen et al., 1993:136; Feng, 1990:26; Hu, 1984:28)

Heptathela hangzhouensis Chen et Zhu, 1981:
棲 息：棗樹。
捕 食：棗害蟲。
分 佈：湖南、廣西、四川、浙江(杭州)、湖北。

Heptathela sinensis (Bishop et Crosby) 中華七紡器蛛 (Chen et al., 1993:136; Wang et Ye, 1983:148; Zhao, 1984:1)

Heptathela sinensis (Bishop et Crosby, 1932)
棲 息：棗樹。
捕 食：棗害蟲。
分 佈：湖北、河南、山東、河北。

Heptathela xianensis Zhu et Wang 西安七紡蛛 (Chen et al., 1993:136; Hu, 1984:29)

Heptathela xianensis Zhu et Wang, 1983:
棲 息：棗樹。
捕 食：棗害蟲。
分 佈：陝西(西安)。

Heptethela yuelushanensis Wang et Ye 岳麓山七紋器蛛 (Chen et al., 1993:137; Hu, 1984:29; Wang et Ye, 1983: 146)

Heptethela yuelushanensis Wang et Ye, 1983:146-148.
棲 息：山坡上田埂營穴居生活、棗樹。
捕 食：棗害蟲。
分 佈：湖南(長沙岳麓山)。

Liphistiidae 八紡蛛科

Liphistius cipingensis Wang 次坪八紡蛛 (Wang, 1989:30)

Liphistius cipingensis Wang, 1989:30-31.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西(井崗山)。

Liphistius heyangensis Zhu et Wang 合陽八紡蛛 (Wang, 1989:30; Zhu et Wang, 1984:)

Liphistius heyangensis Zhu et Wang, 1989:30-31.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：

Ctenizidae 螲蟷科

Bothriocyrtum tractabile Saito 大螲蟷 (Hu, 1984:31)

Bothriocyrtum tractabile Saito, 1933:
棲 息：土洞穴。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺北)。

Latouchia cornuta Qiu et al. 角垃土蛛 (Song, 1987:58)

Latouchia cornuta Qiu et al., 1983:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Latouchia davidi (Simon) 大衛氏垃土蛛 (Hu, 1984:34)

Latouchia davidi (Simon, 1886:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Latouchia fasciata (Strand) 袋束垃土蛛 (Hu, 1984:34)

Latouchia fasciata (Strand, 1907:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：上海。

Latouchia formosensis Kishida 臺灣垃土蛛 (Hu, 1984:34)

Latouchia formosensis Kishida, 1928:
棲 息：石垣縫隙。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺北)。

Latouchia fossorai (Pocock) 傅氏垃土蛛 (Hu, 1984:34)

Latouchia fossorai (Pocock, 1901:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：南京。

Latouchia pavlovi Schenkel 巴氏垃土蛛 (Hu, 1984:31; Song, 1987:59; Zhao, 1984:1)

Latouchia pavlovi Schenkel, 1953:

棲 息：穴居于棉田或其他旱田周圍的堤坡及山林間、地勢高燥、雜草叢生之處

捕 食：夜間出洞捕食甲蟲及其他昆蟲

分 佈：河南、陝西、山東。

Latouchia swihonei (Pocock) 西威氏垃土蛛 (Hu, 1984:34)

Latouchia swihonei (Pocock, 1901:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：南京。

Latouchia vinhiensis Schenkel 威海垃土蛛 (Hu, 1984:34)

Latouchia vinhiensis Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：威海。

Dipluridae 長尾蛛科

Brachythele sp. 湄潭短紡器蛛 (Hu, 1984:41)

Brachythele sp. Hu, 1984:41.

棲 息：地面洞穴。

捕 食 性。

分 佈：貴州(湄潭)。

Brachythele sp. 貴州短紡蛛 (Hu, 1984:41)

Brachythele sp. Hu, 1984:41.

棲 息：洞穴。

捕 食 性。

分 佈：貴州(湄潭)。

Eugarus formosanus Saito 臺灣上戶蛛 (Hu, 1984:44)

Eugarus formosanus Saito, 1933:

棲 息：洞穴。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Macrothele guizhouensis Hu et Li 貴州大疣蛛 (Hu et Li, 1986:35)

Macrothele guizhouensis Hu et Li, 1986:35-37.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州(湄潭縣)。

Macrothele holsti Pocock 赫氏長尾蛛 (Hu, 1984:44)

Macrothele holsti Pocock, 1901:
棲 息：洞穴。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(中南部常見一種毒蜘蛛)。

Macrothele papator Pocock 觸形大疣蛛 (Feng, 1990:27; Hu et Li, 1986:37)

Macrothele papator Pocock, 1901:213.
棲 息：山坡田埂營穴居生活。
捕 食 性。
分 佈：香港、貴州(湄潭)、浙江、湖北(石首)。

Macrothele simplicata (Saito) 黑毛長尾蛛 (Hu, 1984:44)

Ischnothele simplicata Saito, 1933:
棲 息：山地。
捕 食 性。
分 佈：臺灣(北部山區)。

Macrothele sinensis Zhu et Mao 中華尾紡蛛 (Dai, 1997, 19(1):41; 1999, 21(4):165)

棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
葉甲
金龜子
蛾類。
分 佈：貴州。

Atypidae 地蛛科

Atypus formosensis Kishida 臺灣地蛛 (Hu, 1984:37)

Atypus formosensis Kishida
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣(北部)。

Atypus heterothecus Zhang 異囊地蛛 (Dai, 1997, 19(1):41; 1999, 21(4):165; Zhang, 1985:143)

Atypus heterothecus Zhang, 1985:143-146.
棲 息：杉、松樹林中、茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)、金龜(*Anomala* sp.)、葉甲(*Dolaphellus* sp.)、鞘翅目昆蟲、白蟻 *Reticulitermes* sp.、紡織娘 *Mecopoda* sp. 、馬陸 *Prospirobolus* sp.、雙翅目。
分 佈：江西、湖南、廣西、貴州。

Atypus karschi Doenitz 卡氏地蛛 (Feng, 1990:28; Hu, 1984:36; Zhang, 1983:31)
Atypus karschi Doenitz, 1887:
棲 息：菜園、山林樹木根部。
捕 食：昆蟲。
分 佈：臺灣(北部)、湖南、湖北。

Atypus sinensis Schenkel 中國地蛛 (Dai, 1997, 19(1):41; 1999, 21(4):165; Hu, 1984:35; Zhao, 1984:1)
Atypus sinensis Schenkel, 1953:
棲 息：地中管狀網穴、茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州、山東、山西。

Atypus suiningensis Zhang 綏寧地蛛 (Zhang, 1985:140)
Atypus suiningensis Zhang, 1985:140-143.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南(綏寧)。

Calommata signata Karsch 溝紋硬皮地蛛 (Hu, 1984:37)
Calommata signata Karsch, 1879:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州、河南、陝西、山東。

Theraphosidae 捕鳥蛛科

Yamia watasei Kishida 魏氏亞美蛛 (Hu, 1984:46)
Yamia watasei Kishida, 1928:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣(蘭嶼)。

Filistatidae 管網蛛科

Pritha ampulla Wang 瓶形馬蹄蛛 (Wang, 1987:251)
Pritha ampulla Wang, 1987:251-252.

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南(昆明市西山)。

Pritha beijingensis Song 北京馬蹄蛛 (Feng, 1990:29; Song, 1986:43; 1987:60)
Pritha beijingensis Song, 1986:43-44.
棲 息：古建築的墻沿、窗楞或縫隙間結小型于規則網。
捕 食 性。
分 佈：北京。

Pritha spinula Wang 小棘馬蹄蛛 (Wang, 1987:252)
Pritha spinula Wang, 1987:252-254.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南(孟海縣)。

Titanoeca asimilis Song et Zhu 異隱石蛛 (Song, 1987:68)
Titanoeca asimilis Song et Zhu, 1984:
棲 息：麥田和果園的碎土塊下。
捕 食 性。
分 佈：山西。

Tricalamus albidulus Wang 微白二櫛毛蛛 (Wang, 1987:150)
Tricalamus albidulus Wang, 1987:150-152.
捕 食 性。
分 佈：雲南(玉溪縣)。

Tricalamus jiangxiensis Li 江西三櫛毛蛛 (Li, 1994:422)
Tricalamus jiangxiensis Li, 1994:422-424.
捕 食 性。
分 佈：江西。

Tricalamus longimaculatus Wang 長斑三櫛毛蛛 (Wang, 1987:152)
Tricalamus longimaculatus Wang, 1987:152-154.
捕 食 性。
分 佈：雲南(上允)。

Tricalamus menglaensis Wang 孟臘三櫛毛蛛 (Wang, 1987:143)
Tricalamus menglaensis Wang, 1987:143-147.
捕 食 性。
分 佈：雲南(孟臘縣)。

Tricalamus meniscatus Wang 月牙三櫛毛蛛 (Wang, 1987:149)

Tricalamus meniscatus Wang, 1987:149-150.
捕 食 性。
分 佈：雲南(瀾倉)。

Tricalamus papillatus Wang 乳突三櫛毛蛛 (Wang, 1987:154)
Tricalamus papillatus Wang, 1987:154-155.
捕 食 性。
分 佈：貴州(遵義)。

Tricalamus tetragonius Wang 方斑三櫛毛蛛 (Wang, 1987:142)
Tricalamus tetragonius Wang, 1987:142-143.
捕 食 性。
分 佈：雲南(昆明市、玉溪縣)。

Titanoecidae 隱石蛛科

Nurscia albofasciata (Strand) 白斑隱蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; He, et al., 1991:119; Song, 1987:66; Song et Zhu, 1985:73)
Titanoeca albofasciata Strand, 1907:1-4.
=*Tutabieca nipponica* Yaginuma
Nurscia albofasciata Lehtinen, 1967:253.
棲 息：稻田，農田田埂土縫或草叢中；水邊石下及陰濕場所。
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、吉林。

Titanoeca asimilis Song et Zhu 異隱石蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(4):165; Song et Haupt, 1996:315; Song et Zhu, 1985:73)
Titanoeca asimilis Song et Zhu, 1985:73-75.
棲 息:：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe　假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州、西藏、山西(太谷)、青海。

Oecobiidae 埃蛛科(擬壁錢科)

Oecobius afghanicus Kullmann et Zimmermann 阿富汗擬壁錢 (Hu, 1984:48; Song, 1987: 85)
Oecobius afghanicus Kullmann et Zimmermann, 1976:
棲 息：建築物縫隙。
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Oecobius annulipes Lucas 環擬壁錢 (Song, 1987:87)
Oecobius annulipes Lucas, 1849:
棲 息：

捕 食 性。
分 佈：香港、廣東、雲南、四川、湖南。

Oecobius cellariorum (Duges) 戶內擬壁錢 (Feng, 1990:30; Hu, 1984:50; Song, 1987:88)
Oecobius cellariorum (Duges, 1836:)
=*Oecobius shaanxiensis* Qiu et Zheng, 1981:141-142.
=*Oecobius sinensis* Yin et Wang, 1981:143-144.
棲 息：建築物內部墻角上，結灰白色圓網。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、陝西、山東、河北、北京。

Oecobius navus Blackwall 船擬壁錢 (Song et al., 1997:1704)
Oecobius navus Blackwall, 1859:
棲 息：建築物內。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、湖北；全球。

Oecobius shaanxiensis Qiu et Zheng 陝西擬壁錢 (Qiu et Zheng, 1981:141)
Oecobius shaanxiensis Qiu et Zheng, 1981:141-142.
棲 息：建築物內。
捕 食 性。
分 佈：陝西(西安)。

Oecobius sinensis Yin et Wang 中華擬壁錢 (Yin et Wang, 1981:143)
Oecobius sinensis Yin et Wang, 1981:143-144.
棲 息：建築物內。
捕 食 性。
分 佈：浙江(杭州)。

Eresidae 隆頭蛛科

Eresus granosus Simon 念珠隆頭蛛 (Hu, 1984:53)
Eresus granosus Simon, 1895:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Eresus niger (Patagna) 黑隆頭蛛 (Feng, 1990:31; Hu, 1984:51; Song, 1987:62)
Eresus niger (Patagna, 1787:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山東、山西、河北、北京、遼寧。

Eresus tristis Kroneberg 三列隆頭蛛 (Hu, 1984:53)

Eresus tristis Kroneberg, 1875:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆(天山)。

Amaurobiidae 暗蛛科

Coronilla gemata Wang 蕾形花冠蛛 (Wang, 1994:281)

Coronilla gemata Wang, 1994:281-282.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Coronilla sigillata Wang 裝飾花冠蛛 (Wang, 1994:282)

Coronilla sigillata Wang, 1994:282-283.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：浙江(天目山)。

Tamgrinia chhanguensis (Tikader) 昌古塔姆蛛 (Song, 1987:65)

Tegenaria chhanguensis Tikader, 1970:56-57.

Tamgrinia chhanguensis, Brignoli, 1982:350.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Titanoeca albofasciata Strand 白斑隱石蛛 (Feng, 1990:32)

Titanoeca albofasciata Strand, 1907:

棲 息：稻田、棉田、麥地、豆田的土縫、田埂草叢、溪邊草地石塊下，其他陰濕處，結不規則網。爲稻田害蟲的重要天敵之一。

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、四川、浙江、湖北、陝西、河北、北京、吉林。

Titanoeca nipponica Yaginuma 黑隱石蛛 (Hu, 1984:53; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:1)

Titanoeca nipponica Yaginuma, 1951:

棲 息：稻田、棉田、麥田、豆田的土縫間，不結網，爲稻田害蟲重要天敵。

捕 食 性。

分 佈：湖南、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、吉林；日本。

Psechridae 褸網蛛科

Psechrus mimus Chamberlin 類褸網蛛 (Hu, 1984:57; Song, 1987:68)
Psechrus mimus Chamberlin, 1924:
別 名：*擬態褸網蛛*。
棲 息：山洞岩縫及橫凹土洞中，也有在山坡草叢深處及朽樹根穴。網呈杯狀。
捕 食 性。
分 佈：浙江、江蘇(蘇州)、安徽、河南。

Psechrus senoculata Yin et al. 廣褸網蛛 (Feng, 1990:33)
Psechrus senoculata Yin et al., 1985:
棲 息：崖處結漏斗網。
捕 食 性。
分 佈：廣西、貴州、湖南、浙江、安徽。

Psechrus sinensis Berland 中華褸網蛛 (Hu, 1984:55)
Psechrus sinensis Berland, 1914:
棲 息：結不規則網于岩洞壁或灌木叢。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、貴州、湖北。

Psechrus tingpingensis Yin et al. 汀坪褸網蛛 (Feng, 1990:34)
Psechrus tingpingensis Yin et al., 1985:
棲 息：山區岩洞、山坡草叢深處張漏斗網。
捕 食 性。
分 佈：廣西、湖南。

Psechrus torvus O.P. Cambridge 野褸網蛛 (Hu, 1984:56)
Psechrus torvus O.P. Cambridge
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Dictynidae 捲葉蛛科(葉蛛科)

Ajmonia auritus Song et Lu 耳阿捲葉蛛 (Song, 1987:70; Song et Lu, 1985:81)
Ajmonia auritus Song et Lu, 1985:81-82.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆(烏魯木齊)。

Ajmonia capucina (Schenkel) 巾阿捲葉蛛 (Feng, 1990:38; Song, 1987:72)
Dictyna capucina Schenkel, 1936:22-26.
棲 息：于花、果樹枝葉間結不規則網。
捕 食 性。

分 佈：浙江、北京、甘肅。

Archaedictyna consecuta (O. P. Cambridge) 古捲葉蛛 (Song, 1987:72; Song et al., 1985, 2(1):23)

Archaedictyna consecuta (O. P. Cambridge, 1872:)
Archaedictyna consecuta, Lehtinen, 1967:215.
棲 息：農田、果園和林帶。
捕 食 性。
分 佈：河北、新疆。

Dictyna arundinacea (Linnaeus) 蘆葦捲葉蛛 (Dong, 1988:85; Feng, 1990:35; Hu, 1984:58; Li et al., 1983:112; Song, 1987:74; Song et Lu, 1985:77; Zhao, 1984:2)

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758:)
=*Dictyna davida* Schenkel, 1963:25-26.
棲 息：水邊草叢或花生田、旱田作物之莖葉交叉處張網、棉株之嫩尖、花蕾間結不規則小網，有假死性。
捕 食 性。
分 佈：浙江、湖北、河南、山東、山西、河北、青海、寧夏、甘肅、新疆、遼寧、吉林。

Dictyna capuzina Schenkel 卡莆捲葉蛛 (Hu, 1984:60)

Dictyna capuzina Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Dictyna felis Boesenberg et Strand 貓捲葉蛛 (Dai, 1997, 19(1):41; 1999, 21(4):165; Hu, 1984:59; Song, 1987:75; Zhao, 1984:2)

Dictyna felis Boesenberg et Strand, 1906:
=*Dictyna maculosa* Kishida
別 名：*黑斑卷葉蛛*。
棲 息：茶園、灌木林、果園中的桃、蘋果及旱田作物(棉花、小麥、大豆等的葉間結規則網捕食害蟲，附近稻田也可見。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
葉蟬
茶蚜
蚊、蠅
小蛾類。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、浙江、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、青海、甘肅、寧夏、遼寧、吉林。

Dictyna follicola Boesenberg et Strand 膏袋捲葉蛛 (Feng, 1990:36; Hu, 1984:60; Song et Lu, 1985:79)

Dictyna follicola Boesenberg et Strand, 1906:112-113.
別 名：*黑斑卷葉蛛*。
棲 息：小麥、棉花、田邊草叢及果園枝葉間、葉面上，結網似天幕。

捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、湖北、北京、甘肅、遼寧、吉林。

Dictyna hedini Schenkel 何氏捲葉蛛 (Hu, 1984:60)
Dictyna hedini Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Dictyna hummeli Schenkel 胡氏捲葉蛛 (Hu, 1984:60; Zhao, 1984:2)
Dictyna hummeli Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅、新疆。

Dictyna major Menge 大捲葉蛛 (Hu, 1984:60; Song, 1987:75; Song et Lu, 1985:77)
Dictyna major Menge, 1866:
=*Dictyna potanini* Schenkel, 1963:100-102.
棲 息：大豆田。
捕 食 性。
分 佈：甘肅(蘭州)、內蒙古、吉林。

Dictyna nasutus Thorell 嗅敏捲葉蛛 (Hu, 1984:60)
Dictyna nasutus Thorell
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西。

Dictyna paitaensis Schenkel 盤洞捲葉蛛 (Hu, 1984:60)
Dictyna paitaensis Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Dictyna psittacea Schenkel 鸚捲葉蛛 (Hu, 1984:60)
Dictyna psittacea Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Dictyna uncinta Thorell 反鈎捲葉蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(4):165; Hu, 1984:60)
Dictyna uncinta Thorell, 1856:
棲 息：茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe　假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州、甘肅、新疆。

Dictyna wangi Song et Zhou 王氏捲葉蛛 (Song, 1987:76; Song et Zhou, 1986:261)

Dictyna wangi Song et Zhou, 1986:261-262.
棲 息：果樹樹幹。
捕 食 性。
分 佈：新疆(且末縣)。

Dictyna xinjiangensis Song et Wang 新疆捲葉蛛 (Song, 1987:78; Song et al., 1985, 2(1):23-25)

Dictyna xinjiangensis Song et Wang, 1985:23-25
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Dictyna yunnanensis Schenkel 雲南捲葉蛛 (Hu, 1984:60)

Dictyna yunnanensis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Lathys humilis (Blackwall) 潤隱蔽蛛 (Hu, 1984:60)

Lathys humilis (Blackwall, 1855:)
棲 息：林間草叢。
捕 食 性。
分 佈：山東(長山島)、甘肅。

Sudesna hedini (Schenkel) 赫氏蘇蛛 (Feng, 1990:37; Song, 1987:79; Song et Lu, 1985:80)

Dictyna hedini Schenkel, 1936:14-17.
Sudesna hedini, Lehtinen, 1967:265.
棲 息：旱田、山坡、水邊農作物上，結不規則網。
捕 食 性。
分 佈：浙江、河北、北京、甘肅。

Uloboridae 武蛛科

Hyptiotes affinis Boesenberg et Strand 親三角蛛 (Feng, 1990:39; Hu, 1984:62; Song, 1987:81)

Hyptiotes affinis Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：山間、路旁、灌木叢或松樹枝幹上、林間之低暗處作三角形網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、河北、北京。

Miagrammopes orientalis Boesenberg et Strand 東方長武蛛 (Hu, 1984:63; Song, 1987:82; Song et al.,

1997:1705)
Miagrammopes orientalis Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江(西天目山)、湖北、山西；日本。

Octonoba spinosa Yohsida 刺渦蛛 (Song, 1987:83)
Octonoba spinosa Yohsida, 1982:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Octonoba sinensis (Simon) 中華渦蛛 (Dai. 1997, 19(1):41; 1999, 21(4):165; Feng, 1990:40; He, et al., 1991:119; Shi et al., 1989-90:88; Song, 1987:82)
Uloborus sinensis Simon, 1880:
別 名：*中華武蛛*。
棲 息：稻田、棉田、茶園、橘園、荔枝園草叢等地的陰蔽處、屋內外墻角、樹洞，也常見在住宅周圍；張結水平小網，網上有白色絲帶。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
蚊
小蛾類。
分 佈：湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇；上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、遼寧、吉林。

Octonoba taiwanica Yoshida 臺灣渦蛛 (Song, 1987:84)
Octonoba taiwanica Yoshida, 1982:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Octonoba varians (Boesenberg et Strand) 變異渦蛛 (He, et al., 1991:119)
棲 息：稻田。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨。
分 佈：福建、湖南、雲南、貴州、江蘇、湖北。

Philoponella nasutus (Thorell) 鼻狀菲蛛 (Feng, 1990:42)
Philoponella nasutus (Thorell, 1873:)
棲 息：山間雜草間張小型圓網。
捕 食 性。
分 佈：四川。

Philoponella promineus (Boesenberg et Strand) 隆背武蛛 (Dai, 1997, 19(1):41; 1999, 21(4):165; Feng,

1990:41; He, et al., 1991:119)
Uloborus promineus Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田、茶園、山洞的岩壁上、山間灌木叢、雜草間，結圓網。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
蚊
小蛾類。
分 佈：貴州、雲南、湖南、浙江、甘肅。

Ulobrous defectus Boesenberg et Strand 陰武蛛 (Hu, 1984:64)
Ulobrous defectus Boes et Str, 1906:
棲 息：庫房、洞室的墻隅結圓網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Ulobrous geniculatus (Oliv) 膝形武蛛 (Hu, 1984:65)
Ulobrous geniculatus (Oliv, 1789:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建。

Ulobrous nasutus Thorell 長鼻武蛛 (Hu, 1984:65)
Ulobrous nasutus Thorell
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西。

Ulobrous plumipes (Laterille) 羽武蛛 (Hu, 1984:66)
Ulobrous plumipes (Laterille)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Ulobrous prominens Boesenberg et Strand 隆背武蛛 (Hu, 1984:66)
Ulobrous prominens Boesenberg et Strand, 1905:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州、上海。

Ulobrous sinensis Simon 中華武蛛 (Hu, 1984:64; Li et al., 1983:112; Zhao, 1984:1)
Ulobrous sinensis Simon, 1880:
棲 息：麥田、花生田、棉田、稻田、村庄、山區林場、果園以及戶內也可見。
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣東、貴州、四川、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、

北京、甘肅、吉林。

Ulobrous varians Boesenberg et Strand 齒網武蛛 (Hu, 1984:65)

Ulobrous varians Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：稻叢的中、上部結園網。

捕 食：水稻害蟲。

分 佈：貴州、四川、浙江、江蘇。

Uloborus walckenaeri Laterille 草間武蛛 (Dai, 1997, 19(1):41; 1999, 21(4):165; He, et al., 1991:120; Hu, 1984:66; Yan et Wang, 1987:16)

Uloborus walckenaeri Laterille, 1806:

棲 息：稻田、茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

蚊

小蛾類。

分 佈：福建、湖南、貴州、四川、河南、甘肅。

Zoropsidae 擬暗蛛科

Zoropsis nishmurai Yaginuma 叉枝擬暗蛛 (Hu, 1984:66)

Zoropsis nishmurai Yaginuma, 1963:

棲 息：茶園。

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Dysderidae 石蛛科

Dysdera crocota Koch 石蜘蛛 (Hu, 1984:67)

Dysdera crocota Koch, 1839:

棲 息：石塊下。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Segestriidae 類石蛛科

Ariadna elaphros Wang 敏捷垣蛛 (Wang, 1993:418)

Ariadna elaphros Wang, 1993:418-419.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：福;建、湖南。

Ariadna lateralis (Karsch) 側樹皮蛛 (Hu, 1984:68)

Ariadna lateralis (Karsch, 1881:)

棲 息：林間或果園的樹皮間。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江、山東、遼寧。

Ariadna pelios Wang 黑色垣蛛 (Wang, 1993:417)
Ariadna pelios Wang, 1993:417-418.
棲 息：多生活在石隙間。
捕 食 性。
分 佈：雲南(西山)。

Segestria bavarica C. L. Koch 巴伐利亞類石蛛 (Xu, 1987:247)
Segestria bavarica C. L. Koch
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：安徽(潛山縣)。

Leptonetidae 弱蛛科(洞蛛科)

Leptoneta anocellata Chen et al. 無眼弱蛛 (Chen et al., 1986:40; Song, 1987:98)
Leptoneta anocellata Chen et al., 1986:40-41.
棲 息：洞穴。
捕 食 性。
分 佈：浙江(金華)。

Leptoneta hangzhouensis Chen et al. 杭州弱蛛 (Song, 1987::98)
Leptoneta hangzhouensis Chen et al., 1984:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Leptoneta huanglongensis Chen et Song 黃龍弱蛛 (Hu, 1984:69; Song, 1987:100; Yin et al., 1984:364)
Leptoneta huanglongensis Chen et Song, 1982:204-206.
棲 息：山洞穴中 •
捕 食 性。
分 佈：浙江(杭州黃龍洞)。

Leptoneta linggiensis Chen et al. 靈棲弱蛛 (Song, 1987:100)
Leptoneta linggiensis Chen et al., 1984:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Leptoneta maculosa Song et Xu 斑腹弱蛛 (Song, 1987:101)

Leptoneta maculosa Song et Xu, 1985:
棲 息：淺岩洞石下，在石下凹處結不規小網。
捕 食 性。
分 佈：安徽。

Leptoneta microdonta Xu et Song 小齒弱蛛 (Song, 1987:103)
Leptoneta microdonta Xu et Song, 1983:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：安徽。

Leptoneta monodactyla Yin, Wang et Wang 單指弱蛛 (Song, 1987:104; Yin et al., 1984:366)
Leptoneta monodactyla Yin, Wang et Wang, 1984:366-367.
棲 息：石下。
捕 食 性。
分 佈：湖南(酃縣)。

Leptoneta trispinosa Yin, Wang et Wang 三刺弱蛛 (Song, 1987:105; Yin et al., 1984:364)
Leptoneta trispinosa Yin et al., 1984:364-365.
棲 息：近溪水邊的潮濕亂石下，結不規則網。
捕 食 性。
分 佈：湖南(長沙岳麓山)。

Leptoneta tunxiensis Song et Xu 屯溪弱蛛 (Song, 1987:106)
Leptoneta tunxiensis Song et Xu, 1985:
棲 息：山腳向陽處亂石堆下層石下，在石凹處結近三角的不規則小網。
捕 食 性。
分 佈：安徽。

Leptoneta unispinosa Yin, Wang et Wang 單刺弱蛛 (Song, 1987:107; Yin et al., 1984:367)
Leptoneta unispinosa Yin, Wang et Wang, 1984:367-369.
棲 息：草叢。
捕 食 性。
分 佈：湖南(長沙岳麓山)。

Oonopidae 卵形蛛科

Epectris conujaingensis Xu 古牛降埃蛛 (Xu, 1986:271)
Epectris conujaingensis Xu, 1986:271-272.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：安徽(石台縣古牛降自然保護區)。

Gamasomorpha anhuiensis Song et Xu 安徽加馬蛛 (Song, 1987:90; Song et Xu, 1984:361)

Gamasomorpha anhuiensis Song et Xu, 1984:361-363.

棲 息：山洞中。

捕 食 性。

分 佈：安徽(黟縣)。

Gamasomorpha cataphracta Karsch 甲冑馬加蛛 (Hu, 1984:71; Song, 1987:90)

Ischnothyreus cataphracta Karsch, 1841:

Ischnothyreus japonicus Oi

棲 息：腐葉下。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Gamasomorpha nigrilineata Xu 黑紋蟎蛛 (Xu, 1986:270)

Gamasomorpha nigrilineata Xu, 1986:270-271.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：安徽(休寧縣齊雲山)。

Ischnothyreus formosus Brignoli 臺灣弱斑蛛 (Song, 1987:91)

Ischnothyreus formosus Brignoli, 1974:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣、安徽。

Opopaea cornuta Yin et Wang 角液蛛 (Feng, 1990:43; Song, 1987:92)

Opopaea cornuta Yin et Wang, 1984:

棲 息：枯草或油棕花序中。

捕 食 性。

分 佈：湖南、雲南。

Opopaea medius Song et Xu 中位巨膝蛛 (Song, 1987:94; Song et Xu, 1984:362)

Opopaea medius Song et Xu, 1984:362-363.

棲 息：樹皮下。

捕 食 性。

分 佈：安徽(屯溪)。

Opopaea plumula Yin et Wang 羽巨膝蛛 (Song, 1987:94)

Opopaea plumula Yin et Wang, 1984:

棲 息：枯草、落葉叢中。

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Opopaea sauteri Brignoli 索氏巨膝蛛 (Song, 1987:95)

Opopaea sauteri Brignoli, 1974:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Orchestina sinensis Xu 中國奧蛛 (Xu, 1987:256)

Orchestina sinensis Xu, 1987:256-257.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：安徽(齊雲縣、黃山)。

Orchestina thoracica Xu 紋胸奧蛛 (Xu, 1987:257)

Orchestina thoracica Xu, 1987:257-258.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：安徽(屯溪市茅山)。

Pseudotriaeris karschi (Boesenberg et Strand) 卡氏奇肢蛛 (Song, 1987:96)

Pseudotriaeris karschi (Boesenberg et Strand, 1906:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：安徽；日本。

Sicariidae 花皮蛛科

Scytodes depressus Schenkel 凹低花皮蛛 (Hu, 1984:74)

Scytodes depressus Schenkel, 1953:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：天津。

Scytodes semipullata Simon 半曳花皮蛛 (Hu, 1984:74)

Scytodes semipullata Simon, 1909:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：西藏(亞東)。

Scytodes thoracica (Latreille) 黃昏花皮蛛 (Feng, 1990:44; Hu, 1984:73)

Scytodes thoracica (Latreille, 1804:)

別 名：*胸斑花皮蛛*。

棲 息：室內暗處、野外林間、果園、山洞或土墻的裂隙等光線較暗處，不規則網。

捕 食：昆蟲。

分 佈：臺灣、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、陝西、山東、山西、河北、天津、北京、遼寧。

Trionycha 三爪類

Pholcidae 幽靈蛛科

Artema atlanta Walckenaer 二齒幽靈蛛 (Feng, 1990:45)

Artema atlanta Walckenaer, 1837:

棲 息：屋內角落或頂棚下。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東。

Pholcus affinis Schenkel 近親幽靈蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(4):165; Feng, 1990:46; He, et al., 1991:120; Hu, 1984:80; Song, 1987:109)

Pholcus affinis Schenkel, 1953:

棲 息：稻田、茶園，室內外結不規則網。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

蚊

小蛾類。

分 佈：貴州、湖南、江蘇、上海、河南、陝西、河北、北京、青海、內蒙古、遼寧、吉林。

Pholcus clavatus Schnekel 棒幽靈蛛 (Hu, 1984:80)

Pholcus clavatus Schnekel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Pholcus crypticoleus Boesenberg et Strand 隱股幽靈蛛 (Feng, 1990:47; He, et al., 1991:120; Hu, 1984:77; Song, 1987:110)

Pholcus crypticoleus Boesenberg et Strand, 1906:

別 名：*隱匿幽靈蛛*。

棲 息：稻田、山區岩縫、灌木叢暗處及野外水邊岩縫中結不規則網。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、吉林。

Pholcus henanensis Zhu et Mao 豫幽靈蛛 (Hu, 1984:80)

Pholcus henanensis Zhu et Mao, 1983:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河南(滎陽)。

Pholcus jixianensis Zhu et Yu 薊幽靈蛛 (Hu, 1984:80)
Pholcus jixianensis Zhu et Yu, 1983:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：天津(薊縣)。

Pholcus opilionides (Schrank) 擬盲幽靈蛛 (He, et al., 1991:120; Hu, 1984:78; Li et al., 1983:112)
Pholcus opilionides (Schrank, 1781:)
別 名：*長踦幽靈蛛*。
棲 息：稻田、花生田、旱田作物間及果園，結不規則網。
捕 食 性。
分 佈：江蘇、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆、遼寧、吉林。

Pholcus phalangioides (Fuesslin) (Barrion et Litsinger, 1995:37; Hu, 1984:80)
Aranea phalangioides Fiesslin, 1775:61.
Pholcus phalangioides, Emerton, 1882:30.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、新疆；廣泛(Cosmopolitan)。

Pholcus sinensis Zhu et Wang 中國幽靈蛛 (Hu, 1984:78)
Pholcus sinensis Zhu et Wang, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：陝西(華山)、遼寧。

Scytodes thoracica (Latreille) (Barrion et Litsinger, 1995:37)
Aranea thoracica Latreille, 1804:134.
Scytodes thoracica, Emerton, 1882:31.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣泛(Cosmopolitan)。

Spermophora anhuiensis Xu et Wang 安徽六眼幽靈蛛 (Song, 1987:110)
Spermophora anhuiensis Xu et Wang, 1984:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：安徽。

Spermophora domestica Yin et Wang 家六眼幽靈蛛 (Song, 1987:111; Yin et Wang, 1981:378)
Spermophora domestica Yin et Wang, 1981:378-380.
棲 息：室內書櫃、抽屜。
捕 食：*Lepisma* sp. 衣魚。

分 佈：湖南。

Spermophora elongata Yin et Wang 長六眼幽靈蛛 (He, et al., 1991:120; Hu, 1984:80; Song, 1987:112; Yin et Wang., 1981: 380)

Spermophora elongata Yin et Wang, 1981:380-381.
棲 息：稻田、榕樹氣生根叢間，結網不規則。
捕 食 性。
分 佈：雲南、湖南、江蘇、河南。

Spermophora forcipata Tu 鉗六眼幽靈蛛 (Tu, 1994:419)

Spermophora forcipata Tu, 1994:419-420.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山)。

Spermophora rollofoliolata Wang 捲葉六眼幽靈蛛 (Song, 1987:113)

Spermophora rollofoliolata Wang, 1983:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Spermophora senoculata (Duges) 廣六眼幽靈蛛 (Hu, 1984:81)

Spermophora senoculata (Duges, 1836:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Spermophora yadongensis Hu 亞東六眼幽靈蛛 (Hu, 1985:148)

Spermophora yadongensis Hu, 1985:148-150.
棲 息：雲杉林間的石縫、洞穴植物的根系間。
捕 食 性。
分 佈：西藏(亞東)。

Zodariidae 擬平腹蛛科

Suffucia hingstoni Brignoli 欣氏薩弗蛛 (Song, 1987:64)

Suffucia hingstoni Brignoli, 1982:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏(3,350m)。

Zodarium chaoyaongense Zhu et Zhu 遼擬平腹蛛 (Zhu, 1988:353; Zhu et Zhu, 1983:)

Zodarium chaoyaongense Zhu et Zhu, 1983:

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河北、遼寧。

Zodarium furcum Zhu 叉擬平腹蛛 (Zhu, 1988:354)
Zodarium furcum Zhu, 1988:354-355.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河北。

Hersiliidae 長紡器蛛科

Hersilia albomaculata Wang et Yin 白斑長器蛛 (Jing, 1985:445; Song, 1987:114; Wang et Yin, 1985:47)
Hersilia albomaculata Wang et Yin, 1985:47-48.
棲 息：樹幹、墻壁。
捕 食 性。
分 佈：浙江(莫干山)、安徽(黃山)。

Hersilia asiatica Song 亞洲長紡器蛛 (Feng, 1990:48; Hu, 1984:81; Song, 1987:116)
Hersilia asiatica Song, 1982:
棲 息：不結網，游獵于果園樹幹上或墻壁上。
捕 食 性。
分 佈：廣東、浙江等省。

Hersilia savignyi Lucas 薩氏長疣蛛 (Hu, 1984:82; Wang et Yin, 1985:47)
Hersilia savignyi Lucas, 1836:
棲 息：樹幹上。
捕 食 性。
分 佈：臺灣；印度、日本。

Hersilia striata Wang et Yin 波紋長紡器蛛 (Song, 1987:117; Wang et Yin, 1985:45)
Hersilia striata Wang et Yin, 1985:45-47.
棲 息：橡膠樹幹。
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Hersilia yunnanensis Wang et al. 雲南長紡蛛 (Wang et al., 1993:33)
Hersilia yunnanensis Wang et al., 1993:33-36.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南(麗瑞)。

Urocteidae 壁錢科

Uroctea compactilis L. Koch 華南壁錢 (Feng, 1990:49; Hu, 1984:84)

Uroctea compactilis L. Koch, 1878:

棲 息：室內，或戶外土墻。

捕 食 性。

分 佈：雲南、貴州、四川、湖南、浙江、安徽。

Uroctea lesserti Schnekel 北國壁錢 (Feng, 1990:50; Hu, 1984:83)

Uroctea lesserti Schnekel, 1936:

棲 息：花生田、林間、果園的樹皮縫隙間、山地石塊下或戶內之墻壁、屋角、門背、墻壁上等處結白色產室或住所，扁圓如錢，直徑 3 - 5 厘米，周緣引出許多放射狀觸絲，白天隱匿其中，夜間出巢掠食。

捕 食：林、果及醫學害蟲。

分 佈：江蘇、河南、山東、河北、北京、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江等省。

[附 註]此種蜘蛛的體軀及其卵囊供藥用：性寒，味咸、苦，無毒。有清熱解毒、活血止血功庇能。對喉頭炎、扁桃體、腔、牙齦潰瘍、鼻衄等巾療效。

Uroctea 11-maculata Schenkel 十一斑壁錢 (Hu, 1984:86)

Uroctea 11-maculata Schenkel, 1953:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：山西。

Araneidae 圓蛛科 (Argiopidae)

Aculepeira sp. 尖蛛 (Song et Haupt, 1996:311)

Aculepeira sp. Song et Haupt, 1996:311.

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Acusilas coccineus Simon 褐吊葉圓蛛 (Hu, 1984:88; Tang et Zhou, 1983:207-214)

Acusilas coccineus Simon, 1895:

棲 息：山間林中布網，網上有一枯葉作隱蔽處所。

捕 食：黑尾葉蟬

大白翅葉蟬。

分 佈：廣東、湖南。

Anepsion maritatum (O.P. Cambridge) 禿頭圓蛛 (Song, 1987:158)

Anepsion maritatum (O.P. Cambridge, 1877:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南。

Arachnura heptotuberculata Yin et al. 七瘤尾圓蛛 (Feng, 1990:51)

Arachnura heptotuberculata Yin et al., 1983:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Arachnura logio Yaginuma 雙峰曳尾蛛 (Hu, 1984:101)

Arachnura logio Yaginuma, 1956:
棲 息：江南稻區。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江。

Arachnura melanuar Simon 黃色曳尾蛛 (Hu, 1984:100)

Arachnura melanuar Simon, 1867:
棲 息：喜在榕樹上張網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Araneus abscissus (Karsch) 隆肩圓蛛 (Hu, 1984:98; Song, 1987:158)

Epeira abscissus Karsch, 1879:69-70.
Araneus abscissus, Yaginuma, 1974:53.
棲 息：低山背風向陽處灌木上、柞樹上或其他灌木；不結網。
捕 食：柞蠶、果蠅、虻類、尺蠖幼蟲。
分 佈：遼寧、吉林。

Araneus adianta Walckenaer 線紋圓蛛 (Hu, 1984:98)

Araneus adianta Walckenaer, 1802:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Araneus alternidens Schenkel 交疊圓蛛 (Feng, 1990:52; He, et al., 1991:120; Hu, 1984:88)

Araneus alternidens Schenkel, 1937:
棲 息：稻田、田邊、草叢布圓網。
捕 食：水稻害蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、江蘇、安徽、湖北、山東、天津。

Araneus angulopictus (Schenkel) 棘圓蛛 (Hu, 1984:98)

Araneus angulopictus (Schenkel, 1953:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Araneus apimus (L. Koch) 紫紅圓蛛 (Hu, 1984:99)

Araneus apimus (L. Koch)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南、湖南。

Araneus arcopictus Schnekel 弧斑圓蛛 (Hu, 1984:89)

Araneus arcopictus Schnekel, 1953:
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：四川、天津。

Araneus badiofoliatus Schenkel 栗色圓蛛 (Hu, 1984:99)

Araneus badiofoliatus Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Araneus basaltea (Schenkel) 雪圓蛛 (Hu, 1984:99)

Araneus basaltea (Schenkel, 1936:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Araneus borneri Strand 包氏圓蛛 (Hu, 1984:99)

Araneus borneri Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：上海。

Araneus carbonarius sinensis (Schenkel) 中華黑圓蛛 (Hu, 1984:99)

Araneus carbonarius sinensis (Schenkel, 1953:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏、北京、新疆。

Araneus cavaleriei Schenkel 卡氏圓蛛 (Feng, 1990:53; Song, 1987:160)

Araneus cavaleriei Schenkel, 1963:
棲 息：果園雜草或灌木叢中張網。
捕 食 性。
分 佈：廣西、甘肅。

Araneus citricola Forskel 橘圓蛛 (He, et al., 1991:120)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、甘肅。

Araneus cornutus Clerck 角圓蛛 (ASZI, 1987, 2:855; Dai, 1999, 21(4):165;Dong, 1988:85; Feng, 1990:54; He, et al., 1991:120; Hu, 1984:89; Li et al., 1983:112; Song, 1987:161; Wang et al., 1989:120; Wang et al., 1994, 16(1):40-43; Zhang et Li, 1982: 228; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao, 1984:2)

Araneus cornuta Clerck, 1757:
棲 息：樹叢、茶園、棉田、稻田、菜地、花生田、荻和蘆葦田、果園、旱田等、山區、平原的樹叢間。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
稻葉蟬
稻飛蝨
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
棉鈴蟲
棉葉蟬。
分 佈：江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、全北區。

Araneus cucurbitinus Clerck 八斑圓蛛 (Hu, 1984:99; Zhao, 1984:2)

Araneus cucurbitinus Clerck, 1758:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、湖北、河南、陝西、山東、甘肅、內蒙古、吉林。

Araneus davidi Schenkel 大衛氏圓蛛 (Hu, 1984:99)

Araneus davidi Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Araneus decentella Strand 麗圓蛛 (Hu, 1984:99)

Araneus decentella Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：上海。

Araneus dehaani (Doleschall) 三角圓蛛 (Feng, 1990:55; Hu, 1984:89)

Araneus dehaani (Doleschall, 1859:)
棲 息：熱帶林區灌木叢，結垂直圓網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南。

Araneus diadema Linnaeus 王冠圓蛛 (Hu, 1984:90)
Araneus diadema Linnaeus, 1758:
棲 息：山地灌木叢中結網。
捕 食 性。
分 佈：陝西、山東、河北、新疆、內蒙古。

Araneus diadematus Clerck 十字圓蛛 (Feng, 1990:56; Song, 1987:162; Wang et al., 1994, 16(1):40-42)
Araneus diadematus Clerck, 1758:
棲 息：丘陵灌木叢及果園，結圓網。
捕 食 性。
分 佈：河北、北京、吉林。

Araneus displicatus Henty 六斑圓蛛 (He, et al., 1991:120; Hu, 1984:91; Song, 1987:162; Wang et al., 1994, 16(1):40-42; Zhang, 1998, 14(2):47; Zhao, 1984:2)
Araneus displicata Hentz, 1847:
棲 息：稻田、山區旱田作物間張網捕蟲。
捕 食 性。
分 佈：西藏、湖南、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Araneus doenitzi (Beosenberg et Strant) 黃褐圓蛛 (Hu, 1984:99)
Araneus doenitzi (Beosenberg et Strant, 1906:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：上海。

Araneus doenitzi persecta (Beosenberg) 波黃圓蛛 (Hu, 1984:99)
Araneus doenitzi persecta (Schenkel, 1936:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Araneus dumetorum Fourcroy 荊圓蛛 (Hu, 1984:99)
Araneus dumetorum Fourcroy, 1785:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古、吉林。

Araneus ejusmodi Boesenberg et Strant 黃斑圓蛛 (Dai, 1999, 21(40:165; Feng, 1990:57; He, et al., 1991:120; Hu, 1984:92; Li et al., 1983:112; Yan et Wang, 1987:16; Zhang, 1983:30; Zhang et Li, 1982:228)
Araneus ejusmodi Boesenberg et Strant, 1906:
棲 息：稻叢中布小型圓網、菜園、花生田、茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻飛蝨
稻葉蟬。
Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西。

Araneus foliata Fourcroy 葉紋圓蛛 (Hu, 1984:99)
Araneus foliata Fourcroy, 1785:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Araneus fuscolorata Boesenberg et Strant 灰褐圓蛛 (Dong, 1988:85; He, et al., 1991:120; Hu, 1984:92)
棲 息：稻田、茶園、山區林間、灌木叢或農田的作物間布網；平原地區的果園中。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆。

Araneus holmi (Schenkel) 赫氏圓蛛 (Hu, 1984:99)
Araneus holmi (Schenkel, 1953:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Araneus inconspicua (Simon) 匿圓蛛 (Hu, 1984:99)
Araneus inconspicua (Simon, 1874:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Araneus inustus (C. L. Koch) 卵形圓蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:631; He, et al., 1991:120; Hu, 1984:93)
Epeira inustus C. L. Koch, 1871:94.
Araneus inustus, Barrion et Litsinger, 1995:631.
棲 息：稻田，熱帶性蜘蛛，林間張網，也居草原，晝間藏于葉下，傍晚結網，網爲垂直圓網。
捕 食：稻飛蝨。
分 佈：臺灣；南亞、東南亞洲。

Araneus ishisawai Kishida 石氏圓蛛 (Hu, 1984:93)
Araneus ishisawai Kishida, 1928:
棲 息：山區林叢間張網。
捕 食 性。
分 佈：山東(沂南)。

Araneus laglaizai (Simon) 拖尾圓蛛 (Song, 1987:163)

Araneus laglaizai (Simon, 1877:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：海南。

Araneus lateus Saito 褐斑圓蛛 (Hu, 1984:94)

Araneus lateus Saito, 1933:
棲 息：林間張網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Araneus licenti (Schenkel) 放蕩圓蛛 (Hu, 1984:99)

Araneus licenti (Schenkel, 1953:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Araneus lugubris (Walckenaer) 暗圓蛛 (He, et al., 1991:121; Hu, 1984:94)

Araneus lugubris (Walckenaer, 1841:)
=*Araneus opimus* (L. Koch)
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川、安徽、陝西、山西。

Areneus marmoreus Clerck 花崗圓蛛 (Song, 1987:164; Wang et al., 1994, 16(1):40-42)

Areneus marmoreus Clerck, 1757:
棲 息：森林邊緣及果園，結大型圓網。
捕 食 性。
分 佈：山西、內蒙古、吉林。

Araneus marmoroides (Schenkel) 石紋圓蛛 (Hu, 1984:99)

Areneus marmoroides (Schenkel, 1953:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Araneus mellotteei (Simon) 柔弱圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus mellotteei (Simon, 1869:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Araneus mitificus (Simon) 麗圓蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:638; Feng, 1990:58; He, et al., 1991:121; Hu, 1984:95)

Epeira mitifica Simon, 1886:150.
Araneus mitifica Boesenberg et Strand, 1906:22.
=*Zilla nawazi* Dyal, 1935:186.
Araneus mitificus, Yaginuma, 1978:55.
別 名：*黑綠圓蛛，黑斑圓蛛*。
棲 息：稻田、橘園或山麓林間。網爲圓網，信號絲引至樹葉上。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、香港、四川、浙江、安徽；日本、菲律賓、越南、新加坡、泰國、緬甸、印度、孟加拉、巴基斯坦、巴布亞新幾內亞。

Araneus nigromaculatus Schenkel 黑色圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus nigromaculatus Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Araneus ovigera Panzer 卵斑圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus ovigera Panzer, 1804:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江蘇(蘇州)、北京。

Araneus paitaensis (Schenkel) 北京圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus paitaensis (Schenkel, 1953:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Araneus pentagrammicus (Karsch) 五紋圓蛛 (Feng, 1990:61; Hu, 1984:95)

Araneus pentagrammicus (Karsch, 1879:)
棲 息：張網在稻田、果園及山麓林間，爲不完全圓網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、貴州、四川、湖南。

Araneus pinguis (Karsch) 肥胖圓蛛 (ASZI, 1987, 2:855; Hu, 1984:95; Song, 1987:165; Wang et al., 1989:121; Wang et al., 1994, 16(1):40-42)

Araneus pinguis (Karsch, 1879:)
棲 息：山地林間之灌木叢中張網，亦見于平原的大豆田、荻和蘆葦田。
捕 食 性。
分 佈：湖南、寧夏、新疆、內蒙古、吉林、黑龍江；日本。

Araneus potanini (Simon) 包頭圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus potanini (Simon, 1895:)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙。

Araneus pseudoscylla (Schenkel) 凹凸圓蛛 (Hu, 1984:100)
Araneus pseudoscylla (Schenkel, 1953:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：天津。

Araneus raji Scopoli 蘭氏圓蛛 (Hu, 1984:100)
Araneus raji Scopoli, 1763:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：東北。

Araneus reaumurii Scopoli 列氏圓蛛 (Hu, 1984:100)
Araneus reaumurii Scopoli, 1763:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江蘇(蘇州)。

Araneus rufofemorata (Simon) 褐色圓蛛 (Hu, 1984:100)
Araneus rufofemorata (Simon, 1884:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：香港、臺灣、上海。

Araneus semilunaris (Karsch) 半月圓蛛 (He et al., 1991:121; Hu, 1984:96)
Araneus semilunaris (Karsch, 1879:)
棲 息：山區灌木叢或林間張網，稻田也可見。
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江、安徽、陝西、山東。

Araneus sia Strand 葉斑圓蛛 (Dong, 1988:85; Hu, 1984:97; Li et al., 1983:112; Wang et al., 1989:121; Zhang et Li, 1982:228; Zhao, 1984:2; Zong et al., 1984:249)
Araneus sia Strand, 1906:
棲 息：麥田、花生田、棉田或其他旱田的作物間張網；野外之灌木叢及稻區也可見。
捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻
雙翅目、鱗翅目等多種害蟲。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、北京、新疆、吉林。

Araneus subpullatus Boesenberg et Strant 白緣圓蛛 (He, et al., 1991:121)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Araneus tartarica (Kroneberg) 韃靼圓蛛 (Feng, 1990:60; Hu, 1984:100)

Araneus tartarica (Kroneberg, 1875:)

棲 息：高山林木間，結大型圓網。

捕 食 性。

分 佈：廣東、湖南、新疆。

Araneus transversivittigera Strand 橫形圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus transversivittigera Strand, 1907:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：上海。

Araneus triguttatus (Fabricius) 彎指圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus triguttatus (Fabricius, 1775:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅(蘭州)。

Araneus undatus 北方圓蛛 (Wu et Chen, 1980(4):47)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：上海。

Araneus uyemurai Yaginuma 白紋大腹圓蛛 (He, et al., 1991:121)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川、安徽、湖北。

Araneus variegata Yaginuma 雜黑斑圓蛛 (He, et al., 1991:121; Hu, 1984:98)

Araneus variegata Yaginuma, 1960:

棲 息：旱田作物或果樹叢的枝葉間張網。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、四川、河南、陝西、山東、遼寧、吉林。

Araneus ventricosus (L. Koch) 大腹圓蛛 (ASZI, 1987, 2:854; Chai et al., 1991:91; Dong, 1988:85; Feng, 1990:59; He, et al., 1991:121; Hu, 1984: 97; lLi et al., 1983:112; Song, 1987:166; Song et al., 1997:1710; Sun et al., 1984:111; Wang et al., 1994, 16(1):40-42; Xie, 1990:137-138; Xie et al., 1999, 21(2):86; Zhang, 1983:30; Zhang et Li, 1982:228; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao, 1984:2)

Araneus ventricosus (L. Koch, 1878:)

棲 息：稻田、菜地、花生田：屋檐下、廄舍及倉庫周圍，庭院的籬笆上張網，也可在山林的樹枝，或兩株樹間張中型垂直車輪圓網；在農作物中，見于張網于不同的玉米雄花序間，或高粱穗之間，亦在蔓性作物的支架上張網。

捕 食：葉蟬

Coleophora laricella Hübner 落葉松鞘蛾

螟蟲

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾

菜青蟲

瓜野螟(幼蟲)

豆野螟(幼蟲)

Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻

蚊、蠅、蛾、蝶及金龜子、蜻蜓、蜉蝣、象鼻蟲、天牛等大型甲蟲。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；日本、中亞各國。

Araneus victoria (Thorell) 優勝圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus victoria (Thorell, 1870:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河北、青海、新疆。

Araneus victoria orientalis Kulczynski 東方勝利圓蛛 (Hu, 1984:100; Zhao, 1984:2)

Araneus victoria orientalis Kulczynski, 1901:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河南、北京、吉林。

Araneus viperifer Schenkel 蛇曲圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus viperifer Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：浙江、甘肅(蘭州)。

Araneus virga Fox 細圓蛛 (Hu, 1984:100)

Araneus virga Fox, 1938:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Araneus sp. 圓蛛 (Liu et Zhang, 1993, 15(2):89)

Araneus sp. Liu et Zhang, 1993:89.

棲 息：

捕 食：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲、成蟲)。

分 佈：大興安嶺北部。

Argiope aequior Chamberlin 晶目金蛛 (Hu, 1984:106)

Argiope aequior Chamberlin, 1924:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：江蘇(蘇州)。

Argiope aemula (Walckenaer) 好勝金蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:575; Feng, 1990:62; He, et al., 1991:121; Hu, 1984:101; Sun et al., 1980(4):23; Tang et Zhou, 1983:207-214)

Epeira aemula Walckenaer, 1841:118.

=*Epeira striata* Doleschall, 1857:415.

Argiope aemula Thorell, 1877:164.

=*Argiope trivittata* Karsch, 1891:280.

=*Metargiope ornatus* var. *lineatus* Marapao, 1965:46.

棲 息：稻田、山麓原野，網爲垂直圓網。

捕 食：稻蝗(若蟲)

稻飛蝨

稻葉蟬。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、香港、廣西、雲南、河南；菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Argiope aetherea (Walckenaer) 高居金蛛 (He, et al., 1991:121; Hu, 1984:102)

Argiope aetherea (Walckenaer, 1841:)

Coganargiope aetherea (Walckenaer)

棲 息：向陽的灌木叢中張網、也見于農田。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、四川、浙江。

Argiope amoena L. Koch 悅目金蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(4):165; Feng, 1990:64; He, et al., 1991:121; Hu, 1984:102)

Argiope amoena L. Koch, 1878:

Coganargiope amoena (Kock)

棲 息：稻田、菜地、果園，茶園，張車輪圓網于向陽灌木叢中，中央有“x”形鋸齒狀白色絲帶。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻葉蟬

蛾類

雙翅目。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、

河南、陝西。

Argiope boesenbergi Levi 高居金蛛 (Feng, 1990:63)

Argiope boesenbergi Levi, 1983:

棲 息：農田向陽灌木叢中張車輪圓網，位置較低。網上 4 條白色波狀帶，成 "X" 形。

捕 食 性。

分 佈：湖南、浙江。

Argiope bruennichii Scopoli 橫紋金蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:65; Feng et al., 1994, 10(3):142; He, et al., 1991:121; Hu, 1984:103; Wang et al., 1994, 16(1):40-42; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:2)

Argiope bruennichii Scopoli, 1772:

棲 息：稻田、菜園、茶園、草叢或附近田邊或灌木叢張垂直圓網，網中心有一條上下相對的鋸齒狀白色絲帶。

捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗

Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻葉蟬

稻飛蝨

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟

Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

蝶類

雙翅目。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江。

Argiope catenulata (Doleschall) 鏈斑金蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:570; Feng, 1990:66; He, et al., 1991:121; Hu, 1984:103)

Epeira catenulata Doleschall, 1859:30.

=*Argiope opulenta* Thorell, 1859:299.

=*Epeira stellata* Stoliczka, 1869:234.

=*Argiope pelewensis* Keyserling, 1886:136.

Argiope catenulata Roewer, 1942:741.

=*Metargiope ornatus* var. *turricula* Marapao, 1965:47.

棲 息：稻田，張圓網。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南；南亞、東南亞。

Argiope dividi Schenkel 大衛氏金蛛 (Hu, 1984:106)

Argiope dividi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：江西。

Argiope lobata (Pallas) 葉金蛛 (Hu, 1984:104)

Argiope lobata (Pallas, 1772:)

棲 息：山地林間、灌木叢、苗圃的小樹叢或雜草間張完全圓網。

捕 食 性。

分 佈：寧夏、新疆。

Argiope manicata Thorell 狂金蛛 (Hu, 1984:106)

Argiope manicata Thorell, 1859:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：香港。

Argiope minuta Karsch 小金蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(4):166; Feng, 1990:67; He, et al., 1991:121; Hu, 1984:105)

Argiope minuta Karsch, 1879:

Coganarigope minuta (Karsch)

別 名：*小悅目金蛛*。

棲 息：茶園，張網于向陽灌木叢中，圓網中央有鋸齒狀的"x"形白色絲帶。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

蛾類

雙翅目。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、陝西、山東。

Argiope ocula Fox 目金蛛 (Feng, 1990:68; Hu, 1984:106)

Argiope ocula Fox, 1938:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、四川。

Argiope perforata Schenkel 孔目金蛛 (Hu, 1984:106)

Argiope perforata Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Argiope trifasciata (Forakel) 三帶金蛛 (Feng, 1990:69)

Argiope trifasciata (Forakel, 1775:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Cyclosa argenteoalba Boesenberg et Strant 銀背艾蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:70; He, et al., 1991:121;

Hu, 1984:106; Song, 1987:168; Song et al., 1997:1711)
Cyclosa argenteoalba Boesenberg et Strant, 1906:
棲 息：張圓網，水稻田、玉米、棉田、甘蔗、荔枝、龍眼、梨、蘋果、茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東；朝鮮、日本。

Cyclosa atrata Boesenberg et Strant 黑尾艾蛛 (Feng, 1990:71; He, et al., 1991:122; Hu, 1984:106)
Cyclosa atrata Boesenberg et Strant, 1906:
棲 息：茶園、山區灌木叢或溪邊等處小型圓網，有時亦見于稻田。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、河南。

Cyclosa bianchoria Yi et al. 雙錨艾蛛 (Song et al., 1997:1712)
Cyclosa bianchoria Yi et al., 1990:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、湖北。

Cyclosa bicauda Saito 二突艾蛛 (Hu, 1984:111)
Cyclosa bicauda Saito, 1933:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cyclosa conica (Pallas) 突尾艾蛛 (Hu, 1984:109)
Cyclosa conica (Pallas, 1772:)
棲 息：張結圓網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cyclosa ginnaga Yaginuma 長腹艾蛛 (Hu, 1984:107)
Cyclosa ginnaga Yaginuma, 1959:
棲 息：山區灌木叢或田間。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、河南、山東。

Cyclosa insulana (Costra) 島艾蛛 (He, et al., 1991:122; Hu, 1984:107)
Cyclosa insulana (Costra, 1834:)
棲 息：山地樹幹、亦見于稻田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、四川、浙江。

Cyclosa japonica Boesenberg et Strant 日本艾蛛 (Feng, 1990:72; He, et al., 1991:122)

Cyclosa japonica Boesenberg et Strant, 1906:

棲 息：茶園、稻田、地邊雜草張垂直圓網。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽。

Cyclosa kiangisca Schenkel 江西艾蛛 (He, et al., 1991:122; Hu, 1984:107)

Cyclosa kiangisca Schenkel, 1963:

棲 息：稻田或旱田的作物間。

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、山東。

Cyclosa laticauda Boesenberg et Strant 六突艾蛛 (Feng, 1990:73; He, et al., 1991:122; Hu, 1984: 108)

Cyclosa laticauda Boesenberg et Strant, 1906:

別 名：*乳狀艾蛛，六角艾蛛*。

棲 息：山地灌木叢和雜草中張垂直圓網，江南稻田亦可見。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、貴州、浙江、安徽、甘肅、新疆。

Cyclosa monticola 三突艾蛛 (Tang et al., 1995, 17(4):168)

棲 息：

捕 食：*Oracella acuta* (Lobdell) 濕地松粉蚧。

分 佈：廣東。

Cyclosa mulmeinensis (Thorell) (Barrion et Litsinger, 1995:593)

Epeira mulmeinensis Thorell, 1887:221.

Cyclosa mulmeinensis, Simon, 1908:104.

=*Argyrodes longispinus* Saito, 1933:45.

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：廣佈自東亞(臺灣、日本)至非洲、菲律賓。

Cyclosa octotuberculata Karsch 八突艾蛛 (He, et al., 1991:122; Hu, 1984:109; Song et al., 1997:1713)

Cyclosa octotuberculata Karsch, 1879:

別 名：*八瘤艾蛛，八角艾蛛*。

棲 息：山林間或果樹叢張圓網，網中央有一條垂直的絲帶，稻區或旱田也可見。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、甘肅、遼寧、吉林；朝鮮、日本。

Cyclosa oculata (Walckenaer) 目艾蛛 (Hu, 1984:111)

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802:)

棲 息：

捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Cyclosa pseudoculata 擬島艾蛛 (Hu, 1984:111)
Cyclosa pseudoculata
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Cyclosa sedeculata Karsch 四突艾蛛 (Feng, 1990:75; He, et al., 1991:122; Hu, 1984:110)
Cyclosa sedeculata Karsch, 1879:
棲 息：稻田，山地灌木叢間張圓形網。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西。

Cyclosa spinosa Saito 棘艾蛛 (Hu, 1984:111)
Cuclosa spinosa Saito, 1933:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cyclosa tricauda Saito 三尾艾蛛 (Hu, 1984:111)
Cyclosa tricauda Saito, 1933:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cyclosa vallata Keyserling 圓腹艾蛛 (Hu, 1984:111)
Cyclosa vallata Keyserling, 1886:
棲 息：結圓網于樹木枝葉間。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cyclosa sp. 艾蛛 (Sun et al., 1984:111)
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Cyrtarachne bufo (Boesenberg et Strant) 烏曲腹蛛 (Feng, 1990:76; He, et al., 1991:122)
Cyrtarachne bufo (Boesenberg et Strant, 1906:)
別 名：*蟾蜍曲腹蛛*。
棲 息：山麓樹叢張圓形網。
捕 食 性。

分 佈：湖南、雲南、貴州、四川。

Cyrtarachne inaequalis Thorell 對稱曲腹蛛 (Feng, 1990:77; He, et al., 1991:122; Hu, 1984:113)

Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895:
棲 息：山地樹叢間，稻田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇、河南。

Cyrtarachne nagasakiensis Strand 長崎曲腹蛛 (Feng, 1990:79; He, et al., 1991:122)

Cyrtarachne nagasakiensis Strand, 1916:
別 名：*白帶曲腹蛛*。
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川、安徽。

Cyrtarachne szetschuanensis Schenkel 四川曲腹蛛 (Hu, 1984:114)

Cyrtarachne szetschuanensis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Cyrtarachne yunoharuensis Strand 湯春曲腹蛛 (Feng, 1990:78)

Cyrtarachne yunoharuensis Strand, 1916:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南。

Crytophora cicatrosus (Stoliczka) 後帶雲斑蛛 (Feng, 1990:81)

Crytophora cicatrosus (Stoliczka, 1869:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：

Crytophora citricola (Foskal) 橘雲斑蛛 (He, et al., 1991:122)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東、雲南。

Cyrtophora exanthematica (Doleschall) (Barrion et Litsinger, 1995:585; Hu, 1984:112)

Epeira exanthematica Doleschall, 1859:38.
Cyrtophora exanthematica Barrion et Litsinger, 1995:585.
=*Cyclosa bifurcata* Kishida
棲 息：稻田、山地林間或果園。

捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本、菲律賓、新加坡、緬甸、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲北部。

Cyrtophora moluccensis (Doleschall) 皿雲斑蛛 (Feng, 1990:82; Hu, 1984:112)
Cyrtophora moluccensis (Doleschall, 1857:)
=*Suzumia orientalis* Kishida
別 名：*摩鹿加雲斑蛛*。
棲 息：山區果園張大型圓網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江。

Cyrtophora unicolor (Doleschall) (Barrion et Litsinger, 1995:587)
Epeira unicolor Doleschall, 1859:419.
棲 息：稻田
捕 食 性。
分 佈：日本、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲北部。

Gasteracantha diadesmia Thorell 菱棘腹蛛 (Hu, 1984:114)
Gasteracantha diadesmia Thorell, 1887:
棲 息：香蕉園。
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Gasteracantha kuhlu L. Koch 庫氏棘腹蛛 (Feng, 1990:83; He, et al., 1991:122; Hu, 1984:114)
Gasteracantha kuhlu L. Koch, 1833:
=*Gasteracantha leucomelaena* Thorell
=*Gasteracantha leucomelas* Doleschall
棲 息：荔枝、龍眼、柑橘、棉田及灌木叢中張垂直車輪小型圓網。
捕 食：竹斑蛾。
分 佈：臺灣、香港、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇、河南、陝西、山東、北京、遼寧。

Gasteracantha mammosa C. L. Koch 多型棘腹蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:554; Feng, 1990:84; He, et al., 1991:122; Hu, 1984:114)
Gasteracantha mammosa C. L. Koch, 1845:57.
=*Plectana brevispina* Doleschall, 1857:423.
=*Gasteracantha mammeata* Thorell, 1859:302.
=*Gasteracantha canningensis* Stoliczka, 1869:248.
=*Gasteracantha mastoidea* L. Koch, 1871:201.
=*Gasteracantha flavida* Hasselt, 1882:15.
=*Gasteracantha mediofusca* Merian, 1911:237.
棲 息：稻田，柚樹果林及山地樹間。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南、貴州、四川；日本、菲律賓、緬甸、印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Gasteracantha kuhlii C. L. Koch (Barrion et Litsinger, 1995:559)

Gasteracantha kuhlii C. L. Koch, 1838:20.
=*Plectana acuminata* Walckenaer, 1841:159.
=*Gasteracantha annulipes* C. L. Koch, 1845:52.
=*Plectana leucamelas* Doleschall, 1859:42.
=*Gasteracantha annamita* Simon, 1886:148.
=*Gasteracantha leucomelaena* Thorell, 1887:231.
=*Gasteracantha leucomelas* Simon, 1904.
Gasteracantha kuhlii Dahl, 1914:262.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：香港；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、Bhutan.

Gasteracantha mammosa Koch 乳頭棘腹蛛 (Hu, 1984:114)

Gasteracantha mammosa Koch, 1845:
=*Gasteracantha brevispina* Doleschall
=*Gasteracantha formosana* Saito
=*Gasteracantha sparsa* Saito
=*Gasteracantha sola* Saito
棲 息：山地平原，于樹間張圓網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、雲南。

Gasteracantha sauteri Dahl 曹氏棘腹蛛 (Chen et al., 1993:137; Feng, 1990:85; Hu, 1984:115)

Gasteracantha sauteri Dahl, 1914:
Pachypleuracantha sauteri Dahl
棲 息：多居山地林間，張圓網于樹幹上；習性與乳頭棘腹蛛相似。
捕 食：稟害蟲。
分 佈：臺灣、廣東。

Herennia ornatissima (Doleschall) 裂腹蛛 (Feng, 1990:86; Hu, 1984:116)

Herennia ornatissima (Doleschall, 1859:)
棲 息：山地林間灌木叢枝幹上。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南(景洪)。

Hyposinga alboria Yin et al. 華南高亮腹蛛 (Song et al., 1997:1713)

Hyposinga alboria Yin et al., 1990:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、四川。

Hyposinga pygmaea (Sundevall) 四點高亮蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:611; Feng, 1990:100; Wu-xing, 1979:26; Ye et Wang, 1987:11; Zhang et al., 1994, 16(1):11)

Theridion pygmaea Sudevall, 1831:121.

=*Micryphantes anthracinus* C. L. Koch, 1837:11.
=*Phrurolithus trifasciatus* C. L. Koch, 1839:116.
Hyposinga pygmaea, Ausserer, 1871:823.
棲 息：稻田、菜田、棉田常見種類。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
蚜蟲
茄黃斑螟
茄二十八星瓢蟲
葉蟎。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西；全北區、泰國。

Hyposinga sanguinea (C. Koch) 血高亮腹蛛 (Feng, 1990:99; He, et al., 1991:122; Qu et al., 1985, 2(2):149-150; Song, 1987:169; Zhao, 1984:2)
Hyposinga sanguinea (C. Koch, 1845:)
棲 息：山區旱田作物間張小型網。
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江、河南、陝西、山東、河北、甘肅、新疆。

Larinia argiopiformis Boesenberg et Strant 黃金肥蛛 (Chai et al., 1991:91; Dai, 1999, 21(40:166; Feng, 1990:87; He, et al., 1991:122; Hu, 1984:117; Wang et al., 1989:121; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:2)
Larinia argiopiformis Boesenberg et Strant, 1906:
Larinia punctifera Boesenberg et Strant, 1906:
棲 息：菜園、在山區水田及棉田、果樹、茶園等旱田及荻和蘆葦田的作物間張車輪狀圓網，南方的茶園及北方果園中亦可見。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
蛾類
雙翅目(蠅類)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆、吉林。

Meta davidi Schenkel 大衛氏寄蛛 (Hu, 1984:119)
Meta davidi Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Meta kompirensis Boesenberg et Strand 褐色寄蛛 (Hu, 1984:118)
Meta kompirensis Boesenberg et Strant, 1906:
棲 息：山地或山地水濱張網。
捕 食 性。

分　佈：臺灣、湖南、四川。

Meta nebulosa Schenkel 暗窨蛛 (Hu, 1984:119)

Meta nebulosa Schenkel, 1936:

棲　息：

捕 食 性。

分　佈：陝西、甘肅。

Meta sinensis Schenkel 中華窨蛛 (Hu, 1984:119)

Meta sinensis Schenkel, 1953:

棲　息：

捕 食 性。

分　佈：甘肅。

Meta yunohamensis Boesenberg et Strant 眼鏡窨蛛 (Hu, 1984:118)

Meta yunohamensis Boesenberg et Strant, 1906:

棲　息：習性與褐色窨蛛相同。

捕 食 性。

分　佈：臺灣、陝西、山西、吉林。

Neoscona adianta (Walckenaer) 灌木新圓蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(4):166; Feng, 1990:88; He, et al., 1991:122; Hu, 1984:120; Song et al., 1997:1714; Wang et al., 1994, 16(1):40-42; Zhao, 1984:2)

Neoscona adiantum (Walckenaer, 1802:)

棲　息：稻田、玉米田、菜地、茶園、棉田和其他旱田，張結圓網。

捕　食：稻飛蝨

稻葉蟬

Empoasca vitis Göthe　假眼小綠葉蟬(茶)

螟蛾類

雙翅目。

分　佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、北京、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Neoscona doenitzi (Boesenberg et Strand) 黃褐新圓蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; Dong, 1987, 14(1):28, 64; Feng, 1990:89; He, et al., 1991:122; Hu, 1984:121; Li, 1981(1-2):84; Li et al., 1983:112; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Qu et al., 1985, 2(2):149-150; Shi et al., 1989-90: 88; Song, 1987:169; Wang, 1985:187; Wang et al., 1994, 16(1):40-42; Xiao et al., 1991:120; Xie et al., 1999, 21(2):86; Xu et al., 1984:29; Xu et al., 1987:140; Zhang, 1983:30; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao , 1984:2; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)

Meta doenitzi Boesenberg et Strant, 1906:180-181.

Neoscona doenitzi, 八木沼健夫, 1974:56.

棲　息：稻田、菜園、花生田、玉米、小麥、棉田、柑橘林、茶園、甘蔗田、桑園等旱田作物間，或山地灌木叢及其他植株上層張垂直車輪大圓網，為稻田、棉田的優勢種類。

捕　食：*Empoasca vitis* Göthe　假眼小綠葉蟬(茶)

稻葉蟬
稻飛蝨
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
棉盲蝽
棉葉蟬
棉鈴蟲
棉捲葉蟲
玉米螟
瓜野螟
豆野螟
菜青蟲
燈蛾
斜紋夜蛾
Cladius pectinicornis (Linnaeus) 玫瑰櫛角葉蜂
葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江。

Neoscona griseomaculata Yin et Wang 灰斑新圓蛛 (Feng, 1990:90; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:122; Song, 1987:171; Tang et Zhou, 1983:207-214; Wang, 1985:35; Yin et Wang, 1982: 260)

Neoscona griseomaculata Yin et Wang, 1982:260-262.
棲 息：稻田，稻叢間張圓形網，爲稻區優勢種類。
捕 食：大白翅葉蟬。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、貴州、四川、安徽、湖北、河南。

Neoscona mellotteei (Simon) 棕邊新圓蛛 (Feng, 1990:91; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:125; Song, 1987:172; Song et al., 1997:1715)

Neoscona mellotteei (Simon, 1895:)
別 名：*綠腹新圓蛛*，*梅氏新圓蛛*。
棲 息：山區灌木林、松樹林枝葉間張圓網，與擬青新圓蛛習性相似。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、河北、北京；日本。

Neoscona multiplicans (Chamberlin) 多褶新圓蛛 (Song et al., 1997:1715)

Arenea multiplicans Chamberlin, 1924:18-19.
=*Neoscona Scylla* Song, 1988:129. (*nec* Karsch, 1879)
=*Neoscana minorscylla* Yin et al., 1990:123-124.
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇。

Neoscona nautica (L. Koch) 嗜水新圓蛛 (Feng, 1990:92; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:122; Sun et al., 1984:111; Tang et Zhou, 1983:207-214; Wang et al., 1989:122; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:2)

Neoscona nautica (L. Koch, 1875:)

棲 息：稻田，菜園、荻和蘆葦田及房舍周圍張圓形網。

捕 食：黑尾葉蟬
小白翅葉蟬
大白翅葉蟬
稻縱捲葉螟(成蟲)
三化螟(成蟲)
稻螟蛉(成蟲、幼蟲)
稻田和荻及蘆葦害蟲。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東。

Neoscona polyspinipes Yin et al. 多刺新圓蛛 (Song et al., 1997:1716)

Neoscona polyspinipes Yin et al.,

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南、湖北。

Neoscona scylla (Karsch) 紅褐新圓蛛 (Feng, 1990:93; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:125; Song et al., 1997: 1717)

Neoscona scylla (Karsch, 1879:)

別 名：*青新圓蛛*。

棲 息：稻田及板栗林的枝葉間，棉田、茶園、果園,車輪圓網。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西；日本。

Neoscona scylloides (Boesenberg et Strant) 擬紅褐新圓蛛 (Feng, 1990:94; He, et al., 1991:123; Hu, 1984: 124)

Neoscona scylloides (Boesenberg et Strant, 1906:)

別 名：*擬青新圓蛛*。

棲 息：稻田、荔枝、檬果樹、柑橘、蘋、梨、山麓、森林邊緣、馬尾松的枝、葉間張圓網。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、四川、浙江、安徽、湖北、山東、北京。

Neoscona theisi (Walckenaer) 茶色新圓蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:625; Chai et al., 1991:91; Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:95; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:126; Shi et al., 1989-90:88; Sun et al., 1980(4):23; Tang et Zhou, 1983:207-214; Wang, 1985:35; Wang et al., 1989:122; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:2; Zong et al., 1984:249

Epeira theis Walckenaer, 1841:53.

=*Epeira mangareva* Walckenaer, 1847:469.

=*Epeira braminica* Stoliczka, 1869:238.

=*Epeira theisis* Thorell, 1877:390.
=*Epeira obscura* Rainbow, 1897:116.
Neoscona theisi F.O.P. Cambridge, 1904:470.
棲 息：稻田、菜田、茶園、麥田、荻和蘆葦田及其他旱田，山林間也有分佈，稻區數量較多，爲水稻害蟲有效天敵。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)
稻飛蝨
黑尾葉蟬
蚜蟲
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
稻蟲
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北；東洋區(菲律賓、越南、印尼、泰國、孟加拉等)

Neoscona sp. 新圓蛛 (Sun et al., 1980(4):23; Yang et al., 1990:108-112)
Neoscona sp. Sun et al., 1980-(4):23.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Neoscona sp. 新圓蛛 (Dai, 1999, 21(4):166)
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。
分 佈：貴州。

Nephila clavata L. Koch 棒紋新婦 (Dai, 1997, 19(1):42; Feng, 1990:96; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:119)
Nephila clavata L. Koch, 1878:
棲 息：果樹、山區林間或灌木叢中張複雜的三角網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、北京、遼寧。

Nephila imperialis Doleschall 大絡新婦 (Song, 1987:173)
Nephila imperialis Doleschall, 1857:
棲 息：人工闊葉混交林中。
捕 食 性。
分 佈：廣東(電白縣)。

Nephila maculata (Fabricius) 斑絡新婦 (Barrion et Litsinger, 1995:560; Feng, 1990:97; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:119; Song, 1987:174; Wu et al., 1989:177-178)
Aranea maculata Fabricius, 1793:425

=*Nephila pilipes* Fabricius, 1793:
Nephila maculata, Pocock, 1900:217.
棲 息：稻田，樹林中張圓形而複雜致密大型網，大者直徑可達 1 米以上。
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、海南、四川、新疆；日本、菲律賓、新加坡、緬甸、印度、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞、澳洲北部。

Paraplectana sakaguchii Uyemura 阪口綠斑蛛 (Feng, 1990:80)
Paraplectana sakaguchii Uyemura1938:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南。

Paraxiwia dehaani (Doleschall) (Barrion et Litsinger, 1995:582)
Epeira dehaani Doleschall, 1859:33.
=*Epeira kandarensis* Thorell, 1877:372.
=*Epeira submucronata* Simon, 1887:106.
Parasiwia dehaani Barrion et Litsinger, 1995:582.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：日本、菲律賓、印尼、緬甸、印度。

Poltys illepidus C. L. Koch (Barrion et Litsinger, 1995:579)
Poltys illepidus C. L. Koch, 1843:1-142.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：日本、菲律賓、西新幾內亞。

Pronoides brunneus Schenkel 紅褐尖背蛛 (Hu, 1984:126)
Pronoides brunneus Schenkel, 1936:
棲 息：張網于灌木叢的枝葉間或雜草叢中。
捕 食 性。
分 佈：陝西、甘肅。

Singa alpigena Yin et al. 山地亮腹蛛 (Song, 1987:175; Song et al., 1997:1717; Yin et al., 1983:374)
Singa alpigena Yin et al., 1983:374-376.
棲 息：山區小樹雜草間。
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、湖北。

Singa bifasciata Schenkel 二橫帶亮腹蛛 (Hu, 1984:132)
Singa bifasciata Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：四川。

Singa hamata Clerck 黑斑亮腹蛛 (ASZI, 1987, 2:856; Dong, 1988:85; Feng, 1990:98; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:129; Li, 1981(1-2):84; Li et al., 1983:112; Qu et al., 1985, 2(2):149-150; Song, 1987:176; Wang et al., 1994, 16(1):40-42; Wu et al., 9991:28; Wu et al., 1991:102; Zhao, 1984:2)

Singa hamata Clerck, 1757:

別 名：*黑亮腹蛛*，*黑斑亮蛛*。

棲 息：稻田、麥田、花生田、棉田、大豆等農田及果園。

捕 食：稻葉蟬

稻飛蝨。

分 佈：湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、歐洲。

Singa kansuensis Schenkel 甘肅亮腹蛛 (Hu, 1984:132)

Singa kansuensis Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Singa pygmaea Sundevall 四點亮腹蛛 (ASZI, 1987, 2:856; Dong, 1988:85; He, et al., 1991:123; Hu, 1984:130; Li et al., 1983:112; Lin et Qian, 1981(1-2):91; Sun et al., 1980(4):23; Wang, 1985:187; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:2; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)

Singa pygmaea (Sundevall, 1831:)

棲 息：稻田、菜園、花生田、棉田、麥田，張小型網。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、古北區。

Singa sanguinea C. Koch 血色亮腹蛛 (Dong, 1988:85; Hu, 1984:130; Li et al., 1983:112; Zhao, 1984:3)

Singa sanguinea C. Koch, 1845:

棲 息：花生田、多在山區或丘陵地帶的旱、水田之作物間或灌木叢張網。

捕 食 性。

分 佈：浙江、河南、陝西、山東、甘肅、新疆。

Singa sp. 湄潭亮腹蛛 (Hu, 1984:131)

Singa sp., Hu, 1984:131.

棲 息：麥田作物的莖稈間活動。

捕 食 性。

分 佈：貴州、陝西。

Yaginumia sia Archer 八氏蛛 (ASZI, 1987, 2:856; Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(4):166; Feng, 1990:101; He, et al., 1991:123)

別 名：*葉斑圓蛛，葉斑八氏蛛，葉斑誼蛛，葉斑亞蛛*。

棲 息：灌木、茶園、棉田、稻田、家屋周圍張小型圓網。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、新疆；日本。

Zilla astridae (Strand) 阿斯扇蛛 (Hu, 1984:128)

Zilla astridae (Strand, 1917:)

Araneus saganus Boesenberg et Strant

棲 息：山地樹木間。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Zilla sachalinensis (Saito) 薩哈林扇蛛 (Hu, 1984:128; Song et al., 1997:1718; Wang et al., 1994, 16(1):40-42)

Zilla sachalinensis (Saito, 1934:)

棲 息：落葉松人工林。

捕 食 性。

分 佈：湖南、湖北陝西、吉林、黑龍江；日本。

Zygiella x-notata (Clerck) 麗楚蛛 (Feng, 1990:102)

Zygiella x-notata (Clerck, 1757:)

棲 息：桂花樹。

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Tetragnathidae 肖蛸科

Dyschiriognatha dentata Zhu et Wen 櫛齒鋸螯蛛 (He, et al., 1991:124; Hu, 1984:135; Sun et al., 1984:111)

Dyschiriognatha dentata Zhu et Wen, 1978:

棲 息：稻株下部，無水時活動于地面。

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、廣西、貴州、四川、陝西。

Dyschiriognatha quadrimaculata Boesenberg et Strand 四斑鋸螯蛛 (ASZI, 1987, 2:859; Feng, 1990:103; He, et al., 1991:124; Hu, 1984:135; Li et al., 1983:112; Song, 1987:179; Sun et al., 1980(4):23; Wu-xing, 1979:25; Xu et al., 1987:140; Ye et Wang, 1987:11; Zhang, 1983:30; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao, 1984:3; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)

Dyschiriognatha quadrimaculata Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：水邊、稻株下層，菜園、花生田、麥田、旱田、棉田張圓網。

捕 食：稻蝨

葉蟬

蚜蟲
螟蛾
瓜野螟(幼蟲)
菜青蟲
葉蟎。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、天津、吉林；日本。

Dyschiriognatha tenera Karsch 柔弱鋸螯蛛 (He, et al., 1991:124; Hu, 1984:135; Song, 1987:180; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao, 1984:3)
Dyschiriognatha tenera Karsch, 1879:
棲 息：菜園、與四斑鋸螯蛛相似、棉田。
捕 食：葉蟬
蚜蟲
菜螟(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、內蒙古、吉林。

Leucauge blanda (L. Koch) 肩斑銀鱗蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:104; He, et al., 1991:124; Hu, 1984:136)
Leucauge blanda (L. Koch), 1877:
棲 息：稻株、玉米、小麥等旱田作物間；亦見于荔枝、杏、梨、蘋果、柑橘、茶樹上或野山地的灌木叢上張空心圓網。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe　假眼小綠葉蟬(茶)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、河南、陝西、山東；朝鮮、日本。

Leucauge celebesiana (Walckenaer) 西里銀鱗蛛 (Song et al., 1997:1708)
Leucauge celebesiana (Walckenaer, 1841:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西、四川、浙江、湖北；日本、印度、印尼。

Leucauge decorata (Blackwall) 艷銀鱗蛛 (Hu, 1984:138)
Leucauge decorata (Blackwall, 1846:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：香港、廣東、雲南。

Leucauge magnifica Yaginuma 縱條銀鱗蛛 (Feng, 1990:105; Hu, 1984:138; Song, 1987:181; Zhao, 1984:3)
Leucauge magnifica Yaginuma, 1954:
棲 息：棉田、灌木叢中、溪邊蔭濕環境、圓網，習性與肩斑銀鱗蛛相似。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、河南、山東、

吉林。

Leucauge papuana 巴布亞銀鱗蛛 (Hu, 1984:139)

Leucauge papuana

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Leucauge retracta Chamberlin 伸縮銀鱗蛛 (Hu, 1984:139)

Leucauge retracta Chamberlin, 1924:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：江蘇。

Leucauge subblanda 白銀鱗蛛 (Hu, 1984:139; Zhao, 1984:3)

Leucauge subblanda

棲 息：棉田。

捕 食 性。

分 佈：湖北(漢陽)。

Leucauge subgemmea Boesenberg et Strand 蕾銀鱗蛛 (Song et al., 1997:1709)

Leucauge subgemmea Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北；日本。

Leucauge szechuensis Schenkel 四川銀鱗蛛 (Hu, 1984:139)

Leucauge szechuensis Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Leucauge venusta (Walckenaer) 脈銀鱗蛛 (Hu, 1984:138)

Leucauge venusta (Walckenaer, 1841:)

=*Leucauge hortorum* N. Banks

棲 息：與縱條銀鱗蛛相似。

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Pachygnatha clercki Sundeyall 粗螯蛛 (He, et al., 1991:124; Hu, 1984:139))

Pachygnatha clercki Sundeyall, 1823:

棲 息：張網于稻田、草間植物之莖葉間。

捕 食 性。

分 佈：江蘇、北京、吉林。

Tetragnatha aenea Cantor 金綠肖蛸 (Hu, 1984:152)

Tetragnatha aenea Cantor, 1842:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：浙江(舟山)。

Tetragnatha caudicula (Karsch) 尖尾肖蛸 (He, et al., 1991:124; Hu, 1984:140; Wu-xing, 1979:25)

Tetragnatha caudicula (Karsch, 1879:)

棲 息：大豆田、稻區和其他旱田。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、陝西、山東、吉林。

Tetragnatha cliens (Chamberlin) 侶伴肖蛸 (Hu, 1984:141; Sun et al., 1980(4):23; Wang et al., 1989:123; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:3; Zong et al., 1984:249)

Tetragnatha cliens (Chamberlin, 1924:)

棲 息：稻叢或旱田作物間張網，菜園、荻和蘆葦田。

捕 食：葉蟬

飛蝨

多種鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、湖北、山東。

Tetragnatha coreana Paik 朝鮮肖蛸 (He, et al., 1991:124)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河南。

Tetragnatha extensa (Linnaeus) 直伸肖蛸 (ASZI, 1987, 2:858; He, et al., 1991:124; Hu, 1984:142; Song, 1987:182; Sun et al., 1980(4):23; Zong et al., 1984:249)

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758:)

棲 息：稻叢上半部張網、麥田；北方旱田亦有分布。

捕 食：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(成蟲、幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、天津、寧夏、甘肅、新疆、遼寧、吉林；亞洲、歐洲。

Tetragnatha filipes Schenkel 線形肖蛸 (He, et al., 1991:124; Hu, 1984:153)

Tetragnatha filipes Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南、四川、甘肅。

Tetragnatha graciliventris Schenkel 微弱肖蛸 (Hu, 1984:153)

Tetragnatha graciliventris Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Tetragnatha hotingchiehi Schenkel 郝氏肖蛸 (Hu, 1984:153)

Tetragnatha hotingchiehi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Tetragnatha japonica Boesenberg et Strand 日本肖蛸 (ASZI, 1987, 2:857; Dong, 1994, 16(3):134-135; Hu, 1984:143; Li et al., 1983:112; Sun et al., 1980(4):23; Wang, 1985:35; Wang, 1985:187; Wu-xing, 1979:25; Xu et al., 1987:140; Ye et Wang, 1987:11; Yin, 1991:179; Zhang, 1983:30; Zhang et He, 1981, 8(2):102; Zhao, 1984:3; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)

Tetragnatha japonica Boesenberg et Strand, 1906:

別 名：*稻田肖蛸，錐腹肖蛸*。

棲 息：稻田、麥田、花生田、棉田、玉米、大豆等旱田、菜田或其他經濟作物地塊；荻和蘆葦田。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、新疆、遼寧、吉林；日本。

Tetragnatha javana (Thorell) 爪哇肖蛸 (He, et al., 1991:124; Hu, 1984:145; Sun et al., 1980(4):23; Wang, 1985:35; Zu et al., 1984:29; Zhao, 1984:3)

Tetragnatha javana (Thorell, 1890:)

棲 息：稻田、棉田、玉米田。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬

螟蛾(成蟲、幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、新疆。

Tetragnatha mandibulata Walckenaer 長螯肖蛸 (He, et al., 1991:124; Hu, 1984:146; Sun et al., 1980(4):23;)

棲 息：稻田。

捕 食：稻飛虱

稻葉蟬。

分 佈：臺灣、福建、湖南、香港、廣東及其沿海島嶼、廣西、雲南、貴州、四川、安徽、河南。

Tetragnatha maxillosa Thorell 錐腹肖蛸 (Barrion et Litsinger, 1995:509; Chen et al., 1990:134; Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:106; He, et al., 1991:125; Song, 1987:184; Song et al., 1997:1710; Xie et al., 1999, 21(2):86; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhou et Xiang, 1987:17-20)

Tetragnatha maxillosa Thorell, 1895:139.
=*Tetragmatha mandibulata* Thorell, 1899:221.
=*Tetragnatha japonica* Boesenberg et Strand, 1906:177.
=*Tetragnatha listeri* Gravely. 1921:443.
=*Tetragnatha conformans* Chamberlin, 1924:9-10.
=*Tetragnatha propioides* Schenkel, 1936:89.
別 名：*倡伴肖蛸*。
棲 息：茶園、菜園、稻田、茭白田、慈菇田植株上部利用兩邊葉片結車輪水平網。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)
葉蟬
蚜蟲
斜紋夜蛾(小幼蟲)
蛾類。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、新疆、遼寧；朝鮮、日本、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、印尼、泰國、印度、孟加拉、斯里蘭卡、Myanmar.

Tetragnatha nigrita Lendle 黑色肖蛸 (He, et al., 1991:125; Hu, 1984:153)
Tetragnatha nigrita Lendle, 1886:
棲 息：稻田。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東。

Tetragnatha nitens (Audonin) 華麗肖蛸 (ASZI, 1987, 2:858; Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(4):166; Feng, 1990:107; He, et al., 1991:125; Hu, 1984: 146; Song, 1987:185; Sun et al., 1980(4):23; Tang et Zhou, 1983:107-214; Wang, 1985:35)
Tetragnatha nitens (Audonin, 1827:)
=*Tetragnatha hotingchiehi* Schenkel, 1963:127-128.
Tetragnotha nitens, Song et al., 1976:39.
棲 息：稻田、玉米、小麥、棉田、茶園等旱田，張水平圓網。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)
稻蝨
葉蟬
稻縱捲葉螟(幼蟲)
三化螟(成蟲)
稻螟蛉(成蟲)。
與 *T. praelooooomia* 相似
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、新疆；日本、泰國、地中海、非洲、大洋洲。

Tetragnatha pinicola L. Koch 羽斑肖蛸 (He, et al., 1991:125, Hu, 1984:147; Zhang, 1998, 14(2):47)
Tetragnatha pinicola L. Koch

棲 息：大豆田、旱田。
捕 食 性。
分 佈：西藏、陝西、北京、甘肅、吉林。

Tetragnatha plena Chamberlin 豐盛肖蛸 (He, et al., 1991:125; Hu, 1984:153; Sun et al., 1984:111)
Tetragnatha plena Chamberlin, 1924:
棲 息：稻田。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、廣東、四川、安徽。

Tetragnatha praedonia L. Koch 前齒肖蛸 (Chai et al., 1991:91; Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:109; Chen, 1992:69; Chen et al., 1990:134; He, et al., 1991:125; Hu, 1984:148; Shi et al., 1989-90:88; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:3; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)
Tetragnatha praedonia L. Koch, 1878:
=*Tetragnatha sociella* Chamberlin
別 名：*叉刺肖蛸*。
棲 息：稻田、麥田、菜園、茶園、龍眼、荔枝、柑橘園、棉田、旱田、林間灌木叢張水平圓網。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
蚜蟲
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
小造橋蟲
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、北京、寧夏、新疆、遼寧、吉林。

Tetragnatha propioides Schenkel 蹼肖蛸 (Hu, 1984:153)
Tetragnatha propioides Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Tetragnatha recurva Schenkel 反曲肖蛸 (Hu, 1984:153)
Tetragnatha recurva Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅。

Tetragnatha shanghaiensis Strand 上海肖蛸 (Hu, 1984:153)

Tetragnatha shanghaiensis Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：上海。

Tetragnatha shikokiana Yaginuma 四國肖蛸 (ASZI, 1987, 2:857; Hu, 1984:149; Hunan, Teachers College et Xiang-yang, 1980(1):24; Lin et Qian, 1981(1-2):92; Shi et al., 1989-90:88; Sun et al., 1984:111; Wang, 1985:35; Wu-xing, 1979:25; Xu et al., 1987:140; Zhao, 1984:3; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249)
Tetragnatha shikokiana Yaginuma, 1960:
別 名：*圓尾肖蛸，卵腹肖蛸*。
棲 息：稻株上層結網、棉花、麥田、玉米間作地塊、橘園及其他旱田和荻、蘆葦田。
捕 食：水稻害蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、寧夏、新疆、吉林；日本。

Tetragnatha sociella Chamberlin 叉刺肖蛸 (Hu, 1984:153)
Tetragnatha sociella Chamberlin, 1924:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：上海。

Tetragnatha squamata Karsch 鱗紋肖蛸 (ASZI, 1987, 2:859; Chai et al., 1991:91; Chen et al., 1990:134; Dong, 1988:85; Feng, 1990:108; He, et al., 1991:125; Hu, 1984:150; Li et al., 1983:112; Shi et al., 1989-90:88; Song, 1987:186; Wu-xing, 1979:25; Yan et Wang, 1987:16; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao, 1984:4; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)
Tetragnatha squamata Karsch, 1879:
棲 息：菜園、稻田、水濱草叢或竹林、橘園、花生田、玉米、小麥、棉田、甘蔗、茶樹、桑樹、梨樹及其他旱田。
捕 食：葉蟬
蚜蟲
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(成蟲、幼蟲)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、新疆；日本。

Tetragnatha steichi Strand 司氏肖蛸 (Hu, 1984:153)
Tetragnatha steichi Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：上海。

Tetragnatha vermiformis Emerton 卵腹肖蛸 (Barrion et Litsinger, 1995:503; Chen et Zhao, 1989:122-129; Feng, 1990:110; He, et al., 1991:125; Song, 1987:187; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zong et al., 1986:119)
Tetragnatha vermiformis Emerton, 1884:333.
=*Tetragnatha mackenzie* Gravely, 1921:438.

=*Tetragnatha shikokiana* Yaginuma, 1960:74.
別 名：*圓尾肖蛸*。
棲 息：菜園、稻田、玉米、棉田，尤以靠近稻田的棉田數量較多。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
蚜蟲
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
小造橋蟲
棉鈴蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、青海、新疆、吉林；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、孟加拉、斯里蘭卡、美國。

Tetragnatha vermiventris Schenkel 食蟲肖蛸 (Hu, 1984:153)
Tetragnatha vermiventris Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Tetragnatha sp. 肖蛸 (Shi et al., 1989-90:88; Wu et Chen, 1980(4):47)
棲 息：橘園。
捕 食 性。
分 佈：上海。

Tetragnatha sp. 肖蛸 (Yang et al., 1990:109)
Tetragnatha sp. Yang et al., 1990:109.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Tetragnatha sp. 肖蛸 (Chen et Chiu, 1983:288)
Tetragnatha sp., Chen et Chiu, 1983:288.
棲 息：稻田。
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟。
分 佈：臺灣。

Tetragnatha sp. 肖蛸 (Dai, 1999, 21(4):166)
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。
分 佈：貴州。

Tetragnatha spp. 肖蛸 (Zhang et al., 1997, 13(2):65-68)

棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Tylorida striata (Thorell) 條紋高腹蛛 (Feng, 1990:111; Hu, 1984:153; Song, 1987:188)

Tylorida striata (Thorell, 1877:)
別 名：*條紋隆背蛸*。
棲 息：多居山地，稻區有分佈；在植株間張水平圓網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、貴州、浙江。

Metidae 眉蛛科

Leucauge becorata 艷白條蛛 (Sun et al., 1980(4):23)

棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Leucauge celebesiana (Walckenaer) (Barrion et Litsinger, 1995:545)

Tetragnatha celebesiana Walckenaer, 1841:222.
=*Epeira nigrotrivittata* Doleschall, 1859:39.
=*Argyroepeira ventralis* Pocock, 1900:216.
Leucauge celebesiana Pocock, 1904:800.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：中國；菲律賓、緬甸、印度、斯里蘭卡。

Leucauge decorata (Blackwall) 艷銀鱗蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:539; He, et al., 1991:124)

Tetragnatha decorata Blackwall, 1864:44.
=*Nephila angustata* Stoliczka, 1869:241.
=*Meta celebesiana* Thorell, 1877:442.
Leucauge decorata Simon, 1906:282.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、江蘇、安徽；南亞、東南亞。

Leucauge magnifica Yaginuma 縱條鱗蛛 (He, et al., 1991:124; Sun et al., 1984:111)

Leucauge magnifica Yaginuma
別 名：*縱條銀鱗蛛*。
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、河南、吉林。

Tylorida striata Thorell 條斑隆背蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:530; He, et al., 1991:125)

Tylorida striata Thorell, 1989:34.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。；日本、菲律賓、新加坡。

Theridiidae 球腹蛛科(球蛛科)

Achaearanea campanulata Chen 鍾希蛛 (Chen, 1993:36)

Achaearanea campanulata Chen, 1993:36-38.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Achaearanea extumida Xing et al. 隆首希蛛 (Xing et al., 1994:166)

Achaearanea extumida Xing et al., 1994:166.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：安徽。

Achaearanea japonicum Boesenberg et Strand 日本希蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; He, et al., 1991:126)

Theridion japonica Boesenberg et Strand
別 名：*日本球腹蛛*。
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、江蘇、陝西。

Achaearanea kompirense (Boesenberg et Strand) 二點希蛛 (He, et al., 1991:126; Song et al., 1997:1706)

Theridion kompirense Boesenberg et Strand, 1906:
別 名：*三點球腹蛛*，*金比羅希蛛*。
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、安徽、山東；日本。

Achaearanea liaoyuanensis Zhu et Yu 遼源希蛛 (Hu, 1984:156)

Achaearanea liaoyuanensis Zhu et Yu, 1982:
棲 息：植株下部或樹枝的葉腋間，張不規則網。
捕 食 性。
分 佈：遼源市。

Achaearanea tepidariorum (L. Koch) 溫室希蛛 (Feng, 1990:112; He, et al., 1991:126; Shu et Yu, 1985:93; Song,

1987: 119; Song et al., 1997:1706; Xie et al., 1999, 21(2):86; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao, 1984:2)
Theridion tepidariorum L. Koch, 1841:
別 名：*溫室球腹蛛*。
棲 息：稻、麥、棉田、茶園、荔枝、柑橘果園均有。在房屋牆角、洞穴中生活，爲世界性棲息在住宅區中的種類。
捕 食：葉蟬
蚜蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、甘肅、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；全球。

Achaearanea sp. 希蛛 (Shi et al., 1989-90:88)
棲 息：橘園。
捕 食 性。
分 佈：上海。

Anelosimus crassipes (Boesenberg et Strand) 粗腳蛛 (Hu, 1984:157)
Enoplognatha crassipes Boesenberg et Strand, 1906:
Anelosimus crassipes (Boesenberg et Strand)
棲 息：多居于闊葉林的枝端樹葉中。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Archearanea tepidariorum C. Koen 溫室希蛛 (Zhao, 1984:2)
Archearanea tepidariorum C. Koen, 1841
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、雲南、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西。

Argyrodes bonadea (Karsch) 白銀斑蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:461; Feng, 1990:114; He, et al., 1991:126; Li et al., 1983:112)
Conopistha bonadea Karsch, 1881:39.
Argyrodes bonadea, Barrion et Litsinger, 1995:461.
別 名：*銀錐腹蛛*。
棲 息：稻田，花生田、常見寄棲于絡新婦屬 *Nephila,* 金蛛屬 *Argiope,* 圓蛛屬 *Araneus* 的網上。
捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、河南、陝西；菲律賓、日本。

Argyrodes cylindrogaster (Simon) 蚓腹銀斑蛛 (Song et al., 1997:1707)
Argyrodes cylindrogaster (Simon, 1888:)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、海南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、河南；日本。

Argyrodes fissifrons Cambridge 裂額錐腹蛛 (Feng, 1990:115)
Argyrodes fissifrons Cambridge, 1869:
棲 息：稻田，多寄棲于金蛛屬 *Argiope* 的網上，亦見于漏斗蛛屬 *Agelena* 的網上。
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣西。

Argyrodes saganus (Doenitz et Strand) (Barrion et Litsinger, 1995:458)
Ariamnes saganus Doenitz et Strand, 1906:378.
Argyrodes saganus, Yaginuma, 1986:51.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：菲律賓、日本。

Ariamnes cylindrogaster Simon 圓腹蚓蛛 (He, et al., 1991:126; Hu, 1984:157; Li et Chen, 1983: 365)
Ariomnes cylindrogaster Simon, 1889:
別 名：*筒腹銀斑蛛*。
棲 息：多在針葉樹間張網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、安徽(黃山)；日本。

Ariamnes flagellum (Doleschall) 鞭狀蚓蛛 (Hu, 1984:158; Li et Chen, 1983:365)
Ariamnes flagellum (Doleschall, 1857)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江蘇(蘇州)。

Asagena phalerata (Panzer) 十字姬腹蛛 (Hu, 1984:158)
Asagena phalerata (Panzer, 1801:)
棲 息：大豆田的作物間張網。
捕 食 性。
分 佈：吉林。

Chrosiothes sudaobides Boesenberg et Strand 四突瘤腹蛛 (Dai, 1997, 19(1):43; 1999, 21(4):166)
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe　假眼小綠葉蟬(茶)
　　小蛾類
　　蚊類。
分 佈：貴州。

Chrosiothes subabides (Boesenberg et Strand) 四棘克羅蛛 (He, et al., 1991:126; Shi et al., 1989-90:88)

Theridion subabides Boesenberg et Strand, 1906:

別 名：*四突球腹蛛，四突角蛛*。

棲 息：水稻田、橘園等張不規則網。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東。

Chrysso argyrodiformis (Yaginuma) 尖尾球蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:419; He, et al., 1991: 126)

Ariamnus argyrodiformis Yaginuma, 1952:13-16.

Chrysso argyrodiformis, Barrion et Litsinger, 1995:419.

棲 息：

捕 食：*Cicadulina bipunctata* (Melichar)　Maize orange leafhopper 葉蟬

葉蟎。

分 佈：四川；日本、菲律賓。

Chrysso bidens Xing et al. 二齒麗蛛 (Xing et al., 1994:164)

Chrysso bidens Xing et al., 1994:164-165.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Chrysso punctifera (Yaginuma) 多點柚腹蛛 (Feng, 1990:117)

Chrysso punctifera (Yaginuma, 1960:)

棲 息：稻叢基部張不規則小網。

捕 食 性。

分 佈：湖南、浙江。

Chrysso venusta (Yaginuma) 多紋金腹蛛 (Dai, 1997, 19(1):43; 1999, 21(4):166; He, et al., 1991:126; Hu, 1984:158)

Argyroaster venusta Yaginuma, 1957:

Chrysso venusta (Yaginuma)

別 名：*銀斑球蛛，多紋柚腹蛛，愛麗蛛*。

棲 息：茶園、山區的灌木林中樹葉下面張不規則網。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe　假眼小綠葉蟬(茶)

小蛾類

蚊類。

分 佈：臺灣、湖南、貴州、浙江、安徽。

Coleosoma blandum Cambridge 滑鞘腹蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:427; Song, 1987:120)

Coleosoma blandum Cambridge, 1882:247.

棲 息：稻基。

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本、菲律賓、泰國。

Coleosoma octomaculatum (Boesenberg et Strand) 八斑鞘腹蛛 (Barrion et Litsinger, 1995: 427; Chen, 1992:69; Dai, 1992:41; Dai, 1999, 21(4):166; Dong, 1987:28; Feng, 1990:120; Ge et Chen, 1989:84-88; He, et al., 1991:126; Huang, 1990[ed.]:227-Li et al., 1983:112; Lin et Qian, 1981(1-2):91; Song, 1987:121; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:39; Tang et Zhou, 1983:207-214; Tian et al., 1993, 15(4):156; Wang, 1985:35; Wu et Chen, 1980(4):47; Wu-xing, 1979:25; Xu et al., 1984:29; Xu et al., 1987:140; Yan et Wang, 1987:16; Yang et al., 1990:109; Ye et Wang, 1987:11; Zhang, 1983:30; Zhang et al., 1994:11; Zhao, 1984:2; 1989:174-181; Zhang et He, 1981:102; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao et al., 1979:25-34; Zhong, 1983:158; Zhou, 1986:155; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)

Theridion octomaculatum Boesenberg et Strand, 1906:138.
Coleosoma octomaculatum, Yaginuma, 1986:48.
別 名：*八點球腹蛛*。
棲 息：稻田、棉田、菜園、花生田、茶園
捕 食：*Nilaparvata lugens* 褐飛蝨
Sogatella furcifera 白背飛蝨
Nephotettix cincticeps 黑尾葉蟬
Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)
稻蚜
Aphis gossypii 棉蚜
Aphis cracivora 豆蚜
Aphis fariońsa 柳蚜
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Macrosiphum avenae 麥長管蚜
Scirpophaga incertullas (Walker) 三化螟
Cnaphalocroceis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
豆野螟
瓜野螟
Adoxophyes orana 棉褐帶捲葉蛾
茶尺蠖
Clostera anastomosis Linnaeus 分月扇舟蛾(卵、幼蟲)
燈蛾
Anomis flava 棉小造橋蟲
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Pectinophora gossypiella (Saunders) 紅鈴蟲
菜青蟲
葉蟎。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Conopistha argentata hedini (Schenkel) 海氏銀錐腹蛛 (Hu, 1984:167)

Conopistha argentata hedini (Schenkel, 1936:)
棲 息：

捕 食 性。
分 佈：四川。

Conopistha bonadea Karsch 銀斑錐腹蛛 (Hu, 1984:160)
Conopistha bonadea Karsch, 1881:
棲 息：稻區，多寄棲于山地的圓蛛屬(*Aranea*)、金蛛屬(*Argiope*)及絡新婦屬(*Nephila*)等蜘蛛網上。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、浙江、河南。

Conopistha fissifrons (Cambridge) 裂錐腹蛛 (Hu, 1984:161)
Conopistha fissifrons (Cambridge, 1869:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、香港、廣東。

Conopistha fur (Boesenberg et Strand) 毛錐腹蛛 (Hu, 1984:161)
Conopistha fur (Boesenberg et Strand, 1906:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江蘇。

Conopistha longispina (Saito) 縱條錐腹蛛 (Hu, 1984:161)
Conopistha longispina (Saito, 1933:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Conopistha miniacea (Dolleschall) 橘紅錐腹蛛 (Hu, 1984:160)
Conopistha miniacea (Dolleschall, 1857:)
Argyrodes miniaceus (Dolleschall)
Theridion miniaceus Dolleschall
棲 息：山林灌木叢中，常寄棲于圓蛛屬、絡新婦屬及艾蛛屬等網上
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、東北。

Enoplognatha crassipes Boesenberg et Strand 粗巨齒蛛 (Hu, 1984:163)
Enoplognatha crassipes Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Enoplognatha dorsinotata Boesenberg et Strand 背紋巨齒螯蛛 (He, et al., 1991:126; Hu, 1984:162; Shi et al., 1989-90:8; Xie et al., 1999, 21(2):86; Zhang, 1983:30; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao, 1984:2; Zong et al., 1984:249)

Enoplognatha dorsinotata Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田、橘園、棉田、麥田、菜地。
捕 食：菜蚜
稻蝨
葉蟬
瓜野螟
豆野螟
燈蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
葉蟎。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西。

Enoplognatha foliicola Donitz et Strand 葉斑巨齒蛛 (Hu, 1984:163)
Enoplognatha foliicola Donitz et Strand, 1906:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Enoplognatha japonica Boesenberg et Strand 叉斑巨齒螯蛛 (Feng, 1990:118; He, et al., 1991:127; Hu, 1984:161; Lin et Qian, 1981(1-2):91; Wang, 1985:187; Wu-xing, 1979:25; Zhao, 1984:2; Zhou et Xiang, 1987:17-20)
Enoplognatha japonica Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻叢基部、棉花、小麥、大豆、玉米、蔬菜、茶樹農作物植株底層、石塊下、土縫等處張不規則小網。
捕 食：稻蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、天津、青海、甘肅、吉林。

Enoplognatha mandibularis Lucas 螯巨齒螯蛛 (He, et al., 1991:127; Hu, 1984:162)
Enoplognatha mandibularis Lucas, 1846:
棲 息：稻田。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、湖南、廣西、西藏、浙江、北京。

Enoplognatha mandibularis orientalis Schenkel 東顎巨齒蛛 (Hu, 1984:163)
Enoplognatha mandibularis orientalis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Enoplognatha thoracica (Hühn) 胸斑巨齒螯蛛 (He, et al., 1991:127)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Enoplognatha transversifoveata Boesenberg et Strand 橫窩齒螯蛛 (Feng, 1990:119; He, et al., 1991:127; Hu, 1984:163; Song, 1987:123)

Enoplognatha transversifoveata Boesenberg et Strand, 1906:
別 名：*橫溝巨齒蛛*。
棲 息：稻田，稻叢基部張不規則小型網。
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Episinus affinis Boesenberg et Strand (Zhang, 1983:30)

棲 息：菜園。
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Episinus bcornutus Yoshida 雙角丘腹蛛 (Song, 1987:124)

Episinus bcornutus Yoshida, 1983:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Episinus nubilus Yaginuma 雲角腹蛛 (Chen, 1992:69; He et al., 1991:127; Hu, 1984:163)

Episinus nubilus Yaginuma, 1960:
棲 息：稻田、茶園。
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Episinus punctisparsus Yoshida 斑丘腹蛛 (Song, 1987:125)

Episinus punctisparsus Yoshida, 1982:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Episinus spiniger O. P. Cambridge 刺丘腹蛛 (Song, 1987:125)

Episinus spiniger O. P. Cambridge, 1870:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Episinus yoshimurai Yoshida 吉村丘腹蛛 (Song, 1987:127)

Episinus yoshimurai Yoshida, 1982:

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Latrodectus hasseltii Thorell 赤背蛛 (Hu, 1984:164)
Latrodectus hasseltii Thorell, 1870:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣(澎湖)。

Latrodectus mactans (Fabricius) 紅斑毒蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:457; Hu, 1984:164)
Aranea mactans Fabricius, 1775:432.
Latrodectus mactans, Emerton, 1909:181.
別 名：*黑寡婦*(Black widow)。
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：海南；東洋區、澳洲、非洲、歐洲、廣佈南北美洲。

Steatoda albomaculata (De Geer) 白斑肥腹蛛 (He, et al., 1991:127; Hu, 1984:164; Song et Haupt, 1996:311)
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778:)
棲 息：亂石塊下張網。
捕 食：小甲蟲。
分 佈：河南、青海、甘肅、新疆、內蒙古；日本、歐洲。

Steadoda cavernicola Boesenberg et Strand 半月肥腹蛛 (He, et al., 1991:127; Hu, 1984:166; Sun et al., 1984:111)
Steadoda cavernicola Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田、雜草。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇。

Steatoda phalerata Panzer 十字姬腹蛛 (He, et al., 1991:127)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Steatoda septemmaculatus (Keyserling) 七斑肥腹蛛 (Hu, 1984:165)
Steatoda septemmaculatus (Keyserling, 1884:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：

Steatoda trigulosa (Walckenaer) 三角肥腹蛛 (Hu, 1984:167)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：山西。

Steatoda sp. 肥腹蛛 (Sun et al., 1984:111)

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Theridion angulithorax Boesenberg et Strand 横帶球腹蛛 (Dong, 1988:85; He, et al., 1991:127; Hu, 1984:167; Li et al., 1983:112; Zhao, 1984:2;)

Theridion angulithorax Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：棉區、花生田、牡丹園。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、河南、陝西、山東、遼寧、吉林。

Theridion elegans Saito 粉點球腹蛛 (Hu, 1984:168)

Theridion elegans Saito, 1906:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣(山地)。

Theridion hummeli Schenkel 胡氏球腹蛛 (Hu, 1984:173)

Theridion hummeli Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Theridion impressum L. Koch 刻痕球腹蛛 (Hu, 1984:173)

Theridion impressum L. Koch, 1881:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅、內蒙古。

Theridion inquinatum continentale Strand 陸寄球腹蛛 (Hu, 1984:173)

Theridion inquinatum continentale Strand, 1907:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣東(汕頭)。

Theridion japonicum Boesenberg et Strand 姬球腹蛛 (Hu, 1984:168)

Theridion japonicum Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：多在山地或平地的樹枝間張網捕蟲。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、陝西。

Theridion kompirense Boesenberg et Strand 三點球腹蛛 (Hu, 1984:169)
Theridion kompirense Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：多在稻叢葉下結網；棉田、玉米田亦可見。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、四川、浙江、山東。

Theridion latifolium Yaginuma 闊葉球腹蛛 (Hu, 1984:170)
Theridion latifolium Yaginuma, 1960:
棲 息：丘陵地帶旱田作物間張網。
捕 食 性。
分 佈：山東區(莒南)。

Theridion longihirsutum Strand 長毛球腹蛛 (Hu, 1984:173)
Theridion longihirsutum Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東(汕頭)。

Theridion lunatum (Olivier) 月形球腹蛛 (Hu, 1984:173)
Theridion lunatum (Olivier, 1789:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣、北京。

Theridion octomaculatum Boesenberg et Strant 八斑球腹蛛 (ASZI, 1987, 2:849; Dai, 1995, 11(4):184; Dong, 1987, 14(1):28, 64; Dong, 1988:85; Hu, 1984:170; Hunan, Teachers College et Xiang-yang, 1980(1):24; Li, 1989:91;Lu et al., 1986:63; Luo et Zhuo, 1986:74; Qu et al., 1986:142; Shi, 1980[ed.]:128; Shi et al., 1989-90: 88; Wang, 1985:187; Zhang et He, 1981, 8(2):101-110; Zhao, 1984:2; Zhou et Xiang, 1987:17-20;)
Theridion octomaculatum Boesenberg et Strant, 1906:
棲 息：稻田、菜園、茶園、區棉田、橘園、牡丹園。
捕 食：稻葉蟬(成蟲、若蟲)
稻飛蝨(成蟲、若蟲)
稻田重要天敵，田間相對密度占 70-80 %
茶園食蚜蠅成蟲及幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、湖南、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧、吉林。

Theridion ovatum (Clerck) 悅目球腹蛛 (Hu, 1984:173)
Theridion ovatum (Clerck, 1757:)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河南、新疆(吉木薩爾)。

Theridion pinastri L. Koch 雙星球腹蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:121; He, et al., 1991:127; Hu, 1984:171; Song, 1987:127)
Theridion pinastri L. Koch, 1872:
別 名：*松星球腹蛛，雙釣球蛛*。
棲 息：農田、果樹園、茶園，在枝幹間結不規則小網，具假死；生境與闊葉球腹蛛相似。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。
分 佈：貴州、湖南、江蘇、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、吉林。

Theridion quadrimaculata Qi 四斑球腹蛛 (He, et al., 1991:127)
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、江蘇、湖北。

Theridion rapulum Yaginuma 三黑斑球蛛 (Feng, 1990:122)
Theridion rapulum Yaginuma, 1960:
棲 息：見于柑橘園草叢及橘葉面。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、吉林。

Theridion spiniventre Cambridge 刺腹球腹蛛 (Song, 1987:128)
Theridion spiniventre Cambridge, 1869:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Theridion strninotatum Boesenberg et Strand 三叉球腹蛛 (Hu, 1984:172)
Theridion strninotatum Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：多在山地草叢或旱田的作物間張網。
捕 食 性。
分 佈：山東區(莒南)。

Theridion sudabides Boesenberg et Strand 四棘球腹蛛 (Hu, 1984:172)
Theridion sudabides Biesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣東、四川、湖南、浙江、安徽。

Theridion suppallens Boesenberg et Strand 邊斑球腹蛛 (He, et al., 1991:127)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河南、北京。

Theridion tepidariorum (Koch) 溫室球腹蛛 (ASZI, 1987, 2:849; Dong, 1988:85; Hu, 1984:173; Li et al., 1983:112; Wang et al., 1989:119)

Theridion tepidariorum (Koch, 1841:)

棲 息：溫室、洞穴、墻角、樹幹、草叢、室內、稻田、花生田、棉田、果園、牡丹園、荻和蘆葦田等。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、西藏、四川、江蘇、浙江、安徽、湖北、河南、陝西、山東、甘肅、寧夏等全國各地；亞洲、歐洲。

Theridion varians Hahn. 圓突球腹蛛 (Hu, 1984:174)

Theridion varians Hahn., 1831:

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：吉林(吉林市)。

Theridion yunnanensis Schenkel 雲南球腹蛛 (Hu, 1984:174)

Theridion yunnanensis Schenkel, 1963:

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Theridion sp. 球腹蛛 (Shi et al., 1989-90:88)

棲 息：橘園。
捕 食 性。
分 佈：上海。

Theridula caudata Saito 尾丘腹蛛 (Hu, 1984:174)

Theridula caudata Saito, 1933:

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Theridula opulenta (Walckenaer) 華麗丘腹蛛 (Hu, 1984:174)

Theridula opulenta (Walckenaer, 1841:)

棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣東、四川。

Nesticidae 類球腹蛛科

Nesticus alteratus Chamberlin 異類球蛛 (Hu, 1984:176)

Nesticus alteratus Chamberlin, 1924:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：江蘇(蘇州)。

Nesticus mogera Yaginuma 底棲類球蛛 (Hu, 1984:175)

Nesticus mogera Yaginuma, 1970:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：陝西、山東。

Nesticus odontus Chen 齒類球腹蛛 (Chen, 1984:34)

Nesticus odontus Chen, 1984:34-35.

棲 息：石塊下。

捕 食 性。

分 佈：浙江(杭州黃龍洞)。

Linyphiidae 皿網蛛科(華蓋蛛科)

Agyneta subtilis O. P. Cambridge 細丘皿蛛 (Song, 1987:129)

Agyneta subtilis O. P. Cambridge, 1863:

棲 息：旱田。

捕 食 性。

分 佈：河北。

Allomengea adornata Zhu et al. 斑冊蓋蛛 (Zhu et al., 1986:267)

Allomengea adornata Zhu et al., 1986:267-268.

棲 息：楊樹根部的落葉中。

捕 食 性。

分 佈：青海(湟源縣)。

Bathyphates bohuensis Zhu et Wan 博湖指蛛 (He, et al., 1991:127)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Bathyphantes gracilis (Blackwall) 柔弱指蛛 (He, et al., 1991:127)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Bathyphantes longissimus Zhu et Wen 特長指蛛 (Song, 1987:130; Zhu et Wen, 1983:149)

Bathyphantes longissimus Zhu et Wen, 1983:149-150.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：吉林(和龍)。

Bathyphantes orientis Oi 東長突蛛 (Hu, 1984:177; Song, 1987:131)

Bathyphantes orientis Oi, 1960:

棲 息：多在大豆田張網捕蟲。

捕 食 性。

分 佈：吉林。

Bolyphantes nigromaculata Zhu et Wen 黑斑齒刺蛛 (Song, 1987:132; Zhu et Wen, 1983:150)

Bolyphantes nigromaculata Zhu et Wen, 1983:150-152.

棲 息：潮濕草叢內。

捕 食 性。

分 佈：吉林(長春)、黑龍江(哈爾濱)。

Centromerus tainmushanus Chen et Song 天目中皿蛛 (Chen et Song, 1987:136)

Centromerus tainmushanus Chen et Song, 1987:136-137.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：浙江(西天目山新茅逢)。

Entelecara aurea Gao et Zhu 黃金隆首蛛 (Gao et Zhu, 1993:27)

Entelecara aurea Gao et Zhu, 1993:27-28.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北(神農架林區)。

Erigonidium grminicollum (Sundevall) 草間小黑蛛 (Cang et al., 1989:70-76; Chen et al., 1996, 8(4):253-254; Chen et al., 1996:469-472; Dai, 1995, 11(4):184; East-south AC, DPP., BCS., 1979, 3:40-43; Guan et al., 1994, 20(2):39-40; Hunan, Teachers College et Xiang-Yang, 1980(1):24; Lu et al., 1986:63; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Qi et al., 1989:20-27; Tang et al., 1995, 17(4):168; Zhang et al., 1993(3):46-47; Zhang et al., 1994, 16(1):11)

棲 息：茶園、菜園。

捕 食：葉蟬

Aphis gossypii Glover 棉蚜

Brevicoryne brassicae 菜蚜(甘藍蚜)

Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜

Myzus persicae 桃蚜

蚜蟲

Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧

斜紋夜蛾

菜青蟲
瓜野螟
豆野螟
茄二十八星瓢蟲
茶園食蚜蠅成蟲及幼蟲。
分 佈：廣東、貴州、浙江、江蘇、湖北。

Floronia bucculenta (Clerck) 三角弗蛛 (He, et al., 1991:127)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲。

Floronia zhejiangensis Zhu et al. 浙江弗蛛 (Zhu et al., 1987:139)
Floronia zhejiangensis Zhu et al., 1987:139-141.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：浙江(松陽縣)。

Gnathonarium flavidum Gao et Zhu 淡黃額角蛛 (Gao et Zhu, 1993:28)
Gnathonarium flavidum Gao et Zhu, 1993:28-31.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Gnathonarium phragmigerum Gao et Zhu 中隔額角蛛 (Gao et Zhu, 1988:350)
Gnathonarium phragmigerum Gao et Zhu, 1988:350-352.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架林區陽日)。

Lepthyphantes aduncus Zhu et al. 舟斑皿蛛 (Zhu et al., 1986:264)
Lepthyphantes aduncus Zhu et al., 1986:264-265.
棲 息：息灌木叢中
捕 食 性。
分 佈：青海(湟源縣)。

Lepthyphantes denticulatus Zhu et al. 小齒斑皿蛛 (Zhu et al., 1986:265)
Lepthyphantes denticulatus Zhu et al., 1986:265-267.
棲 息：雜草、圍墻上。
捕 食 性。
分 佈：青海(湟源縣)。

Lepthyphantes expunctus (O. P. Cambridge) 外斑冊蛛 (Zhou et Song, 1985, 2(3/4):271)

Lepthyphantes expunctus (O. P. Cambridge, 1875:)
棲 息：林區樹幹、樹叉或草叢間結皿網。
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Lepthyphantes halonatus Li et Zhu 月暈斑皿蛛 (Li et Zhu, 1995:39)
Lepthyphantes halonatus Li et Zhu, 1995:39-41.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Linyphia triangularis (Clerck) 三角皿蛛 (Song, 1987:133)
Linyphia triangularis (Clerck, 1757:)
=*Linyphia hortensis* Saito, 1936:30-32.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河北、甘肅、內蒙古、遼寧。

Macrargus alpinus Li et Zhu 山地珍蛛 (Li et Zhu, 1995:41)
Macrargus alpinus Li et Zhu, 1995:41-42.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州、湖北(神農架)。

Meioneta falcata Li et Zhu 鐮侏儒蛛 (Li et Zhu, 1995:42)
Meioneta falcata Li et Zhu, 1995:42-43.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Meioneta palustris Li et Zhu 沼澤侏儒蛛 (Li et Zhu, 1995:44)
Meioneta palustris Li et Zhu, 1995:44-45.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Meioneta nigra Oi 黑侏儒蛛 (He, et al., 1991:128; Hu, 1984:178; Zhao, 1984:3)
Meioneta nigra Oi, 1960:
棲 息：多在大豆田張網。
捕 食 性。
分 佈：江蘇、河南、北京、青海、甘肅、內蒙古、吉林。

Microlinyphia pusilla (Sundevall) 弱小皿蛛 (Song, 1987:134)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1829:)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Nematogmus digitatus Fei et Zhu 指狀疣舟蛛 (Fei et Zhu, 1994:293)
Nematogmus digitatus Fei et Zhu, 1994:293-295.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：吉林(長白山)。

Namatogmus sp. 高頭蛛 (Sun et al., 1984:111)
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Neriene albolimbata (Karsch) 白緣蓋蛛 (He, et al., 1991:128; Hu, 1984:179)
Linyphia albolimbata Karsch, 1879:
別 名：*白緣皿网蛛*。
棲 息：山地灌木叢中的陰處，接近地面張網. 江南稻區有分佈。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、吉林。

Neriene angulifera (Schenkel) 麗紋蓋蛛 (Hu, 1984:186; Song, 1987:135)
Neriene angulfera (Schenkel, 1953:)
=*Linyphis frutetorum* Schenkel, 1936:79.
別 名：*角蓋蛛*。
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河南(西峽)、甘肅。

Neriene aquilirostralis Chen et Zhu 鷹喙蓋蛛 (Chen et Zhu, 1989:160)
Neriene aquilirostralis Chen et Zhu, 1989:160-162.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Neriene calozonata Chen et Zhu 麗帶蓋蛛 (Chen et Zhu, 1989:162)
Neriene calozonata Chen et Zhu, 1989:162-164.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(燕洞)。

Neriene cavaleriei (Schenkel) 卡氏蓋蛛 (ASZI, 1987, 2:851; Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:123; Hu, 1984:180; Song, 1987:135)

Linyphia cavaleriei Schenkel, 1963:
棲 息：多在農田、茶園、灌木叢中及草叢間張皿狀網。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。
分 佈：廣西、貴州、湖南、浙江、甘肅。

Neriene clathrata (Sundevall) 葉紋蓋蛛 (Feng, 1990:124; Hu, 1984:180; Song, 1987:137)

Linyphia clathrata Sundevall, 1829:
別 名：*波紋蓋蛛*。
棲 息：多在山坡離地面的草叢間張皿網。
捕 食 性。
分 佈：貴州、安徽、山西、甘肅。

Neriene compta Zhu et Sha 飾斑蓋蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; Zhu et Sha, 1986:163)

Neriene compta Zhu et Sha, 1986:163-165.
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。
分 佈：貴州、四川、浙江、湖北。

Neriene decaormaculata Chen et Zhu 華斑蓋蛛 (Chen et Zhu, 1988:346)

Neriene decaormaculata Chen et Zhu, 1988:346-348.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架三岔)。

Neriene emphana (Walckenaer) 醒目蓋蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; 1999, 21(40:166; Feng, 1990:125; He, et al., 1991:128; Hu, 1984:182; Song, 1987:138)

Linyphia emphama Walckenaer, 1841:
別 名：*醒目冊网蛛，明顯蓋蛛*。
棲 息：茶園、在山林的喬木(杉、松等)枝葉間張大型而複雜的皿網，網扁或稍呈圓頂形。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)
蛾類
蚊。
分 佈：福建、湖南、貴州、四川、江蘇、河南、陝西、山西、北京、內蒙古、吉林。

Neriene herbosa Oi 草蓋蛛 (Hu, 1984:183)

Neriene herbosa Oi, 1960:
棲 息：生活在開闊的草地,除非朝露未乾時,網不易察覺。
捕 食 性。
分 佈：湖南(衡山)。

Neriene japonica (Oi) 日本蓋蛛 (Feng, 1990:126; Hu, 1984:186; Song, 1987:139)

Neriene japonica (Oi, 1960:)
Neolinyphia japonica Oi, 1960:224.
棲 息：稻田、棉田均可見，結皿網。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、江蘇、南京、河南、北京、吉林。

Neriene limbatinella (Boesenberg et Strand) 窄邊蓋蛛 (Feng, 1990:127; Song, 1987:140)

Linyphia limbatinella Boesenberg et Strand, 1906:174.
=*Linyphia fenestrata* Schenkel, 1936:7, 76.
=*Linyphia peltata,* Schenkel, 1936:78.
Neriene limbatinella, Helsdingen, 1969:278-284.
別 名：*小邊蓋蛛*。
棲 息：農田及山區灌木叢中張網。
捕 食 性。
分 佈：浙江、北京、吉林。

Neriene liupanensis Tang et Song 六盤蓋蛛 (Tang et Song, 1992:415)

Neriene liupanensis Tang et Song, 1992:415-416.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：寧夏(涇源六盤山自然保護區)。

Neriene longipedella (Bosenberg et Strand) 長肢蓋蛛 (ASZI, 1987, 2:851; Chen, 1992:69; Feng, 1990:128; Hu, 1984: 184; Song, 1987:141)

Linyphia marginata longipedella Bosenberg et Strand, 1906:
=*Linyphia marginata,* Schenkel, 1936:78.
Neriene longipedella, Helsdingen, 1969:235-242.
棲 息：多在農田、茶園及灌木叢中張皿網。
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江、湖北、陝西、甘肅；日本。

Neriene nigripectoris (Oi) 黑斑蓋蛛 (Feng, 1990:129)

Neriene nigripectoris (Oi, 1960:)
棲 息：草叢間張冊狀網。
捕 食 性。
分 佈：廣西、湖南。

Neriene nitens Chen et Zhu 華麗蓋蛛 (Chen et Zhu, 1992:418)

Neriene nitens Chen et Zhu, 1992:418-422.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、四川、浙江、安徽、湖北。

Neriene oidedicata Helsdingen 大井蓋蛛 (Chen, 1992:69; Feng, 1990:130; Hu, 1984:186)

Neriene oidedicata Helsdingen, 1969:
棲 息：茶園、山區灌木叢中的暗處張倒皿網。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、江蘇、湖北、河南、吉林、黑龍江。

Neriene radiata (Walckenaer) 花腹蓋蛛 (ASZI, 1987, 2:851; Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:131; He, et al., 1991:128; Hu, 1984:185; Song, 1987:142; Zhang, 1983:30; Zhang et Li, 1982:228; Zhao, 1984:3)

Linyphia radiata Walckenaer, 1841:
=*Linyphia marginata* Schenkel, 1963:10.
Neriene radiata, Helsdingen, 1969:223-235.
棲 息：稻田、菜園、山坡的灌木、喬木或茶園中，在植物基部張網，網分上下兩層，上層網形似倒扣的碗底，下層爲水平圓網，兩網間以垂直蛛絲連接。
捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻
Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)
蚜蟲
蚊。
分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、河北、北京、甘肅、寧夏、吉林；亞洲、歐洲。

Neriene sp. 蓋蛛 (Dai, 1999, 21(4):166)

棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。
分 佈：貴州。

Oedothorax foratus Ma et Zhu 穿孔瘤胸蛛 (Ma et Zhu, 1990:433)

Oedothorax foratus Ma et Zhu, 1990:433-435.
棲 息：潮濕的雜草下部及水邊的草叢中。
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架林區木魚)。

Oedothorax rimatus Ma et Zhu 裂縫瘤胸蛛 (Ma et Zhu, 1990:431)

Oedothorax rimatus Ma et Zhu, 1990:431-433.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架林區劉家屋場大岩屋)。

Parameioneta bilobata Li et Zhu 二葉玲蛛 (Li et Zhu, 1995:45)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州、湖南、湖北(神農架)。

Porrhomma microphtalmam (O.P. Camdridge) 小前眼蛛 (Zhao, 1984:3)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Prolinyphia bilineata Oi 雙紋前皿蛛 (He, et al., 1991:128)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Ummeliata insecticeps Boes. et Strand 食蟲溝瘤蛛 (Gao et al., 1994, 10(4):157-161;Xie et al., 1999, 21(2):87; Yu et Wang, 1993, 20(1):7-12; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhang et al., 1996, 12(1):33-38; Zhang et al., 1996, 23(4):363-367; Zhang et al., 1997, 13(2):65-68)
棲 息：菜園、稻田。
捕 食：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾
瓜野螟
豆野螟
褐飛蝨
白背飛蝨
葉蟬
蚜蟲。
分 佈：廣東、湖南、浙江、江蘇、湖北。

Walckenaera dentata Zhu et Zhou 脛齒瓦蜂 (Zhu et Zhou, 1988:343)
Walckenaera dentata Zhu et Zhou, 1988:343-345.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆(博湖縣)。

Erigonidae (Micryphantidae) 微蛛科
(Ye et al., 1982 4(4):24-29)

Caracladus montanus Sha et Zhu 山支頭蛛 (Sha et Zhu, 1994:172)
Caracladus montanus Sha et Zhu, 1994:172-173.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：吉林(長白山)。

Callitrichia formosana Oi 臺灣美毛蛛 (Song, 1987:144)
Callitrichia formosana Oi, 1977:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Ceratinella plancyi (Simon) 普氏角微蛛 (Song, 1987:145)

Erigone plancyi Simon, 1880:113-114.
Ceratinella plancyi, Song et Yu, 1983:3.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Entelecara aurea Gao et Zhu 金黃隆首蛛 (Gao et Zhu, 1993:27)

Entelecara aurea Gao et Zhu, 1993:27-28.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Gnathonarium flavidum Gao et Zhu 淡黃額角蛛 (Gao et Zhu, 1993:28)

Gnathonarium flavidum Gao et Zhu, 1993:28-31.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架林區)。

Erigone atra (Blackwall) 黑微蛛 (He, et al., 1991:128; Hu, 1984:193; Song, 1987:146)

Erigone atra (Blackwall, 1841:)
別 名：*黑環隆背蛛*。
棲 息：大豆田、旱田。
捕 食 性。
分 佈：雲南、甘肅、吉林。

Erigone changchunensis Zhu et Wen 長春微蛛 (He, et al., 1991:128; Hu, 1984:190; Song, 1987:147)

Erigone changchunensis Zhu et Wen, 1980:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅、吉林。

Erigone dentipalpis (Wider) 齒肢弱蛛 (Hu, 1984:191; Song, 1987:147; Zhao, 1984:3)

Erigone dentipalpis (Wider, 1934:)
別 名：*齒肢隆背蛛，齒須微蛛*。
棲 息：棉田或其他旱田、果園及林間草叢。
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Erigone koshiensis Oi 古志隆背微蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; He, et al., 1991:128; Hu, 1984:192)

Erigone koshiensis Oi, 1960:
棲 息：多棲息于落葉下、茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。

分 佈：臺灣、貴州、四川、上海。

Erigone prominens Boesenberg et Strand 隆背微蛛 (ASZI, 1987, 2:853; Chen et al., 1990:135; Feng, 1990:132; He, et al., 1991:128; Hu, 1984:192; Li et al., 1983:112; Song, 1987:148; Sun et al., 1980(4):23; Wu-sing, 1979:25; Zhao, 1984:3; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249)

Erigone prominens Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：稻田、棉田、麥田、花生田。

捕 食：稻飛蝨

黑尾葉蟬。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、北京、青海、甘肅、新疆、內蒙古。

Erigone vagans Audonin 底棲微蛛 (He, et al., 1991:128)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Erigone sp. 微蛛 (Chen, 1992:69)

棲 息：茶園

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Erigonidium graminicolum (Sundevall) 草間小黑蛛 (ASZI, 1987, 2:852; Cao, 1986:182; Chen et al., 1999, 26(1):7-12; Cui et Ma, 1994:281; Dai, 1999, 21(4):166; Dong, 1984:91; Dong, 1987, 14(1):28, 64; Dong, 1988:85; Feng, 1990:133; He et al., 1991:107-112; He et al., 1991:128; Hu, 1984:188; Huang, 1990[ed.]:226-227; Hunan, 1987:70-73; Li, 1981(1-2):84; Li, 1989:91; Li et Zhou, 1985, 20(4):1-3; Li et al., 1983:112; Lin et Qian, 1981(1-2):91; Lin et al., 1982 4(3):38-41; Luo et Zhuo, 1986:74; Nan et al., 1987:125; Niu et Liu, 1981(3):22; Pang et al., 1998,25(3):193-196; Qiu et al., 1996, 18(3):139-140; Qu et al., 1986:142; Shi, 1980[ed.]:128; Shi et al., 1989-90:88; Song, 1987:149; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:39; Tan et al., 1997, 24(4):341-346; Wang, 1985:35; 187; Wang, 1991:134-138; West-south Agr. Coll., 1980(3):5-14; Wu-sing, 1979:25; Wu et Chen, 1980(4):47; Wu et Ji, 1989:151-155; Wu et al., 1991:28; Wu et al., 1991:101;Xie, 1990:137-138; Xie et al., **1999**, 21(2):86; Xu et al., 1984:29; Xu et al., 1987:140; Yan et Wan, 1987:16; Yan et Wu, 1989, 18(3):289-294; Ye et Wang, 1987:11; Yu et Wang, 1993, 20(1):7-12; Zhang, 1983:30; Zhang, 1989:26-27; Zhang et He, 1981, 8(2):102; Zhao, 1984:3; Zhao et Liu, 1982, 28(3):271-282; Zhao et Zhuo, 1983:27-28; Zhao et al., 1990:2; Zhao et al., 1993, 20(1):13-17; Zhong, 1983:158; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119; Zou et Li, 1987:157)

Linyphia graminicolum Sundevall, 1829:

=*Neriene graminicola,* Blackwall, 1928:

棲 息：水稻、棉花、麥類、花生田、高粱、玉米、大豆、木瓜、蔬菜、草間、林木、橘園、山區林間樹叢、竹林、城鄉的果園、桑園、茶園、蔬菜上張結不規則小網，和其他經濟作物區都有分佈。

捕 食：*Adelphocoris suturalis* 中黑盲蝽

Lygus llucorum 綠盲蝽

Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)

稻葉蟬(成蟲、若蟲)

稻飛蝨(成蟲、若蟲)

稻蚜

Aphis gossypii Glover　棉蚜

Coleophora laricella Hübner　落葉松鞘蛾

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée)　稻縱捲葉螟(低齡幼蟲)

Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟(蟻螟)

Chilo suppressalis (Walker)　二化螟(蟻螟)

Ostrinia furnacalis (Guenée)　玉米螟

Helicoverpa armigera (Hübner)　棉鈴蟲

Tetranychus cinnabarinus　朱砂葉蟎

Tetranychus truncatus Ehara　截形葉蟎

Tetranychus urticae Koch　二斑葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、青海、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；亞洲、歐洲。

Gnathonarium coringerum Zh et Wen 隆突額角蛛 (Hu, 1984:193)

Gnathonarium coringerum Zh et Wen, 1980:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：山東、甘肅、吉林。

Gnathonarium dentatum (Wider) 齒螯額角蛛 (ASZI, 1987, 2:853; Feng, 1990:134; He, et al., 1991:128; Hu, 1984:194; Li et al., 1983:112; Song, 1987:150; Sun et al., 1980(4):23; Yu et Wang, 1993, 20(1):7-12; Zhao, 1984:3)

Gnathonarium dentatum (Wider, 1834:)

棲 息：稻田、麥田、花生田、玉米、棉田。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬

Chilo suppressalis (Walker)　二化螟(蟻螟)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、青海、甘肅、內蒙古、吉林、黑龍江；亞洲、歐洲。

Gnathonarium gibberum Oi 駝背額角蛛 (ASZI, 1987, 2:854; Feng, 1990:135; He, et al., 1991:129; Hu, 1984:194; Li et al., 1983:112; Song, 1987:152; Sun et al., 1980(4):23; Wu-xing, 1979:25; Yu et Wang, 1993, 20(1):7-12; Zhao, 1984:3; Zheng et al., 1985:100-103; Zhu et Zheng, 1984:87)

Gnathonarium gibberum Oi, 1960:

棲 息：稻田、棉田、花生田。

捕 食：稻葉蟬

稻飛蝨

Chilo suppressalis (Walker)　二化螟(蟻螟)。

分 佈：江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、河北、北京。

Gnathonarium sp. 額角蛛 (Dai, 1999, 21(4):166)

棲 息：茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。

分 佈：貴州。

Gongylidium clavus Zhu et Wen 釘突圓膝蛛 (Hu, 1984:196)

Gongylidium clavus Zhu et Wen, 1980:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古、吉林。

Hylyphantes nigritus (Simon) 黑鑽頭蛛 (He, et al., 1991:129)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：吉林、黑龍江。

Nematogmus sanguinolentus (Walcknaer) 橙色疣丹蛛 (Dai, 1997, 19(1):42; Feng, 1990:136; He, et al., 1991:129; Song, 1987:152)

Nematogmus sanguinolentus (Walcknaer, 1837:)

棲 息：茶叢間。

捕 食 性。

分 佈：貴州、浙江、北京、遼寧、吉林。

Nematogmus stylitus Boesenberg et Strand 突眼微蛛 (He, et al., 1991:129)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Nematogmus sp. 疣舟蛛 (Dai, 1999, 21(4):166)

棲 息：茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)。

分 佈：貴州。

Notioscopus pallidulus 濕白蛛 (He, et al., 1991:129)

棲 息：稻田。

捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬。

分 佈：臺灣。

Oedothorax apicatus (Blackwall) 僧帽瘤胸蛛 (Hu, 1984:196; Niu et Liu, 1981(3):22; Song, 1987:153; Zhao, 1984:3)

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850:)

別 名：*頂突瘤胸蛛*。

棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：新疆、遼寧。

Oedothorax hulongensis Zhu et Wen 和龍瘤胸蛛 (He, et al., 1991:129; Hu, 1984:197; Song, 1987:154; Zhao, 1984:3)

Oedothorax hulongensis Zhu et Wen, 1980:
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：河南、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧、吉林。

Oedothorax insecticeps Boesenberg et Strand 食蟲瘤胸蛛 (ASZI, 1987, 2:852; Chen, 1996:32; Chen et Chiu, 1979:285-290; Chiu et Chen, 1981:279-276; Chiu et Cheng, 1975:451; 1976:254-260; Chiu et al., 1974:153-161; 1976:377-390; Chu et al., 1977:1-12; East-Soth AC, DPP, BCS., 1979, 3:40-43; Feng, 1990:137; Hu, 1984:198; Guan et al., 1994, 20(2):39-40; Li et al., 1983:112; Luo et Zhuo, 1986:74; Pan et al., 1995, 11(3):125-128; Qi et al., 1989:20-27; Qi et al., 1990, 17(1):29-34; Qiu et al., 1996, 18(3):139-140; Shi et al., 1989-90: 88; Song, 1987:155; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:39; Tang et Zhou, 1983:207-214; Tao, 1993, 15(1):39-44; Tao et al.., 1993, 15(4):167; Wang, 1985:35; 187-191; Wu-xing, 1979:25; Xu et al., 1984:29; Xu et al., 1987:140; Ye et Wang, 1987:11; Zhang, 1983:30; Zhang et He, 1981, 8(2):102; Zhang et Wu, 1983:108-111; Zhang et al., 1987:157-159; Zhao, 1984:3; Zheng et al., 1985:100-103; Zhong, 1983:158; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249)

Oedothorax insecticeps Boesenberg et Strand, 1906:
=*Hymmelia incisa* Schenkel, 1936:52-55.
別 名：*裂頭小盤蛛*。
棲 息：稻田、棉田、橘園、菜園、花生田。
捕 食：稻葉蟬
白背飛蝨
稻飛蝨(重要天敵)
蚜蟲
搖蚊
稻癭蚊
三化螟(蟻螟)
稻縱捲葉螟
稻螟蛉(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、吉林；朝鮮、日本。

Oedothorax osakaensis Oi 大阪瘤胸蛛 (He, et al., 1991:129)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Oedothorax retusus (Westring) 鈍瘤胸蛛 (Hu, 1984:199; Shu et Yu, 1985:93; Zhao, 1984:3)

Oedothorax retusus (Westr, 1851:)
棲 息：棉田。
捕 食：*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾(幼蟲)。

分 佈：新疆、遼寧。

Oedothorax tokyoensis (Uyemura) 柵地瘤胸蛛 (He, et al., 1991:129; Hu, 1984:200)

Oedothorax tokyoensis (Uyemura, 1941:)

棲 息：以成蛛在土縫、麥根或枯枝落葉下越冬，天暖時外出獵食。

捕 食 性。

分 佈：河南、陝西、河北、北京、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、吉林。

Scotargus inerrans (O.P. Cambridge) 靜棲毛突蛛 (Hu, 1984:200; Song, 1987:156)

Scotargus inerrans (O.P. Cambridge, 1884:)

棲 息：棉田。

捕 食 性。

分 佈：青海、新疆、內蒙古、吉林。

Ummeliata angulitimes Zhu et Wen 角溝瘤胸蛛 (He, et al., 1991:129)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ummeliata insecticeps Boesenberg et Strand 食蟲溝瘤蛛 (Dai, 1999, 21(4):166; He, et al., 1991:129; Wu et al., 1991:28; Yang et al., 1990:109; Zhu, 1994, 16(1):28-35)

=*Oedothorax insecticeps* Oi

別 名：*食蟲瘤胸蛛*。

棲 息：稻田、棉田、茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶)

稻飛蝨

稻葉蟬

稻田蚜蟲

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(低齡幼蟲)

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(蟻螟)

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(蟻螟)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、吉林。

Mimetidae 擬態蛛科

Mimetus sinicus Song et Zhu 中華擬態蛛 (Song et Zhu, 1993:421)

Mimetus sinicus Song et Zhu, 1993:421-422.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Mimetus testaceus Yaginuma 磚紅擬態蛛 (Song et Zhu, 1993:422)

Mimetus testaceus Yaginuma, 1960:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣東、貴州；朝鮮。

Agelenidae 漏斗蛛科

Agelena difficilis Fox 機敏漏斗蛛 (ASZI, 1987, 2:860; Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:138; He, et al., 1991:129; Hu, 1984:202; Shu et Yu, 1985:93; Song, 1987:189; Tang et al., 1995, 17(4):168; Yan et Wang, 1987:16; Zhang et Li, 1982:228; Zhao, 1984:4)
Agelena difficilis Fox, 1937:
棲 息：茶、桑、桃、板栗、果園、玉米、高粱、大豆、水稻、棉花、茶園、麻類、薔薇、梔子花、薔薇、枸骨、水杉、劍麻、女貞、冬青、松、柏、木槿、竹林等植物上；在葉間把幾片葉子拉攏結漏斗網。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
褐稻蝨
白背飛蝨
黑尾葉蟬
棉二點葉蟬
茶蚜
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻
棉鈴蟲
豆莢螟
地老虎
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)
尺蠖、袋蛾、刺蛾
蟬、蚊、蠅、蝗蟲、蟻、蜂
龜紋瓢蟲
草蛉、薊馬、蜻蜓等。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、遼寧、吉林。

Agelena injuria Fox 怒漏斗蛛 (Hu, 1984:206)
Agelena injuria Fox, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Agelena labyrinthica (Clerck) 迷宮漏斗蛛 (ASZI, 1987, 2:860; Dai, 1999, 21(4):166; Feng, 1990:139; He, et al.,

1991:129; Hu, 1984:203; Lu et al., 1986:63; Song, 1987:190; Sun et al., 1980(4):23; Xie et al., 1999, 21(2):86; Zhang, 1983:30; Zhang et al., 1994, 16(1):12; Zhao, 1984:4)

Agelena labyrinthica (Clerck; 1758:)

棲 息：菜園、灌木叢、草叢、茶園、果園、柑橘園、棉花、高梁、玉米、稻株、綠籬或雜草叢中張漏斗網。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
稻葉蟬
稻飛蝨
Brevicoryne brassicae 菜蚜(甘藍蚜)
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Myzus persicae 桃蚜
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
瓜野螟
豆野螟
菜青蟲
燈蛾(幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

藥 用：夏季捕捉，全體鮮用。有解毒之功，治療疔腫、惡瘡。外用適量。

Agelena limbata Thorell 緣漏斗蛛 (Feng, 1990:140; He, et al., 1991:130; Hu, 1984:205)

Agelena limbata Thorell, 1879:

別 名：*紋邊漏斗蛛*。

棲 息：多于稻叢或山地林叢及桃、李、荔枝、柑橘、檬果果園張漏斗網。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、安徽、湖北。

Agelena micropunctulata Wang 小斑漏斗蛛 (Wang, 1992:288)

Agelena micropunctulata Wang, 1992:288-289.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：福建(三港)。

Agelena opulenta (L. Koch) 華麗漏斗蛛 (He, et al., 1991:130; Hu, 1984:205)

Agelena opulenta (L. Koch, 1878:)

別 名：*豐富漏斗蛛*。

棲 息：稻田、大豆田。

捕 食：稻蝨
葉蟬。

分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、內蒙古、吉林。

Agelena secsuensis (Lendl) 四川漏斗蛛 (Hu, 1984:206)

Agelena secsuensis (Lendl, 1899:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Agelena similis Keyserling 類漏斗蛛 (Hu, 1984:206)

Agelena similis Keyserling, 1863:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川、甘肅。

Agenela triangulata Wang 三角漏斗蛛 (Wang, 1992:287)

Agenela triangulata Wang, 1992:187-288.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Agenela sp. 漏斗蛛 (Dai, 1999, 21(4):166)

棲 息：茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。

分 佈：貴州。

Cicurina anhuiensis Chen 安徽洞葉蛛 (Chen, 1986:160)

Cicurina anhuiensis Chen, 1986:160-162.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：安徽(屯溪)。

Cicurina eburnata Wang 象牙蟋蛛 (Wang, 1994:289)

Cicurina eburnata Wang, 1994:289-290.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北(大巴山)。

Coelotes baccatus Wang 珍珠隙蛛 (Wang, 1994:286)

Coelotes baccatus Wang, 1994:286-287.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Coelotes calcariformis Wang 距形隙蛛 (Wang, 1994:287)

Coelotes calcariformis Wang, 1994:287-289.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北(大巴山)。

Coelotes exitialis L. Koch 黑隙蛛 (He, et al., 1991:130; Zhang, 1983:30)

棲 息：菜園。

捕 食 性。

分 佈：江蘇、湖北。

Coelotes luctuosus L. Koch 陰暗隙蛛 (Dai, 1997, 19(1):43; Feng, 1990:141; He, et al., 1991:130; Song, 1987:191)

Coelotes luctuosus L. Koch, 1878:

別 名：*彩帶漏斗蛛*，*陰暗隙蛛*。

棲 息：稻田、堤坡、斜坡石縫、土縫、樹根、果園草叢等處的洞隙中結漏斗網。

捕 食：水稻鱗翅目成蟲。

分 佈：福建、湖南、貴州，四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、山東、北京。

Coelotes luniformis Zhu et Wang 月形隙蛛 (Zhu et Wang, 1994:38)

Coelotes luniformis Zhu et Wang, 1994:38-39.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南(下關)。

Coelotes modestus Simon 平靜隙蛛 (Song, 1987:192)

Coelotes modestus Simon, 1880:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河南、河北。

Coelotes nariceus Zhu et Wang 長鼻隙蛛 (Zhu et Wang, 1994:41)

Coelotes nariceus Zhu et Wang, 1994:41-42.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：吉林(長白山、大石頭六場)。

Coelotes palinitropus Zhu et Wang 迴彎隙蛛 (Zhu et Wang, 1994:42)

Coelotes palinitropus Zhu et Wang, 1994:42-43.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：海南(尖峰嶺)。

Coelotes plancyi Simon 普氏隙蛛 (Song, 1987:194)

Coelotes plancyi Simon, 1880:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Coelotes spinivulva Simon 刺瓣隙蛛 (Feng, 1990:142; He, et al., 1991:130; Song, 1987:194)
Coelotes spinivulva Simon, 1880:
棲 息：果園、茶園、住宅周圍斜坡石縫、土縫、灌木上、樹根等處的洞隙中結漏斗網。
捕 食 性。
分 佈：湖南、陝西、河北、北京、吉林。

Coelotes streptus Zhu et Wang 彎曲隙蛛 (Zhu et Wang, 1994:40)
Coelotes streptus Zhu et Wang, 1994:40-41.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川(康定)。

Coelotes subluctuosus Zhu et Wang 似陰暗隙蛛 (Zhu et Wang, 1994:39)
Coelotes subluctuosus Zhu et Wang, 1994:39-40.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山東(泰山)。

Coelotes syzygiatus Zhu et Wang 雙輪隙蛛 (Zhu et Wang, 1994:37)
Coelotes syzygiatus Zhu et Wang, 1994:37-38.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川(峨嵋山)。

Coelotes triatus Zhu et Wang 三分隙蛛 (Zhu et Wang, 1994:42)
Coelotes triatus Zhu et Wang, 1994:42.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京(香山)。

Coelotes sp. 隙蛛 (Dai, 1999, 21(4):166)
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州。

Coras luctuosus (L. Koch) 陰暗貪食蛛 (Hu, 1984:206)
Coras luctuosus (L. Koch, 1878:)

棲 息：多在山坡草地石縫樹根等處的洞隙農田灌區的堤坡以及果園的草叢中結漏斗網。
捕 食 性。
分 佈：貴州、河南、陝西、山東、遼寧。

Tegenaria aculeata Wang 刺隅蛛 (Wang, 1992:286)

Tegenaria aculeata Wang, 1992:286-287.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西、湖南。

Tegenaria domestica (Clerk) 隅蛛 (Hu, 1984:207; Song, 1987:195)

Tegenaria domestica (Clerk, 1758:)
別 名：*家隅蛛*。
棲 息：屋角墻隅、住宅四周張三角形漏斗網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、內蒙古、遼寧。

Hahniidae 柵蛛科

Hahnia chaoyangensis Zhu et Zhu 朝陽柵蛛 (Hu, 1984:211)

Hahnia chaoyangensis Zhu et Zhu, 1983:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Hahnia corticicola Boesenberg et Strand 栓柵蛛 (He, et al., 1991:130; Hu, 1984:209; Li et al., 1983:112; Song, 1987: 198; Yin et Wang, 1983:141)

Hahnia corticicola Boesenberg et Strant, 1906:
棲 息：花生田、草叢和田邊雜草間、田圃、草地的地表凹陷處,或旱田的土塊間張小柵網。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、四川、浙江、湖北、河南、山東、河北、青海。

Hahnia maginii Brignoli 馬氏柵蛛 (He, et al., 1991:130; Song, 1987:199; Yu et al., 1984:11)

Hahnia maginii Brignoli, 1976:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川(成都)。

Hahnia ovata Song et Zheng 卵形柵蛛 (Hu, 1984:210; Song, 1987:200; Song et Zheng, 1982:81; Zhang et Wang, 1988:205)

Hahnia ovata Song et Zheng, 1982:81.
棲 息：稻田中。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江。

Hahnia pyriformis Yin et Wang 梨形柵蛛 (Song, 1987:200)
Hahnia pyriformis Yin et Wang, 1984:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Hahnia thortoni Brignoli 索氏柵蛛 (Song, 1987:201)
Hahnia thortoni Brignoli, 1982:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：香港。

Hahnia yueluensis Yin et Wang 岳麓柵蛛 (He, et al., 1991:130; Hu, 1984:211; Song, 1987:202; Yin et Wang, 1983:143)
Hahnia yueluensis Yin et Wang, 1983:143-144.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川。

Hahnia zhejiangensis Song et Zheng 浙江柵蛛 (Chen, 1992:69; He et al., 1991:130; Feng, 1990:144; Hu, 1984:210; Song, 1987:203; Song et Zheng, 1982:81; Yin et Wang, 1983:141)
Hahnia zhejiangensis Song et Zheng, 1982:81.
棲 息：稻田、茶園、果園地面凹洼處張精細頁狀小網，行動迅速。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、安徽。

Hahnia sp. 柵蛛 (Zhao, 1984:4)
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Hahnia sp. 柵蛛 (Dai, 1999, 21(4):167)
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州。

Neoantistea quelpartensis Paik 濟州新安蛛 (Song et al, 1994:168)
Neoantistea quelpartensis Paik, 1958:285-288.

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：遼寧；朝鮮、日本。

Liocranidae 光盔蛛科

Phrurolithus festivus (C. L. Koch) 悅目刺足蛛 (Song et al., 1994:168)
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：遼寧；歐洲。

Phrurolithus liaoningensis Song et al. 遼寧刺足蛛 (Song et al., 1994:169)
Phrurolithus liaoningensis Song et al., 1994:169-170.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Phrurolithus pennatus Yaginuma 羽刺足蛛 (Song et al., 1994:170)
Phrurolithus pennatus Yaginuma, 1967:102-103.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：遼寧；朝鮮、日本。

Argyronetidae 水蛛科

Argyroneta aquatica (Clerck) 水蛛 (Hu, 1984:212; Song, 1987:197)
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757:)
棲 息：不居陸地而在淡水中結鐘形網于水草間。
捕 食 性。
分 佈：甘肅、吉林。

Lycosidae 狼蛛科

(Tang et Zhang, 1992, 19(1)1-6; Yan et Mei, 1996, 22(5):24-25; Zhang, 1993:139-145)

Acantholycosa triangulata Yu et Song 三角刺狼蛛 (Yu et Song, 1988:241)
Acantholycosa triangulata Yu et Song, 1988:241-242.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆(巴里坤)。

Alopecosa albostriata (Grube) 白紋舞蛛 (Song, 1987:213)
Alopecosa albostriata (Grube, 1861:)

=*Lycosa erudita* Simon, 1880:102-103.
=*Lycosa erudita mongolica* Schenkel, 1953:71-74.
=*Tarentula paraalbostriata* Schenkel, 1963:297-298.
=*Tarentula wiehleri* Schenkel, 1963:325-326.
=*Tarentula fabifer* Schenkel, 1963:328-330.
=*Tarentula luteocuneata* Schenkel, 1963:330-331.
棲 息：農田和果園。
捕 食 性。
分 佈：山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古。

Alopecosa cinnameopilosa (Schenkel) 細紋舞蛛 (ASZI, 1987, 2:863; Feng et al., 1994, 10(3):142; He, et al., 1991:130; Song, 1987: 215)
Tarentula cinnameopilosa Schenkel, 1963:333-334.
棲 息：農田中。
捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗(蝻)。
分 佈：湖南、安徽；河南、山西、河北、內蒙古。

Alopecosa fenestrata Schenkel 壯舞蛛 (Dai, 1997, 19(1):44)
棲 息：茶園地面。
捕 食：各種害蟲。
分 佈：貴州。

Alopecosa fenestrata pseudobarbipes (Schenkel) 狹孔雙窗舞蛛 (Zhao, 1984:4)
Alopecosa fenestrata pseudobarbipes (Schenkel, 1963:)
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：河南。

Alopecosa licenti (Schenkel) 雙窗舞蛛 (Song, 1987:216)
Tatentula licenti Schenkel, 1953:77-78.
=*Tarentula bipennis* Schenkel, 1953:77.
=*Tarentula argentata* Schenkel, 1963:306-308.
=*Tarentula fenestrata* Schenkel, 1963:311-312.
=*Tarentula fenestrata pseudobarbipes* Schenkel, 1963:312-313.
=*Tarentula davidi* Schenkel, 1963:313-315.
=*Tarentula orbiculata* Schenkel, 1963:315-316.
棲 息：菜地等旱田。
捕 食 性。
分 佈：山東、山西、河北、內蒙古、吉林。

Alopecosa spinata Yu et Song 針舞蛛 (Yu et Song, 1988:234)
Alopecosa spinata Yu et Song, 1988:234-235.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川。

Arctosa amylaceoides Schenkel 粉色熊蛛 (Hu, 1984:216)
Arctosa amylaceoides Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Arctosa binalis Yu et Song 雙突熊蛛 (Yu et Song, 1988:236)
Arctosa binalis Yu et Song, 1988:236-237.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、江西。

Arctosa cervina Schenkel 鹿熊蛛 (ASZI, 1987, 2:862; He, et al., 1991:130; Hu, 1984:215; Song, 1982:75; 1987: 218; Zhao, 1984:4)
Arctosa cervina Schenkel, 1936:191-194.
別 名：*角熊蛛*。
棲 息：旱田、棉田。
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、河南、陝西、山東、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、新疆。

Arctosa gertschi Fox 吉氏熊蛛 (Hu, 1984:216)
Arctosa gertschi Fox, 1935:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Arctosa gobiensis Schenkel 沙漠熊蛛(Hu, 1984:216)
Arctosa gobiensis Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Arctosa laminata Yu et Song 片熊蛛 (Yu et Song, 1988:235)
Arctosa laminata Yu et Song, 1988:235-236.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、安徽。

Arctosa leucocephala (L. Koch) 白熊蛛 (Hu, 1984:216)
Arctosa leucocephala (L. Koch, 1879:)
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：新疆。

Arctosa mongolica Schenkel 蒙古熊蛛 (Hu, 1984:216)

Arctosa mongolica Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆、黑龍江。

Arctosa pichoni Schenkel 皮氏熊蛛 (Hu, 1984:216)

Arctosa pichoni Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Arctosa recurva Yu et Song 後凹熊蛛 (Yu et Song, 1988:237)

Arctosa recurva Yu et Song, 1988:237-238.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：浙江、安徽。

Arctosa serrulata Mao et Song 鋸齒熊蛛 (Mao et Song, 1985:263; Song, 1987:219)

Arctosa serrulata Mao et Song, 1985:263-264.

棲 息：農田。

捕 食 性。

分 佈：河南(信陽)。

Arctosa schensiensis Schenkel 山西熊蛛 (Hu, 1984:216)

Arctosa schensiensis Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Arctosa vaginalis Yu et Song 鞘熊蛛 (Yu et Song, 1988:239)

Arctosa vaginalis Yu et Song, 1988:239-240.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南(下關)。

Arctosa xunyangensis Wang et Qiu 旬陽熊蛛 (Wang et Qiu, 1992:424)

Arctosa xunyangensis Wang et Qiu, 1992:424-426.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：陝西(旬陽壩)。

Evippa potanini Schenkel 波氏艾狼蛛 (Hu, 1984:216; Song, 1987:220; Zhao, 1984:4)

Evippa potanini Schenkel, 1963:

棲 息：棉田、旱田、草原或牧場,林間、果園的草叢間。

捕 食 性。

分 佈：四川、河南、陝西、青海、新疆。

Hippasa holmerae Thorell (Feng, 1990:145; He, et al., 1991:131; Hu, 1984:219; Song, 1987: 221)

Hippasa holmerae Thorell, 1895:

=*Hippasa jaihenensis* Yin et Wang, 1980:55-56.

別 名：*加禾馬蛛*。

棲 息：果園、草叢或水稻田埂草張結橢圓形漏斗網。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西。

Hippasa lingxianensis Yin et Wang 鄠縣馬蛛 (He, et al., 1991:131; Hu, 1984:220; Song, 1987:222)

Hippasa lingxianensis Yin et Wang, 1980:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣西。

Hippasa lycosina Pocock 狼馬蛛 (Feng, 1990:146; Hu, 1984:221; Song, 1987:223)

Hippasa lycosina Pocock, 1900:

=*Hippasa menglanensis* Yin et Wang, 1980:56-57.

=*Hippasa mahabaleshwarensis* Tikader et Malhotra, 1980:285-287.

別 名：*孟臘馬蛛*。

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南(孟臘)。

Hygrolycosa alpigena Yu et Song 高山潮狼蛛 (Yu et Song, 1988:240)

Hygrolycosa alpigena Yu et Song, 1988:240-241.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川(甘孜州折多山)。

Lycosa atropos L. Koch 瘦狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa atropos L. Koch, 1877:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣東、四川。

Lycosa auribrachialis Schenkel 黑腹狼蛛 (ASZI, 1987, 2:862; Chai et al., 1991:91; Dong, 1988:85; He, et al., 1991:131; Li et al., 1983:112; Song, 1987:224; Zhang, 1983:30; Zhang et Li, 1982:228)

Lycosa auribrachialis Schenkel, 1936:194-197.
棲 息：稻田、菜園、花生田、旱田。
捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻
稻飛蝨
稻葉蟬
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：福建、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、湖北、河南、山東、山西、河北、青海、寧夏、新疆。

Lycosa auripilosa Schenkel 金色狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa auripilosa Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Lycosa birmanica (Simon) 奔狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa birmanica (Simon, 1884:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東(汕頭)。

Lycosa blanda (C. L. Koch) 布蘭狼蛛 (Hu, 1984:222)
Lycosa blanda (C. L. Koch)
棲 息：麥田棉田高梁玉米等旱田;亦見于葡萄園。
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Lycosa canescens Schenkel 灰白狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa canescens Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(武昌)。

Lycosa champini Fox 柴氏狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa champini Fox, 1935:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lycosa chengtu Fox 塵狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa chengtu Fox, 1935:
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：四川。

Lycosa cinnameovittata Schenkel 黃褐狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa cinnameovittata Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Lycosa clerki Hogg 克氏狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa clerki Hogg, 1912:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：江西。

Lycosa coelestris L. Koch 黑腹狼蛛 (Hu, 1984:223; Wu-xing, 1979:25)

Lycosa coelestris L. Koch, 1877:

棲 息：水田旱田的作物間, 山地草叢亦可見。

捕 食 性。

分 佈：廣東、貴州、四川、浙江、河南、山東、山西、寧夏、新疆。

Lycosa condolens Cambridge 隱斑狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa condolens Cambridge, 1885:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Lycosa dimideata virgata Kul 細長地狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa dimideata virgata Kul, 1901:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Lycosa erudita Simon 食蟲狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa erudita Simon, 1880:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：北京。

Lycosa erudita mongolica Schenkel 蒙古食蟲狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa erudita mongolica Schenkel, 1953:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Lycosa flavida Cambridge 黃色狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa flavida Cambridge, 1885:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Lycosa formosana Saito 臺灣狼蛛 (Hu, 1984:224)

Lycosa formosana Saito

棲 息：草原

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Lycosa fortunata Cambridge 凶狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa fortunata Cambridge, 1885:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Lycosa grahami Fox 灰色狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa grahami Fox, 1935:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Lycosa hotingchiehi Schenkel 侯氏狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa hotingchiehi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Lycosa intermixta Schenkel 雜狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa intermixta Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Lycosa kiangsiensis Schenkel 江西狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa kiangsiensis Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：江西。

Lycosa labialis Mao et Song 唇形狼蛛 (Mao et Song, 1985:264; Song, 1987:225)
Lycosa labialis Mao et Song, 1985:264-266.
棲 息：農田。
捕 食 性。
分 佈：河南(鄭州)。

Lycosa melica Fox 覓狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa melica Fox, 1937:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Lycosa ordosa Hogg 奧陶狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa ordosa Hogg, 1912:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Lycosa orientalis Kroneberg 東方狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa orientalis Kroneberg, 1875:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Lycosa parricida Karsch 暴狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa parricida Karsch, 1881:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Lycosa passibilis Cambridge 惡狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa passibilis Cambridge, 1885:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Lycosa pavlovi Schenkel 巴氏狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa pavlovi Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：天津。

Lycosa phipsoni Pocock 黑底狼蛛 (Hu, 1984:224)

Lycosa phipsoni Pocock, 1899:
棲 息：熱帶平原及山地.喜乾燥,居石塊下或土坡的裂縫。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Lycosa pseudoannulata (Boesenberg et Strand) 擬環紋狼蛛 (ASZI, 1987, 2:861; Chen, 1996:32; Chen et Chiu, 1979:285-290; Chiu et Chen, 1981:270-276; Chiu et Cheng, 1975:451; 1976:254-260; Chu, Ho et Chen, 1975:424-430; 1976:42-57; Chu et Wang, 1972:169-174; 1973:13-20; Chu et al., 1976:377-390; Chu et al., 1977:1-12; Dong, 1988:85; Feng, 1990:148; Hu, 1984:225; Hunan, 1987:70-73; Hunan, Teachers College et Xiang-yang, 1980(1):24; Ku et Wang, 1978:299; Li et al., 1989, 16(1):1-6; Lin et Qian, 1981(1-2):91; Luo et Zhuo, 1986:74; Qi et al., 1990, 17(1):29-34; Shi et al., 1989-90:88; Song, 1987:227; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:39; Tang et al., 1983:207-214; Wang, 1985:35; 187; Wang et Zhou, 1982:69-79; 1984:62-67; Wang et al., 1989:125; Wu, 1986:230-231; Wu-xing, 1979:25; Xu et al., 1984:29; Xu et al., 1987:140; Ye et Wang, 1987:11; Yin, 1991:179; Zhang, 1983:30; Zhang et He, 1981, 8(2):102; Zhao, 1984:4; Zhong, 1983:158; Zhou, 1986:155; Zhou et Chen, 1986, 2(1):2-9; Zhou, 1989, 16(1):7-11; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249)
Tarentula pseudoannulata Boesenberg et Strand, 1906:
=*Lycosa pseudoterricola* Schenkel, 1936:199-201.
別 名：*六點狼蛛*。
棲 息：稻田(優勢種)、橘園、棉田、麥田、菜田。
捕 食：稻蝗
蝗蝻
螻蛄
Odentotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻
Nilaparvata lugens Stål 褐飛蝨
Sogatella furcifera 白背飛蝨
Perkinsiella sinensis Kirhaldy 飛蝨
Nisia atrovenosa Lethiery 粉飛蝨
大白翅葉蟬
Cicadella spp. 大葉蟬
Eucanthus spp. 冠葉蟬
Nephotettix nigropictus (Stål) 原黑尾葉蟬
Inazuma dorsalis 電光葉蟬
Nirvana spp. 細匙葉蟬
Cicadula fasciifrons Stål 一點葉蟬
Cicadula sexnotata Fallen 六點葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(成蟲、幼蟲)
三化螟(成蟲)
萍螟
萍灰螟
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(成蟲、幼蟲)
Psilopa spp. 黑渚蠅(稻田)Ephydridae
Scatella spp. 渚蠅(稻田)Ephydridae
Ephydra spp. 渚蠅(稻田)Ephydridae
Hydrellia spp. 黑稻稈蠅(稻田)Ephydridae

Scaptomyza pallida Zettrestedt 田果蠅(稻田)Drosophilidae
Culicides spp. 蠓(稻田)Ceratopogoniidae
Chironomus spp. 搖蚊(稻田)Chironomidae
Sepedon spp. (稻田)Sciomyzidae
Culex spp. 蚊(稻田)Culicidae。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧、吉林；日本、泰國。

Lycosa pseudoterricola Schenkel 擬陸棲狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa pseudoterricola Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lycosa ruberta Schenkel 赤狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa ruberta Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：青海。

Lycosa rufisternum Schenkel 赤胸狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa rufisternum Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Lycosa russea Schenkel 淡紅狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa russea Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Lycosa sepia (Donitz et Strand) 墨色狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa sepia (Donitz et Strand, 1906:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：東北。

Lycosa shansia (Hogg) 山西狼蛛 (Feng, 1990:149)

Lycosa shansia (Hogg, 1912:)
棲 息：穴居性，棉田、麥田、玉米地及不積水田洼、溝渠上挖穴築巢。
捕 食：蛾類、葉蟬、飛蝨、蝗蟲、甲蟲等，尤在小地老虎、金龜交尾產卵時最易被

捕食。
分 佈：陝西、河北、天津、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林。

Lycosa sinensis Schenkel 中華狼蛛 (Dong, 1987, 14(1):28, 64; Dong, 1988:85; Dong, 1990:167-168; Dong, 1991:88; Hu, 1984:226; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Song, 1987:229)

Lycosa sinensis Schenkel, 1953:75-77.
=*Lycosa* (*Hogna*) *immanis* Schenkel, 1963:347-350. (*nec* Koch, 1879)
棲 息：穴居性狼蛛,多在平原地區或山區平的棉田、大豆田、蕃薯田、早春麥田、玉米田及其他大田,離村莊較遠的大洼而不積水的地塊、田畦、溝渠上及草原上皆能挖穴築室。
捕 食：甲蟲、夜蛾類、蠅類、葉蟬、飛蝨、蝗蟲等，尤其在小地老虎、金龜子交尾期間, 最易被中華狼蛛捕食。
分 佈：河南、山東、河北、天津、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Lycosa singoriensis (Laxmann) 穴居狼蛛 (Feng, 1990:150; Hu, 1984:228)

Lycosa singoriensis (Laxmann, 1769:)
棲 息：草原、荒漠、半荒漠和森林區，丘陵地帶的經濟作物區。洞穴建造在農田周圍的溝渠畦溝、村落的舊墻、山坡向陽面、小路旁及牧區草原地下水位高的濕潤土壤中。
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古。
附 註：此蛛有劇毒，被咬治療參考(Feng, 1990:150)

Lycosa singoriensis gobiensis Schenkel 古穴居狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa singoriensis gobiensis Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Lycosa subbirmanica Strand 亞紅狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa subbirmanica Strand, 1909:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建。

Lycosa subcoelestris Fox 亞黑腹狼蛛 (Hu, 1984:231)

Lycosa subcoelestris Fox, 1935:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lycosa suzukii Yaginuma 黑斑灰狼蛛 (He, et al., 1991:131; Hu, 1984:231)

Lycosa suzukii Yaginuma, 1960:

別 名：*蘇氏狼蛛*。
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東、湖南、湖北。

Lycosa takahashii Saito 沙地狼蛛 (Hu, 1984:230)
Lycosa takahashii Saito
棲 息：多游蕩于山麓及沙地。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Lycosa trifoveata Strand 三凹狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa trifoveata Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建。

Lycosa ursina Schenkel 熊狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa ursina Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅。

Lycosa velox Kroneborg 急速狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa velox Kroneborg, 1875:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Lycosa wuchangensis Schenkel 武昌狼蛛 (Hu, 1984:231)
Lycosa wuchangensis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Lycosa wulsini Fox 烏氏狼蛛 (Hu, 1984:232)
Lycosa wulsini Fox, 1935:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lycosa yaginumai Song et Zhang 八氏狼蛛 (Feng, 1990:147)
Lycosa yaginumai Song et Zhang, 1985:

棲 息：平原草地、山林草叢；茶園、果園、菜地、稻田中較少。
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、浙江、山東、山西、河北、吉林。

Pardosa agrestis Westring 田野豹蛛 (Hu, 1984:241; Zhao, 1984:4)
Pardosa agrestis Westring, 1861:
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：河南、甘肅、內蒙古。

Pardosa albigena Schenkel 白膝豹蛛 (Hu, 1984:241)
Pardosa albigena Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Pardosa algoides Schenkel 阿爾豹蛛 (Hu, 1984:232; Song et Haupt, 1996:311)
Pardosa algoides Schenkel, 1963:
棲 息：棉田及其他旱田。
捕 食 性。
分 佈：甘肅、青海、新疆。

Pardosa ancorifera Schenkel 曲形豹蛛 (Hu, 1984:241)
Pardosa ancorifera Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Pardosa armillata Schenkel 環豹蛛 (He, et al., 1991:131; Hu, 1984:233)
Pardosa armillata Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、四川。

Pardosa astrigera L. Koch 星豹蛛 (Dai, 1999, 21(4):167; Dong, 1987, 14(1):28, 64; Dong, 1988:85; Dong, 1994, 16(3):134-135; Feng, 1990:153; He, et al., 1991:131; Hu, 1984:234; Lei et al., 1991:71-74; Li et al., 1983:112; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Song, 1987:230; Song et al., 1997:1719; Su, 1997, 19(4):182; Wu et Ji, 1989:151-155; Wu et al., 1991:28; Wu et al., 1991:101; Xie et al., 1999, 21(2):87; Zhang, 1998, 14(2):47; Zhang et al., 1994, 16(1):11; 1995:33-36; Zhao, 1984:4; Zhao et al., 1989:110-115)
Pardosa astrigera L. Koch, 1877:
=*Pardos T-iinsignita* Boesenberg et Strand
別 名：*丁紋(狼)蛛，黑豹蛛*。
棲 息：棉田、旱田作物地面，菜園、菜地、花生田、麥田、玉米田、甘蔗、茶園、柑橘、蘋果、梨、龍眼等果園中較多。有趨光性。南方稻區以及山地、果園、

牧區草原或其他經濟作物區都可見。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
稻葉蟬
稻飛蝨
Schizaphis grminum 麥蚜
棉蚜
菜青蟲
Spototera exigua 甜菜夜蛾
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
棉鈴蟲
小造橋蟲
潛葉蠅
麥稈蠅。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯、朝鮮、日本、尼泊爾。

Pardosa atronigra Song 暗黑豹蛛 (Song et Haupt, 1996:312)
Pardosa aatronigra Song, 1996:
捕 食 性。
分 佈：青海、新疆。

Pardosa baxianensis Wang et Song 拔仙豹蛛 (Wang et Song, 1993:152)
Pardosa baxianensis Wang et Song, 1993:152-153.
捕 食 性。
分 佈：陝西(眉縣太白山頂峰拔仙臺)。

Pardosa buttnen 梭斑豹蛛 (Sun et al., 1980(4):23)
棲 息：(稻田)。
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Pardosa cervina Schenke 紅灰豹蛛 (Hu, 1984:241)
Pardosa cervina Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Pardosa cervinopilosa Schenkel 紅甲豹蛛 (Hu, 1984:241)
Pardosa cervinopilosa Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：四川。

Pardosa chapini (Fox) 蔡氏豹蛛 (Song, 1987:246; Song et al., 1997:1720)

Pardosa chapini (Fox, 1935:)

別 名：*查平豹蛛*。

棲 息：山間溪溝邊卵石灘中，能在水面快速行動。

捕 食 性。

分 佈：湖南、西藏、四川、湖北、河南、陝西、山東、北京、甘肅、內蒙古。

Pardosa chinnophila L. Koch 丁紋豹蛛 (ASZI, 1987, 2:863; Hu, 1984:241; Xie, 1990:137-138;)

Pardosa chinnophila L. Koch

棲 息：稻田、林木間。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬

Coleophora laricella Hübner 落葉松鞘蛾。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山西、河北、甘肅、遼寧、吉林；日本。

Pardosa credula (Cambridge) 克里豹蛛 (Hu, 1984:241)

Pardosa credula (Cambridge, 1885:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅、新疆。

Pardosa crucifera Schenkel 十字豹蛛 (Hu, 1984:241)

Pardosa crucifera Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：山西。

Pardosa davidi Schenkel 大衛氏豹蛛 (Hu, 1984:235)

Pardosa davidi Schenkel, 1963:

棲 息：麥田、玉米地或棉田。

捕 食 性。

分 佈：江西、新疆。

Pardosa falcata Schenkel 鐮豹蛛 (ASZI, 1987, 2:864; Hu, 1984:238; Song, 1982:77; 1987:231; Song et Haupt, 1996:312; Zhao, 1984:4)

Pardosa falcata Schenkel, 1963:363-365.

=*Pardosa wagleri* Hu et Wu, 1989:229-231. (*nec* Hahn, 1822)

棲 息：棉田、農田。

捕 食 性。

分 佈：河南、山東、河北、北京、甘肅、新疆、吉林。

Pardosa finsignita T紋豹蛛 (Nan et al., 1987:125; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97)
棲 息：棉田。
捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜。
分 佈：湖北、河北。

Pardosa haupti Song 豪氏豹蛛 (Song et Haupt, 1996:312)
Pardosa haupti Song, 1996:
捕 食 性。
分 佈：青海、新疆。

Pardosa hedini Schenkel 赫定豹蛛 (ASZI, 1987, 2:864; Feng, 1990:151; He, et al., 1991:131; Hu, 1984:236; Song, 1987:232; Song et Feng, 1982:450; Song et al., 1997:1720; Zhao, 1984:4)
Pardosa hedini Schenkel, 1936:
棲 息：棉田、多見于山區平原的旱田地面。
捕 食 性。
分 佈：福建、貴州、雲南、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Pardosa hohxilensis Song 可可西里豹蛛 (Song et Haupt, 1996:312)
捕 食 性。
分 佈：青海。

Pardosa hummeli Schenkel 胡氏豹蛛 (Hu, 1984:241)
Pardosa hummeli Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Pardosa isago Tanaka 河岸豹蛛 (He, et al., 1991:131; Hu, 1984:238)
Pardosa isago Tanaka, 1977:
棲 息：稻田。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨。
分 佈：河南、陝西、河北、青海。

Pardosa italica 意大利豹蛛 (Liang et al., 1997, 24(3):193-198)
棲 息：麥田。
捕 食：*Diuraphis noxia* Mordvilko 麥雙尾蚜。
分 佈：新疆；南非、美國。

Pardosa kupupa (Tikader) 鏟豹蛛 (Song, 1987:236)
Pardosa kupupa (Tikader, 1970:)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏(吉隆)、四川。

Pardosa laciniata Song et Haupt 條裂豹蛛 (Song et Haupt, 1996:313)
Pardosa laciniata Song et Haupt, 1996:313.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Pardosa ladakhensis Tikader 拉達豹蛛 (Zhang, 1998, 14(2):47)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Pardosa laura Karsch 溝渠豹蛛 (ASZI, 1987, 2:865; Chai et al., 1991:91; Dai, 1999, 21(4):167; Feng, 1990:152; He, et al., 1991:131; Hu, 1984:238; Li et al., 1983:112; Lin et Qian, 1981(1-2):92; Song, 1987:233; Song et al., 1997:1721; Wu-xing, 1979:25; Zhang et Li, 1982:228)
Pardosa laura Karsch, 1879:
棲 息：稻田溝渠水邊，游獵于稻叢間、花生田、茶園。
捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻
Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
稻飛蝨
稻葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Pardosa licenti Schenkel 放蕩豹蛛 (Hu, 1984:241)
Pardosa licenti Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Pardosa lyrifera Schenkel 琴豹蛛 (Hu, 1984:241; Song et al., 1997:1722)
Pardosa lyrifera Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川、江蘇、安徽、河南、山西、河北、青海、甘肅、吉林；朝鮮、日本。

Pardosa mongolica Kulczy'nski 蒙古豹蛛 (Hu, 1984:239; Song, 1987:234; Song et Haupt, 1996:314)

Pardosa mongolica Kulczy'nski, 1901:346-348
=*Pardosa hummeli* Schenkel, 1936:299-301.
=*Pardosa chaffanjoni* Schenkel, 1963:372-372.
棲 息：旱田中。
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古、黑龍江。

Pardosa monticola (Clerck) 小丘豹蛛 (Hu, 1984:241)
Pardosa monticola (Clerck, 1757:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅、黑龍江。

Pardosa multivaga Simon 多斑豹蛛 (Hu, 1984:241; Song, 1987:235)
Pardosa multivaga Simon, 1880:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河北、北京。

Pardosa nebulosa (Thorell) 霧豹蛛 (Feng, 1990:154; Song, 1987:237; Sun et al., 1984:111)
Pardosa nebulosa (Thorell, 1872:)
=*Pardosa tschekiangensis* Schenkel, 1963:382-383.
=*Pardosa buttneri* Schenkel, 1963:384-385.
別 名：*浙江豹蛛*。
棲 息：游獵于稻田埂邊草叢或稻叢間、旱田中。
捕 食 性。
分 佈：廣東、貴州、湖南、浙江、河南、山東。

Pardosa oriens (Chamberlin) 東方豹蛛 (Song et al., 1997:1722)
Pardosa oriens (Chamberlin, 1924:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、廣東、雲南、西藏、浙江、湖北；日本。

Pardosa pacata Fox 攀豹蛛 (Hu, 1984:241)
Pardosa pacata Fox, 1937:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：香港。

Pardosa palavulua Song 鏟豹蛛 (Hu, 1984:240; Song, 1982:77)
Pardosa palavulua Song, 1982:77.
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：西藏(吉隆)。

Pardosa pseudoannulata (Boesenberg et Strand) 擬環紋豹蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:379; Chen et al., 1990:135; Dai, 1999, 21(4):167; He, et al., 1991: 131; Pang et al., 1998, 25(3):193-196; Pang et al., 1999, 15(1):31-34; Tang et al., 1983,5(4):207-214; Tang et al., 1995, 17(4):168; Tao et al., 1993, 15(4):167; Wang et al., 1982, 28(1):69-79; Xie et al., 1999, 21(2):87; Yang et al., 1990:109; Zhang, 1989, 8(1):24-28; Zhang et al., 1991, 13(1):5-10; 1994, 16(1):11; Zhang et al., 1997, 13(2):65-68; Zhou, 1989, 8(1):107-110; 1989, 16(1):7-11; Zhou et Chen, 1986, 2(1):2-9; Zhou et al., 1986, 2(1):2-9)

Tarantula pseudoannulata Boesenberg et Strand, 1906:319.

Pardosa pseudoannulata, Yaginuma, 1986:126.

別 名：*擬環紋狼蛛*。

棲 息：稻田、菜園、茶園。

捕 食：蝗蝻

Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻飛蝨

稻葉蟬

蚜蟲

Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟

豆野螟

菜螟

茄黃斑螟

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉

Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲

Mythimna separata (Walker) 粘蟲(初齡幼蟲)

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、天津；甘肅、新疆、黑龍江；朝鮮、日本、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、印度、孟加拉、尼泊爾。

Pardosa pseudochionophila Schenkel 擬雪豹蛛 (Hu, 1984:241)

Pardosa pseudochionophila Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：青海、甘肅。

Pardosa pseudoferruginea Schenkel 擬銹豹蛛 (Hu, 1984:241)

Pardosa pseudoferruginea Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Pardosa pulumipes Thorell 山地豹蛛 (Hu, 1984:241)

Pardosa pulumipes Thorell, 1875:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Pardosa roeweri Schenkel 勞氏豹蛛 (Hu, 1984:241)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Pardosa shansia Hogg 山西豹蛛 (Hu, 1984:241)

Pardosa shansia Hogg, 1912:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：山西。

Pardosa sowerbyi Hogg 宋氏豹蛛 (Hu, 1984:241)

Pardosa sowerbyi Hogg, 1912:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：山西。

Pardosa subanchoroides Wang et Song 擬錨豹蛛 (Wang et Song, 1993:153)

Pardosa subanchoroides Wang et Song, 1993:153-154.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：陝西(西眉縣太白山拔仙臺)。

Pardosa sumatrana (Thorell) (Barrion et Litsinger, 1995:382)

Lycosa sumatrana Thorell, 1890:136.

Pardosa sumatrana, Hogg, 1919:100.

=*Lycosa arorai* Dyal, 1935:140.

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：日本、菲律賓、印尼、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

Pardosa taxkorgan Song et Haupt 王城豹蛛 (Song et Haupt, 1996:314)

Pardosa taxkorgan Song et Haupt, 1996:314.

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Pardosa tesquorumoides Song et Yu 似荒漠豹蛛 (Song et Haupt, 1996:315)

Pardosa tesquorumoides Song et Yu, 1990:

捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅、青海、新疆、內蒙古。

Pardosa T-insignita Boesenberg et Strand 丁紋狼蛛 (Cao, 1986:182; Dong, 1984:91; Dong et Wang, 1991:66-70; Li, 1981(1-2):84; Li et al., 1983:112; Lin et Qian, 1981(1-2):91; Niu et Liu, 1981(3):22; Shi, 1980[ed.]:128; Sun et al., 1980(4):23; Wu et Chen, 1980(4):47; Wu-xing, 1979:25; Zhang, 1983:30; Zhang et Li, 1982:228; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zhao, 1984:4; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)

Pardosa T-insignita Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：棉田、麥田、菜園、花生田。
捕 食：*Adelphocoris suturalis* 中黑盲蝽
Lygus llucorum 綠盲蝽
棉蚜
棉葉蟬
小造橋蟲
棉鈴蟲
Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻。
分 佈：江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林。

Pardosa tschekiangensis Schenkel 浙江豹蛛 (ASZI, 1987, 2:865; He, et al., 1991:131; Hu, 1984:240; Zhang, 1983:30; Zhao, 1984:4)

Pardosa tschekiangensis Schenkel, 1963:
=*Pardosa buteneri* Schenkel, 1963:
別 名：*棱斑豹蛛*。
棲 息：稻田、菜園、棉田、旱田。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東。

Pardosa uncata Schenkel 鈎豹蛛 (Hu, 1984:242)

Pardosa uncata Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Pardosa uncifera Schenkel 鈎形豹蛛 (Hu, 1984:242)

Pardosa uncifera Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Pardosa velox Kroneberg 急速豹蛛 (Hu, 1984:242)

Pardosa velox Kroneberg, 1875:

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Pardosa venatrix (Lucas) 脈絡豹蛛 (Song et al., 1997:1723)

Pardosa venatrix (Lucas, 1846:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、四川、浙江、湖北；俄羅斯、日本、印尼、緬甸、尼泊爾、中亞、阿拉伯地區、北非、西班牙。

Pardosa vulvitecta Schenkel 滾豹蛛 (Hu, 1984:242)

Pardosa vulvitecta Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Pardosa X-notata Schenkel X 紋豹蛛 (Hu, 1984:242)

Pardosa X-notata Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅。

Pardosa zhangi Song et Haupt 張氏豹蛛 (Song et Haupt, 1996:312)

Pardosa zhangi Song et Haupt, 1996:312-313.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Pardosa zuojiani Song et Haupt 祚建豹蛛 (Song et Haupt, 1996:314)

Pardosa zuojiani Song et Haupt, 1996:314.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Pirata clercki (Boesenberg et Strand) 克氏水狼蛛 (He, et al., 1991:132; Hu, 1984:242; Wu-xing, 1979:26; Zhang et al., 1994, 16(1):11; Zhao, 1984 4)

Pirata clercki (Boesenberg et Strand, 1906:)
別 名：*灰背狼蛛*。
棲 息：稻田、棉田、旱田、菜園。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
蚜蟲
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾

菜青蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、黑龍江。

Pirata denticulata Liu 小齒水狼蛛 (Liu, 1987:367)
Pirata denticulata Liu, 1987:367-369.
棲 息：山澗溪流邊的水草叢。
捕 食 性。
分 佈：湖南(湘西大庸縣)。

Pirata haplopophysic Cai 簡突水狼蛛 (He, et al., 1991:132)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北、河南。

Pirata japonicus Tanaka 稻田水狼蛛 (Hu, 1984:242; Hunan, Teachers College et Xiang-Yang, 1980(1):24; Li et al., 1989, 16(1):1-6; Sun et al., 1980(4):23; Tang et Zhou, 1983:207-214; Wang, 1985:35; Wang et al., 1989:126; Wu-xing, 1979:25; Zhou, 1986:155; Zhou, 1989, 16(1):7-11; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zong et al., 1984:249)
Pirata japonicus Tanaka, 1974:
棲 息：稻叢基部游獵、麥田。
捕 食：螽蟴
Sogatella furcifera 白背飛蝨
黑尾葉蟬(成蟲)
稻縱捲葉螟(幼蟲)
稻螟蛉(成蟲、幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、浙江、湖北。

Pirata meridionalis Tanaka 南方水狼蛛 (He, et al., 1991:132; Liu, 1987:371)
Pirata meridionalis Tanaka, 1974:22-45.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：海南、廣東、湖南；朝鮮、日本。

Pirata montigena Liu 高原水狼蛛 (He, et al., 1991:132; Liu, 1987:369)
Pirata montigena Liu, 1987:369-371.
棲 息：水溝、水塘邊、溪流邊水草叢。
捕 食 性。
分 佈：雲南(峨山、玉溪、大理)。

Pirata nanshanensis Yin et Wang 南山水狼蛛 (Song, 1987:238; Yin et Wang, 1984:146)
Pirata nanshanensis Yin et Wang, 1984:146-148.
棲 息：小溪旁潮濕地帶。

捕 食 性。
分 佈：湖南(城步南山坪)。

Pirata piraticus (Clerck) 真水狼蛛 (He, et al., 1991:132; Hu, 1984:243; Luo et Zhuo, 1986:74)
Pirata piraticus (Clerck, 1758:)
棲 息：稻田、水渠的草叢中。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、湖南、廣東、四川、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、山東、甘肅、黑龍江。

Pirata piratoides 類水狼蛛 (Chen et al., 1990:135; Zhang et al., 1994, 16(1):12)
棲 息：稻田、菜園。
捕 食：蚜蟲。
分 佈：浙江、湖北。

Pirata pitoides (Boesenberg et Strant) 類水狼蛛 (ASZI, 1987, 2:867; He, et al., 1991:132; Song, 1987:240; Zhu et Zheng, 1984:87)
Pirata pitoides (Boesenberg et Strant, 1906:)
=*Pirata japonicus*
=*Pirata praedatoria* Schenkel, 1953:80-81.
=*Pirata wuchangensis* Schenkel, 1963:356-357.
別 名：*稻田水狼蛛，弓水狼蛛*。
棲 息：稻田水面、稻株基部，爲稻田的優勢種。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、天津、北京、遼寧、吉林。

Pirata praedatoria Schenkel 弓水狼蛛 (Hu, 1984:243; Sun et al., 1980(4):23; Zhao, 1984:4)
Pirata praedatoria Schenkel, 1953:
棲 息：稻田、棉田。
捕 食 性。
分 佈：廣東、貴州、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、河北。

Pirata praedo Kulezynski 田圃水狼蛛 (Hu, 1984:246)
Pirata praedo Kulezynski
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Pirata procurvus (Boesenberg et Strand) 前凹水狼蛛 (Feng, 1990:155; He, et al., 1991:132; Song, 1987:241)
Pirata procurvus (Boesenberg et Strand, 1906:)
=*Pirata procurvus sinensis* Song et Wang, 1978:5.

別 名：*中華水狼蛛*。
棲 息：稻田邊及溝渠草叢。
捕 食 性。
分 佈：貴州、四川、浙江、河南、山東。

Pirata procurvus sinensis Song et Wang 中華水狼蛛 (Hu, 1984:244; Zhong, 1983:158)
Pirata procurvus sinensis Song et Wang, 1978:
棲 息：水田邊活動。
捕 食 性。
分 佈：貴州、浙江、安徽。

Pirata qinlingensis Zheng et Qiu 秦嶺水狼蛛 (He, et al., 1991:132; Hu, 1984:244; Zheng et Qiu, 1980:379)
Pirata qinlingensis Zheng et Qiu, 1980:379-380.
棲 息：河邊卵石灘中。
捕 食 性。
分 佈：河南、陝西、河北、吉林。

Pirata serrulatus Song et Wang 鋸水狼蛛 (Song, 1987:242; Song et Wang, 1984:149)
Pirata serrulatus Song et Wang, 1984:149.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：黑龍江(牡丹江市)。

Pirata subpiraticus (Boesenberg et Strand) 擬水狼蛛 (ASZI, 1987, 2:866; Chen et al., 1990:135; Feng, 1990:156; Guan et al., 1994, 20(2):39-40; He, et al., 1991:132; Hu, 1984:245; Li et al., 1983:112; Lin et Qian, 1981(1-2):91; Pan et al., 1995, 11(3):125-128; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Qi et al., 1989:20-27; Qiu et al., 1996, 18(3):139-140; Shi, 1980[ed.]:128; Shi et al., 1989-90:88; Song, 1987:243; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:39; Tang et Zhou, 1983:207-214; Tao, 1993, 15(1):39-44; Tao et al., 1993, 15(4):167; Wang, 1985:35; 187; Wu-xing, 1979:25; Wu et Wang, 1987:7-10; Xu et al., 1984:29; Xu et al., 1987:140; Xu et al., 1997, 18(3):51-54; Yang et al., 1990:109; Ye et Wang, 1987:11; Zhang, 1983:30; Zhang et He, 1981, 8(2):102; Zhang et al., 1997, 13(2):65-68; Zheng et al., 1985:100-103; Zhou, 1986:155; Zhou, 1989, 16(1):7-11; Zhu et Zheng, 1984:87)
Pirata subpiraticus Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田中的優勢種，常活動于田埂、潮濕地面和水面、花生田、棉田、菜園、橘園.一般不結網，但生殖季節有結小網的習性。
捕 食：稻蝗
蝨蜇
白背飛蝨
稻蝨
黑尾葉蟬
小白翅葉蟬
大白翅葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Geunée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
三化螟(成蟲)
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(成蟲、幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、黑龍江；日本、泰國。

Pirata tenuisetaceus Chai 細毛水狼蛛 (He, et al., 1991:132)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、湖北、河南。

Pirata wuchangensis Schenkel 武昌水狼蛛 (Hu, 1984:246)

Pirata wuchangensis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Pirata yaginuma Tanaka 八氏水狼蛛 (He, et al., 1991:132; Song, 1987:244)

Pirata yaginuma Tanaka, 1974:
=*Pirata qinlingensis* Zheng et Qiu, 1980:379-380.
棲 息：河邊卵石灘中，能在水面快速跑動。
捕 食 性。
分 佈：河南、陝西、河北、北京、吉林。

Tarentula aculeata (Clerck) 刺舞蛛 (Hu, 1984:248)

Tarentula aculeata (Clerck, 1757:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Tarentula albostriatoides Schenkel 白甲舞蛛 (Hu, 1984:248)

Tarentula albostriatoides Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Tarentula argentata Schenkel 銀白舞蛛 (Hu, 1984:248)

Tarentula argentata Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Tarentula argenteopilosa Schenkel 銀色舞蛛 (Hu, 1984:248)

Tarentula argenteopilosa Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Tarentula bipennis Schenkel 雙斑舞蛛 (Hu, 1984:249)

Tarentula bipennis Schenkel, 1953:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula chazaudi Schenkel 柴氏舞蛛 (Hu, 1984:249)

Tarentula chazaudi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Tarentula cinnameopilosa Schenkel 細紋舞蛛 (Hu, 1984:246)

Tarentula cinnameopilosa Schenkel, 1963:

棲 息：稻田、旱田

捕 食 性。

分 佈：湖南、河南、北京(大興)、內蒙古。

Tarentula cuneata (Clerck) 楔形舞蛛 (Hu, 1984:249)

Tarentula cuneata (Clerck)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula davidi Schenkel 大衛氏舞蛛 (Hu, 1984:249)

Tarentula davidi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Tarentula fabifer Schenkel 法舞蛛 (Hu, 1984:249)

Tarentula fabifer Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula fenestrata pseudobarbipes Schenkel 狹孔雙窗舞蛛 (Hu, 1984:247)

Tarentula fenestrata pseudobarbipes Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河南、山東、山西、河北、北京、吉林。

Tarentula fusca Schenkel 褐色舞蛛 (Hu, 11984:249)

Tarentula fusca Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarantula hamata Schenkel 黑斑舞蛛 (Hu, 1984:249)

Tarantula hamata Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Tarentula hsinglungshanensis Saito 河西舞蛛 (Hu, 1984:249)

Tarentula hsinglungshanensis Saito, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河北、內蒙古。

Tarentula kratochvili Schenkel 克拉氏舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula kratochvili Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula licenti Schenkel 北舞蛛 (Hu, 1984:247)

Tarentula licenti Schenkel, 1953:

棲 息：多游獵于旱田或山地。

捕 食 性。

分 佈：河南、陝西、山東、山西、寧夏。

Tarentula luteocuneata Schenkel 褐楔舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula luteocuneata Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula orbiculata Schenkel 球形舞蛛 (Hu, 1984)250)

Tarentula orbiculata Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Tarentula pinnata Kvlczynski 羽狀舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula pinnata Kvlczynski, 1908:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula potanini Schenkel 包氏舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarantula potanini Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula pseudocuneata Schenkel 擬楔舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula pseudocuneata Schenkel, 1953:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula pseudopulverulenta Schenkel 擬粉舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula pseudopulverulenta Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula pulverulenta (Clerck) 粉舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula pulverulenta (Clerck, 1757:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula schmidti (Hahn) 史氏舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula schmidti (Hahn, 1834:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Tarentula watowensis Strand 汕頭舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula watowensis Strand, 1907:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Tarentula wichlei Schenkel 魏氏舞蛛 (Hu, 1984:250)

Tarentula wichlei Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Trochosa daxinensis Song 大興獾蛛 (ASZI, 1987, 2:865; Hu, 1984:250; Song, 1982:78)
Trochosa daxinensis Song, 1982:78.
棲 息：農田。
捕 食 性。
分 佈：河北、北京(大興)。

Trochosa ruricola (De Geer) 奇異獾蛛 (He, et al., 1991:132; Hu, 1984:251; Song, 1987:247; Wang et al., 1989:127; Zhang et al., 1994:12)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778:
=*Trochosa ruricola chekiangensis* Song et Wang, 1978:2-3.
別 名：*浙江獾蛛*。
棲 息：生活于菜地、田埂土縫中、庭園土塊、山地草間，亦見于稻田。
捕 食：飛蝨(荻和蘆葦田)
葉蟬(荻和蘆葦田)
菜青蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陜西、新疆、黑龍江。

Trochosa ruricola chekiangensis Song et Wang 浙江獾蛛 (Hu, 1984:251)
Trochosa ruricola chekiangensis Song et Wang, 1978:
棲 息：多生活于田埂土縫及庭院土塊或山地草間，水田中亦有分佈
捕 食 性。
分 佈：浙江(杭州)、安徽。

Trochosa ruricolodes Schenkel 田圓獾蛛 (Hu, 1984:253)
Trochosa ruricolodes Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Trochosa shaanxiensis Zheng et Qiu 陜西獾蛛 (He, et al., 1991:132; Hu, 1984:251; Zheng et Qiu, 1980:377)
Trochosa shaanxiensis Zheng et Qiu, 1980:377-379.
棲 息：生活于山間溪溝邊卵石灘中，能在水面快速運動。
捕 食 性。
分 佈：河南、陜西(秦嶺)。

Trochosa spinipalpis (Cambridge) 刺獾蛛 (He, et al., 1991:133; Hu, 1984:253; Song, 1987:245; Zhao, 1984:4)

Trochosa spinipalpis (Cambridge, 1895:)
別 名：*刺獨獾蛛，刺觸豹蛛*。
棲 息：棉田、農田中。
捕 食 性。
分 佈：河南、山東、河北、北京、吉林。

Trochosa wuchangensis Schenkel 武昌獾蛛 (ASZI, 1987, 2:866)
Trochosa wuchangensis Schenkel
棲 息：田埂土縫、山地草間、水田。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、江蘇、湖北。

Trochosa sp. 獾蛛 (Zhang et al., 1994, 16(1):12)
棲 息：菜園。
捕 食：菜青蟲
Spodoptera litura (Fabricius)　斜紋夜蛾。
分 佈：湖北。

Dolomedidae 狡蛛科

Dolomedes angustivirgatus Kishida 狹長狡蛛 (Hu, 1984:254)
Dolomedes angustivirgatus Kishida, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Dolomedes chinesus Chamberlin 梨形狡蛛 (He, et al., 1991:133; Hu, 1984:255)
Dolomedes chinesus Chamberlin, 1924:
棲 息：稻田。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、江蘇、湖北。

Dolomedes chinensis duoformus Fox 雙梨形狡蛛 (Hu, 1984:260)
Dolomedes chinensis duoformus Fox, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Dolomedes fimbriatoides Boesenberg et Strant 擬水涯狡蛛 (He, et al., 1991:133; Zhao, 1984:4)
Dolomedes fimbriatoides Boesenberg et Strant, 1906:
棲 息：棉田。
捕 食 性。

分 佈：四川、安徽、陝西。

Dolomedes fimbriatus (Clerck) 擬水洼狡蛛 (Hu, 1984:260)

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：安徽、河北。

Dolomedes horishanus Kishida 黑脊狡蛛 (Hu, 1984:255)

Dolomedes horishanus Kishida
棲 息：多徘徊于山地溪流水畔。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Dolomedes insurgens Chamberlin 興起狡蛛 (Chai et al., 1991:91; Feng, 1990:157; Hu, 1984:256)

Dolomedes insurgens Chamberlin, 1924:
棲 息：稻田、水邊草地，有時到水面活動，不結網
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：廣東、貴州、四川、湖南、浙江、江蘇。

Dolomedes mizhoanus Kishida 褐腹狡蛛 (Hu, 1984:256)

Dolomedes mizhoanus Kishida
棲 息：習性與黑脊狡蛛近似。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Dolomedes pallitarsis Boesenberg et Strand 白跗狡蛛 (Feng, 1990:158; He, et al., 1991:133; Hu, 1984:257; Song, 1987:205; Song et Zheng, 1982: 157; Xie et al., 1999, 21(2):87; Zhang, 1983:31; Zhang et al., 1994, 16(1):12; Zhao, 1984:4)

Dolomedes pallitarsis Boesenberg et Strand, 1906:388.
別 名：*寬條狡蛛*。
棲 息：稻田、水邊、菜園、棉田。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)。
分 佈：福建、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西。

Dolomedes plantarius (Clerck) 蹠狡蛛 (Hu, 1984:260)

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Dolomedes saganus Boesenberg et Strand 袋狡蛛 (Chai et al., 1991:91; He, et al., 1991:133; Hu, 1984:258)

Dolomedes saganus Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：多在山地田間或灌木叢中。
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：臺灣、四川、浙江、山東。

Dolomedes senilis Simon 老狡蛛 (Feng, 1990:159; Hu, 1984:258; Song, 1987:205; Song et Zheng, 1982:156)
Dolomedes senilis Simon, 1880:101-102.
棲 息：水塘及小河邊水草叢中或稻田溝邊。
捕 食：小魚、蝦等。
分 佈：河北、北京。

Dolomedes stellatus Kishida 星狡蛛 (He, et al., 1991:133; Song, 1987:207; Song et Liu, 1982:449)
Dolomedes stellatus Kishida, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：浙江、山西；朝鮮、日本。

Dolomedes sulfureus L. Koch 黃褐狡蛛 (Chai et al., 1991:91; Feng, 1990:160; He, et al., 1991:133; Hu, 1984:258; Song, 1987:208; Song et Zheng, 1982:157; Wu-xing, 1979:26)
Dolomedes sulfureus L. Koch, 1877:778-779.
=*Dolomedes hercules* Bösenberg et Strand, 1906:310-311.
=*Dolemedes insurgens*
別 名：*狹條狡蛛*，*興起狡蛛*。
棲 息：水邊草叢或稻田、棉田、茶園、紅麻地。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西。

Dolomedes stellatus Kishida 星狡蛛 (Hu, 1984:259)
Dolomedes stellatus Kishida, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Pisauridae 盜蛛科

Dolomedes sulfureus Koch 黃褐狡蛛 (Dai, 1997, 19(1):43)
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州。

Dolomedes sp. 狡蛛 (Dai, 1999, 21(4):167)

棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州。

Hygropoda higenaga (Kishida) 長觸肢跑蛛 (Hu, 1984:260)
Dolomedes higenaga Kishida, 1936:
棲 息：常游蕩于山地岩石或樹葉間。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Hygropoda hippocrepiforma Wang 馬蹄潮蛛 (Wang, 1993:156)
Hygropoda hippocrepiforma Wang, 1993:156
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南(勐臘)。

Hygropoda taeniata Wang 帶潮蛛 (Wang, 1993:157)
Hygropoda taeniata Wang, 1993:157.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南(勐倫)。

Perenethis fascigera (Boesenberg et Strant) 紋草蛛 (Chai et al., 1991:91; Dai, 1997, 19(1):43; He, et al., 1991:133; Hu, 1984:260; Song et Zheng, 1982: 157)
Tetragonophthalma fascigera Bösenberg et Strand, 1906:306.
Perenethis fscifera, Yaginuma, 1974:81.
別 名：*帶紋四角蛛*。
棲 息：稻田及潮濕地帶、農田。
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：湖南、廣西、貴州、浙江。

Perenethis sp. 草蛛 (Dai, 1999, 21(4):167)
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州。

Pisaura ancora Paik 錨盜蛛 (Chai et al., 1991:91; Feng, 1990:162; He, et al., 1991:133; Hu, 1984:261; Song, 1987:210; Song et Zheng, 1982:155)
Pisaura ancora Paik, 1969:49-54.
棲 息：山區梯田之作物間或草叢、灌木叢中多見；稻區亦有分佈
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：湖南、四川、浙江、河南、陝西、山東、甘肅、寧夏。

Pisaura kishidai 岸田氏盜蛛 (Hu, 1984:264)

Pisaura kishidai

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Pisaura lama Boesenberg et Strand 駝盜蛛 (Feng, 1990:163; He, et al., 1991:133; Hu, 1984:262; Song et Zheng, 1982:156; Zhang, 1983:31; Zhao, 1984:4)

Pisaura lama Boesenberg et Strand, 1906:306-307.

別 名：*河溝盜蛛*。

棲 息：菜園、棉田、游獵于山坡灌木叢。

捕 食 性。

分 佈：湖南、四川、浙江、湖北、新疆。

Pisaura lantanus Wang 提燈盜蛛 (Wang, 1993:158)

Pisaura lantanus Wang, 1993:158-159.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：福建(崇安)。

Pisaura mirabilis (Clerck) 奇異盜蛛 (Hu, 1984:263; Song, 1987:211; Zhao, 1984:4)

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757:)

棲 息：游獵于棉田、農田、果園的草叢間。

捕 食 性。

分 佈：甘肅、新疆。

Pisaura zonaformis Wang 帶形盜蛛 (Wang, 1993:157)

Pisaura zonaformis Wang, 1993:157-158.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南(勐倫)。

Pisaura sp. 盜蛛 (Shi et al., 1989-90:88)

棲 息：橘園。

捕 食 性。

分 佈：上海。

Thalassius affinis Song et Zheng 近親走蛛 (Dai, 1999, 21(4):167; Feng, 1990:161; Hu, 1984:264; Song, 1987:212; Song et Zheng, 1982:157)

Thalassius affinis Song et Zheng, 1982:157-159.

棲 息：山區稻田、茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。

分 佈：貴州、四川、浙江。

Thalassius phipsoni F. P.Cambridge 近親走蛛 (He, et al., 1991:133; Hu, 1984:265)

=*Thalassius affinis* Song et Zheng

棲 息：多游蕩于水濱草地間。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、香港、廣西、雲南、貴州、四川、浙江。

Oxyopidae 貓蛛科

Oxyopes aglessus Chanberlin 帶紋貓蛛 (He, et al., 1991:133)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Oxyopes daksina Sherriffs W. Rae 南方貓蛛 (He, et al., 1991:134; Hu, 1984:267)

Oxyopes daksina Sherriffs W. Rae, 1955:

別 名：*直紋貓蛛*。

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣東、香港、廣西、四川、安徽。

Oxyopes hotingchiehi Schenkel 霍氏貓蛛 (He, et al., 1991:134; Hu, 1984:267; Sun et al., 1984:111)

Oxyopes hotingchiehi Schenkel, 1963:

別 名：*華南貓蛛*。

棲 息：稻田。

捕 食：水稻螟蛾類。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北。

Oxyopes javanus Thorell 爪哇貓蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:326; He, et al., 1991:134; Song, 1987:249; Sun et al., 1980(4):23)

Oxyopes javanus Thorell, 1877:329.

=*Oxyopes lineatips* Simon, 1885:441.

棲 息：稻田。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、湖北、陝西；菲律賓、越南、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、印度、孟加拉、Myanmar.

Oxyopes lienatipes L. Koch 線紋貓蛛 (ASZI, 1987, 2:869; Chai et al., 1991:91; Dai, 1999, 21(4):167; Feng, 1990:164; 150; He, et al., 1991:134; Hu, 1984:268; Huang, 1990[ed.]:227; Song, 1987:250; Sun et al., 1980(4):23;)

Oxyopes lienatipes L. Koch, 1848:

棲 息：旱田作物葉面、茶園、稻田埂雜草、丘陵地帶灌木叢，不結網。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe　假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻飛蝨
稻葉蟬
稻縱捲葉螟
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
蛾類。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西；日本、馬來西亞、泰國、緬甸、印尼。

Oxyopes macilentus (L. Koch) 細紋貓蛛 (Chai et al., 1991:91; Feng, 1990:165; He, et al., 1991:134; Hu, 1984:269; Song et al., 1997:1724)
Oxyopes macilentus (L. Koch, 1878:)
別 名：*瘦弱貓蛛*。
棲 息：茶園、山區果園草叢、森林。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、河南；南亞至澳洲。

Oxyopes parvus Paik 小貓蛛 (He, et al., 1991:134; Hu, 1984:269; Song, 1987:250; Song et Liu, 1982:449)
Oxyopes parvus Paik, 1967:
別 名：*山形貓蛛*。
棲 息：稻田、農田或山間草叢。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：河南、陝西、山西、黑龍江。

Oxyopes ramosus (Panzer) 枝紋貓蛛 (Hu, 1984:270)
Oxyopes ramosus (Panzer, 1904:)
棲 息：旱田。
捕 食 性。
分 佈：河南、陝西、新疆。

Oxyopes sertatus L. Koch 斜紋貓蛛 (ASZI, 1987, 2:868; Chai et al., 1991:91; Chen, 1992:69; Dai, 1999, 21(4):167; Feng, 1990:166; He, et al., 1991:134; Hu, 1984:271; Liu et al., 1999, 21(3):99; Song, 1987:251; Song et al., 1997:1725; Sun et al., 1984:111; Tang et Zhou, 1983:207-214; Wu et al., 1989:177; Wu-xing, 1979:26; Xu et al., 1987:140; Zhang, 1983:31; Zhang et Li, 1982:228; Zhang et al., 1997, 13(2):65-68; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1986:119)
Oxyopes sertatus L. Koch, 1877:
棲 息：旱地和林間植株上、中部，也見于山區稻田、棉田、菜園、茶園、農田、灌木叢；不結網，食量大
捕 食：*Chondracris rosea rosea* (De Geer) 棉蝗(木麻黃)
Odontotermes formosanus Shiraki 黑翅土白蟻
Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
稻飛蝨

小白翅葉蟬
黑尾葉蟬
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
鱗翅目幼蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、新疆、遼寧、吉林；朝鮮、日本、馬來西亞、泰國、緬甸、印尼。

Oxyopes sikkinensis Tikater 錫金貓蛛 (He, et al., 1991:134)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Oxyopes striagatus Song 條紋貓蛛 (Song et al., 1997:1725)
Oxyopes striagatus Song, 1991:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南、浙江、湖北；日本。

Oxyopes sushilae Tikader 盾形貓蛛 (Song et al., 1997:1726)
Oxyopes sushilae Tikader, 1965:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、廣東、海南、貴州、浙江、湖北；印度。

Oxyopes wrouphtoni Poc 瓦氏貓蛛 (He, et al., 1991:134)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Oxyopes sp. 貓蛛 (Dai, 1999, 21(4):167)
棲 息：茶園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州。

Peucetia formosensis Kishida 臺灣世蛛 (Hu, 1984:272)
Peucetia formosensis Kishida
棲 息：草叢間。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Corinnidae 圓顎蛛科

Trachelas japonica Boesenberg et Strand 日本管蛛 (Feng, 1990:170; Hu, 1984:305; Song et al., 1997:1727)

Trachelas japonica Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：農田，在葉面捕蟲。
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江(杭州)、湖北；朝鮮、日本。

Dionycha 二爪類

Gnaphosidae 平腹蛛科

Callilepis schuszteri (Herman) 舒氏美蛛 (Song, 1987:334)

Callilepis schuszteri (Herman, 1879:)
=*Pythonissa flavitarsis* Simon, 1880:120-121.
Callilepis schuszteri, Platnick, 1974:19-21.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Drassodes auritus Schenkel 耳狀掠蛛 (Hu, 1984:275; Song, 1987:335; Yu et al., 1982:263)

Drassodes auritus Schenkel, 1963:38-39.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅、內蒙古。

Drassodes dispulsoides Schenkel 嗜爭掠蛛 (Hu, 1984:277)

Drassodes dispulsoides Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Drassodes dispulsus (Cambridge) 敵似豹掠蛛 (Hu, 1984:277)

Drassodes dispulsus (Cambridge, 1885:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅、內蒙古。

Drassodes fugax Simon 迅掠蛛 (Hu, 1984:277; Song, 1987:336)

Drassodes fugax Simon, 1878:114-115.)
Drassodes ndamicus Schenkel, 1963:37-38.
別 名：*疾走掠蛛*。
棲 息：

捕 食 性。
分 佈：北京、甘肅。

Drassodes inflectus (Cambridge) 彎曲掠蛛 (Hu, 1984:277)
Drassodes inflectus (Cambridge, 1885:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Drassodes lapidosus (Walckenaer) 石棲掠蛛 (Hu, 1984:278; Song et Haupt, 1996:315)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京、青海、甘肅、內蒙古；歐洲、北美洲。

Drassodes lesserti Schenkel 塞外掠蛛 (Hu, 1984:278; Shu et Yu, 1985:93)
Vroctea lesserti Schenkel
Drassodes lesserti Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食：*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾(幼蟲)。
分 佈：遼寧、黑龍江。

Drassodes licenti Schenkel 北掠蛛 (Hu, 1984:278)
Drassodes licenti Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Drassodes nigrosegmentatus Simon 黑節掠蛛 (Hu, 1984:278)
Drassodes nigrosegmentatus Simon, 1895:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Drassodes pectinifer Schenkel 櫛形掠蛛 (Hu, 1984L278)
Drassodes pectinifer Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：青海、甘肅。

Drassodes potanini Schenkel 波丹掠蛛 (Hu, 1984:277; Song, 1987:337)
Drassodes potanini Schenkel, 1963:
棲 息：

捕 食 性。
分 佈：青海、甘肅、內蒙古。

Drassodes pseudopubescens Schenkel 擬柔毛掠蛛 (Hu, 1984:278)
Drassodes pseudopubescens Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Drassodes pugnans (Simon) 嗜斗掠蛛 (Hu, 1984:278)
Drassodes pugnans (Simon, 1880:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京、青海、甘肅。

Drassodes saitoi Schenkel 齋藤掠蛛 (Hu, 1984:278)
Drassodes saitoi Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Drassodes serratidens Schenkel 鋸齒掠蛛 (Hu, 1984:275)
Drassodes serratidens Schenkel, 1963:
棲 息：多活動于山區灌木林的草叢間。
捕 食 性。
分 佈：西藏、山東、甘肅、內蒙古。

Drassodes sollers Simon 孤獨掠蛛 (Hu, 1984:278)
Drassodes sollers Simon, 1895:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Drassodes tegulatus Schenkel 瓦形掠蛛 (Hu, 1984:278)
Drassodes tegulatus Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：青海。

Gnaphosa acuaria Schenkel 尖銳平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa acuaria Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：青海。

Gnaphosa aeditua Schenkel 艾平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Ganphosa aeditua Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：青海、甘肅。

Gnaphosa alberti Schenkel 阿爾平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa alberti Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：青海、甘肅。

Gnaphosa auriceps Schenkel 金色平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa auriceps Schenkel, 1953:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Gnaphosa berlandi Schenkel 貝氏平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa berlandi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：青海、甘肅。

Gnaphosa bonneti Schenkel 包氏平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa bonneti Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Gnaphosa braendegaardi Schenkel 布氏平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa braendegaardi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Gnaphosa chaffanjoni Schenkel 查氏平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa chaffanjoni Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：黑龍江。

Gnaphosa charitonowi Schenkel 查理平腹蛛 (Hu, 1984:278; Song, 1987:338)

Gnaphosa charitonowi Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅、內蒙古。

Gnaphosa compirensis Boesenberg et Strand 狂平腹蛛 (Hu, 1984:278)

Gnaphosa compirensis Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Gnaphosa corifera Schenkel 山洞平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa corifera Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Ganphosa crassipes Schenkel 厚平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Ganphosa crassipes Schenkel:1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Gnaphosa davidi Schenkel 大衛氏平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa davidi Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西。

Gnaphosa denisi Schenkel 丹氏平腹蛛 (He, et al., 1991:134; Hu, 1984:279; Song 1987:338; Zhao, 1984:6)

Gnaphosa denisi Schenkel, 1963:64-66.
=*Gnaphosa acuaria* Schenkel, 1963:66-67.
=*Gnaphosa aeditus* Schenkel, 1963:67-69.
棲 息：落葉、石下和土縫中，棉田、稻田
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
蚜蟲
分 佈：貴州、湖南、江蘇、河南、山西、青海、甘肅。

Gnaphosa fagei Schenkel 汜氏平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa fagei Schenkel, 1963:
棲 息：

捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Gnaphosa falculata Schenkel 爪形平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa falculata Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Gnaphosa glandifera Schenkel 腺平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa glandifera Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Gnaphosa gracilior Kulczynski 柔弱平腹蛛 (Hu, 1984:280; Song et Haupt, 1996:315)
Gnaphosa gracilior Kulczynski, 1901:
=*Gnaphosa pseuudomongolica* Schenkel, 1963:979.
=*Poecilochra tarimuensis* Hu, 1989:98.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古；蒙古、俄羅斯東部。

Gnaphosa hastata Fox 戟狀平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa hastata Fox, 1937:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Gnaphosa holmi Schenkel 侯氏平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa holmi Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Gnaphosa kansuensis Schenkel 甘肅平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa kansuensis Schenkel,1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Gnaphosa kompirensis Boesenberg et Strnad 蛞平腹蛛 (He, et al., 1991:134; Hu, 1984:279; Li et al., 1983:112)
Gnaphosa kompirensis Boesenberg et Strnad, 1906:
棲 息：小麥、玉米、花生等旱田。

捕 食 性。
分 佈：安徽、河南、陝西、山東、青海、寧夏。

Gnaphosa kratochvili Schenkel 庫里平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa kratochvili Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：青海、甘肅。

Gnaphosa lesserti Schenkel 塞外平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa lesserti Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Gnaphosa lecenti Schenkel 北平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa lecenti Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Gnaphosa leporina L. Koch 兔平腹蛛 (Zhou et Song, 1985, 2(3/4):271)
Gnaphosa leporina L. Koch, 1866:
棲 息：防護林帶及渠邊草叢下。
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Gnaphosa mandschurica Schenkel 滿州平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa mandschurica Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Gnaphosa martae Schenkel 馬特平腹蛛 (Hu, 1984:280)
Gnaphosa martae Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Gnaphosa moerens O. P.-Cambridge 悲平腹蛛 (Song et Haupt, 1996:316)
Gnaphosa moerens O. P.-Cambridge, 1885:
捕 食 性。
分 佈：新疆；尼泊爾。

Gnaphosa mongolica Simon 蒙古平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa mongolica Simon, 1895:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆、內蒙古。

Gnaphosa multispinosa Schenkel 多刺平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa multispinosa Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Gnaphosa muscorum (L. Koch) 苔平腹蛛 (Song et Haupt, 1996:315)

Gnaphosa muscorum (L. Koch, 1866:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、青海；蒙古、蘇聯、歐洲、北美洲。

Gnaphosa potanini Simon 蒲氏平腹蛛 (Hu, 1984:280)

Gnaphosa potanini Simon, 1895:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Gnaphosa roeveri Schenkel 勒氏平腹蛛 (Hu, 1984:281)

Gnaphosa roeveri Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河南、青海、甘肅。

Gnaphosa rudolfi Schenkel 魯氏平腹蛛 (Hu, 1984:281)

Gnaphosa rudolfi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河南。

Gnaphosa schensiensis Schenkel 山西平腹蛛 (Hu, 1984:281)

Gnaphosa schensiensis Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Gnaphosa sinensis Simon 中華平腹蛛 (Dia, 1997, 19(1):44; Hu, 1984:281; Song, 1987:339)

Gnaphosa sinensis Simon, 1880:121-122.
Gnaphosa kratochvili Schenkel, 1963:61-62.
棲 息：地面落葉下。
捕 食：地面昆蟲。
分 佈：貴州、四川、山西、河北、北京、甘肅。

Gnaphosa stoliczkae Cambridge 魯鈍平腹蛛 (Hu, 1984:281)
Gnaphosa stoliczkae Cambridge, 1885:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Gnaphosa suchuana Camberlin 馳平腹蛛 (Hu, 1984:281)
Gnaphosa suchuana Camberlin,1924:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建。

Gnaphosa wiehlei Schenkel 魏氏平腹蛛 (Hu, 1984:281)
Gnaphosa wiehlei Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：青海。

Gnaphossa zhaoi Ovtsharenk et al. 趙氏平腹蛛 (Song et al., 1997:1728)
Gnaphossa zhaoi Ovtsharenk et al., 1992:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北。

Gnaphosa sp. 平腹蛛 (Zhao, 1984:6)
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Haplodrassus puguans (Simon) 平單蛛 (Song, 1987:340)
Drassus puguans Simon, 1880:118-119.
=*Drassodes pseudopuguans* Schenkel, 1963:45-46.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河北、青海、甘肅。

Herpyllus striatus Kishida 虎斑掠蛛 (He, et al., 1991:134)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Poecilochroa hosiziro Yaginuma 鬣覆蛛 (Hu, 1984:281)

Poecilochroa hosiziro Yaginuma, 1960:

棲 息：山區松林樹幹基部之裂隙間。

捕 食 性。

分 佈：山東(煙台昆崙山)。

Prodidomus rufus Heutz 荷色粗螯蛛 (Song, 1987:342)

Prodidomus rufus Heutz, 1847:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg) 粗狂蛛 (Song, 1987:343)

Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg, 1875:)

Zelotes cavaleriei Schenkel, 1963:50-51.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：福建、貴州、江蘇、河北。

Zelotes asiaticus (Boesenberg et Strand) 亞洲狂蛛 (He, et al., 1991:134; Song, 1987:344)

Prothesima asiatica Boesenberg et Strand, 1906:121.

Zelotes asiaticus, Yaginuma, 1974:121.

棲 息：旱田，也棲于板栗林或山間林叢的石塊及落葉下面。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、廣東、四川、浙江、河南、山東。

Zelotes cavaleriei Schenkel 卡氏狂蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:184; Hu, 1984:282)

Zelotes cavaleriei Schenkel, 1963:50.

棲 息：稻田、旱田。

捕 食 性。

分 佈：河南；日本、菲律賓。

Zelotes davidi Schenkel 大衛氏狂蛛 (Dong, 1988:85; Hu, 1984:284)

Zelotes davidi Schenkel, 1963:

棲 息：牡丹園。

捕 食 性。

分 佈：陝西、山東。

Zelotes excavatus Schenkel 陷凹狂蛛 (Hu, 1984:284)

Zelotes excavatus Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Zelotes faveolata (Simon) 蜂洞狂蛛 (Hu, 1984:284)

Zelotes faveolata (Simon, 1880:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Zelotes hummeli Schenkel 胡氏狂蛛 (Hu, 1984:284)

Zelotes hummeli Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Zelotes joannisi Schenkel 焦氏狂蛛 (Hu, 1984:284)

Zelotes joannisi Schenkel,1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江蘇(南京)。

Zelotes pallidipatellis Boesenberg et Strand 淡膝狂蛛 (Hu, 1984:284)

Prosthesima pallidipatellis Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：

Zelotes potanini Schenkel 蒲氏狂蛛 (Hu, 1984:284)

Zelotes potanini Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山東、山西、青海。

Zelotes wuchangensis Schenkel 武昌狂蛛 (Hu, 1984:284)

Zelotes wuchangensis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Philodromidae 逍遙蛛科

Philodromus subaureolus Boesenberg et Strand 土黃逍遙蛛 (Song, 1997:1728)

Philodromus subaureolus Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Platoridae 扁蛛科

Plator insolens Simon 珍奇扁蛛 (Hu, 1984:287)

Plator insolens Simon, 1880:

棲 息：松樹皮下。

捕 食 性。

分 佈：河北、北京、天津、遼寧。

Plator nipponicus (Kishida) 日本扁蛛 (He, et al., 1991:135; Hu, 1984:285)

Plator nipponicus (Kishida, 1914:)

=*Plator sinicus* Zhu et Wang

棲 息：多棲息于建築物或禽舍之墻壁的縫隙中。

捕 食 性。

分 佈：

Clubionidae 管蛛科(管巢蛛科)

Castianeira flavimaculata Hu et al. 黃斑純蛛 (Dai, 1997, 19(1):43; 1999, 21(4):167; He, et al., 1991:135; Hu et al., 1985:259)

=*Clubiona pyrifera* Hu, 1979:2. (*nec* Schenkel)

Castianeira flavimaculata Hu et al., 1985:259-261.

棲 息：稻田、茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

蚜蟲

鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：湖南、廣東、廣西、貴州、浙江、湖北。

Castianeira shaxianensis Dong 沙縣純蛛 (He, et al., 1991:135; Song, 1987:312)

Castianeira shaxianensis Dong, 1983:

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：福建。

Castianeira tinae Patel et Patel 馬黃斑粟蛛 (Feng, 1990:173)

Castianeira tinae Patel et Patel, 1973:

棲 息：山區稻田或旱地作物間。

捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣東、雲南、浙江、湖北。

Chiracanthium adjacensoides Song et al. 擬鄰紅螯蛛 (Song et al., 1990:427)
Chiracanthium adjacensoides Song et al., 1990:427-429.
棲 息：柑橘、茶。
捕 食 性。
分 佈：四川、安徽。

Chiracanthium brevispinus Song 短刺紅螯蛛 (ASZI, 1987, 2:881; Feng, 1990:168; Song, 1987:313)
Chiracanthium brevispinus Song et al., 1982:
棲 息：棉田、核桃樹葉面及枝葉間。
捕 食 性。
分 佈：陜西、河北、北京、內蒙古。

Chiracanthium circumcinctum Schenkel 環帶紅螯蛛 (He, et al., 1991:135; Li et al., 1983:113)
棲 息：稻田、花生田。
捕 食：多種水稻害蟲。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、河南。

Chiracanthium fujianensis Gong 福建紅螯蛛 (Song, 1987:314)
Chiracanthium fujianensis Gong, 1983:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建。

Chiracanthium japonicum Boesenberg et Strand 日本紅螯蛛 (He, et al., 1991:135; Hu, 1984:298; Li et al., 1983:113; Song, 1987:315; Zhao, 1984:5)
Chiracanthium japonicum Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田、旱田；能將花生、玉米或棉花葉折作管狀巢。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬
蚜蟲
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟。
分 佈：湖南、廣西、雲南、四川、江蘇、湖北、河南、陜西、山東、山西、甘肅、內蒙古、吉林。

Chiracanthium lascivum Karsch 活潑紅螯蛛 (He, et al., 1991:135; Hu, 1984:298)
Chiracanthium lascivum Karsch, 1879:
=*Chiracanthium gratiosum* Saito
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：四川、浙江。

Chiracanthium pennyi Cambridge 彭妮紅螯蛛 (ASZI, 1987, 2:881; Dai, 1997, 19(1):43; He, et al., 1991:135; Hu, 1984:298; Song, 1987:315; Zhao, 1984:5)

Chiracanthium pennyi Cambridge, 1873:
=*Chiracanthium circumcinctum* Schenkel, 1963:257-258.
棲 息：稻田、旱田、棉田、苜蓿、茶園、等的作物間，亦見于山區和草原、
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：湖南、廣東、海南、四川、湖北、山東、河北、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧；亞洲、歐洲。

Chiracanthium pichoni Schenkel 皮氏紅螯蛛 (He, et al., 1991:135; Song, 1987:317; Zhao, 1984:5)

Chiracanthium pichoni Schenkel, 1963:
棲 息：稻田、棉田、果園。
捕 食 性。
分 佈：廣東、浙江、江蘇、湖北。

Chiracanthium solidum Zhang et al. 結實紅螯蛛 (Zhang et al., 1993, 15(3):107)

Chiracanthium solidum Zhang et al., 1993:107.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州(梵净山)。

Chiracanthium sphaericum Zhang et al. 球紅螯蛛 (Zhang et al., 1993, 15(3):107)

Chiracanthium sphaericum Zhang et al., 1993:107-108.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南(張家界國家森林公園)。

Chiracanthium submordax Zhang et al. 擬摩紅螯蛛 (Zhang et al., 1993, 15(3):106)

Chiracanthium submordax Zhang et al., 1993:106-107.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西(寧明)。

Chiracanthium unicum Boesenberg et Strand 鈞紅螯蛛 (Song, 1987:318)

Chiracanthium unicum Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Chiracanthium virescens (Sundevall) 綠色紅螯蛛 (He, et al., 1991:135; Li et al., 1983:113)

棲 息：稻田、花生田。
捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、廣西、河南、山東。

Chiracanthium zhejiangensis Song et Hu 浙江紅螯蛛 (ASZI, 1987, 2:880; Feng, 1990:169; He, et al., 1991:135; Hu, 1984:299; Song, 1987:319)

Chiracanthium zhejiangensis Song et Hu, 1983:

棲 息：水田作物間、茶園、果園草叢。

捕 食：稻飛蝨

稻縱捲葉螟。

分 佈：廣西、湖南、四川、浙江。

Chiracanthium virescens (Sundevall) 綠色紅螯蛛 (Hu, 1984:300)

Chiracanthium virescens (Sundevall, 1873:)

棲 息：稻田、棉田或其他旱田。

捕 食 性。

分 佈：廣東、湖南、河南、山東。

Clubiona brevipes Blackwall 短腳管巢蛛 (He, et al., 1991:135)

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：四川。

Clubiona coerulescens sinensis Hu 中華蘭管巢蛛 (He, et al., 1991:135; Hu, 1984:288; Wang, 1985:187)

Clubiona coerulescens sinensis Hu, 1979:

棲 息：稻田、棉田。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東。

Clubiona corrugata Boesenberg et Strand 褶管巢蛛 (ASZI, 1987, 2:880; Dai, 1999, 21(4):166; He, et al., 1991:135; Hu, 1984:288; Shi et al. 1989-90:88; Song, 1987:320; Wang et al., 1989:127; Zhang et al., 1997, 13(2):65-68)

Clubiona corrugata Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：稻田、棉田、橘園、茶園、荻和蘆葦田。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻飛蝨

稻葉蟬

Parnara guttata guttata Bremer et Grey 稻苞蟲

Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、上海、湖北、陝西；日本。

Clubiona deletrix Cambridge 毀壞管巢蛛 (Chen, 1992:69; Dai, 1995, 11(4):184; Dai, 1999, 21(4):166; Hu, 1984:297)

Clubiona deletrix Cambridge, 1885:

棲 息：茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
食蚜蠅成蟲及幼蟲。
分 佈：貴州、四川、浙江。

Clubiona drassodes O. P. Cambridge 德拉管巢蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:106; Song, 1987:320)
Clubiona drassodes O. P. Cambridge, 1874:414.
=*Clubiona atwali* Gurdip Singh, 1970:410-412.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：福建；緬甸、印度。

Clubiona flexa Zhang et Chen 曲管巢蛛 (Zhang et Chen, 1993:307)
Clubiona flexa Zhang et Chen, 1993:307.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北(神農架)。

Clubiona filicata Cambridge 圓環管巢蛛 (Gong, 1987:109)
Clubiona filicata Cambridge, 1874:413-414.
棲 息：竹葉
捕 食 性。
分 佈：福建。

Clubiona fusoidea Zhang 紡錘管巢蛛 (Zhang, 1993:164)
Clubiona fusoidea Zhang, 1993:164-165.
棲 息：山澗小溪邊的灌木、草叢，卷葉爲巢。
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Clubiona genevensis L. Koch 常管巢蛛 (He, et al., 1991:135)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Clubiona hedina Schenkel 赫定管巢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:290; Song, 1987:321)
Clubiona hedina Schenkel, 1936:
棲 息：稻田、旱田、山楂樹上。
捕 食：稻葉蟬。
分 佈：湖南、四川、陝西、山東、甘肅、寧夏、遼寧。

Clubiona hummedi Schenkel 雙弓管巢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:290; Qu et al., 1986:142)
Clubiona hummedi Schenkel, 1936:
棲 息：稻區，棉田、北方黃河大堤柳樹防浪林，東北大豆田。

捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、北京、甘肅、寧夏、吉林。

Clubiona japonicola Boesenberg et Strand 粽管巢蛛 (ASZI, 1987, 2:879; Barrion et Litsinger, 1995:111; Cao, 1986:182; Chen, 1992:69; Dai, 1999, 21(4):166; Dong, 1987, 14(1):28, 64; Dong, 1988:85; Feng, 1990:171; He, et al., 1991:136; Hu, 1984:291; Hunan, Teachers College et Xiang-yang, 1980(1):24; Li et al., 1983:112; Lin et Qian, 1981(1-2):92; Luo et Zhuo, 1986:74; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Qi et al., 1990, 17(1):29-34; Song, 1987:322; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:39; Tao, 1993, 15(1):39-44; Tao et al., 1993, 15(4):167; Wang, 1985:35; 187; Wu et Chen, 1980(4):47; Wu-xing, 1979:26; Xie et al., 1999, 21(2):87; Xu et al., 1984:29; Xu et al., 1987:140; Ye et Wang, 1987:11; Zhang, 1983:31; Zhang, 1989, 8(1):24-28; Zhang et al., 1994, 16(1):12; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zhong, 1983:158; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zhu et Zheng, 1984:87; Zong et al., 1984:249)

Clubiona japonicola Boesenberg et Strant, 1906:281.
=*Clubiona parajaponicula* Schenkel, 1963:251-253.
棲 息：菜園、稻葉、茭白葉上、茶園、棉苞葉上、花生田、麥田、橘葉上、牡丹園。
捕 食：螽蟴

Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
Adelphocoris suturalis 中黑盲蝽
Lygus lucorum 綠盲蝽
白背飛蝨
黑尾葉蟬
小白翅葉蟬
棉葉蟬
葉蟬
棉蚜
稻縱捲葉螟(幼蟲)
瓜野螟
棉小造橋蟲
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、亞洲南部、東南亞。

Clubiona jucunda (Karsch) 快慰管巢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:292)

Clubiona jucunda (Karsch, 1879:)
棲 息：山間松林的樹皮下。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、浙江、湖北、河南、陝西、山東。

Clubiona kurilensis Boesenberg et Strand 千島管巢蛛 (Dong, 1988:85; He, et al., 1991:136; Hu, 1984:292; Li et al., 1983:113; Nan et al., 1987:125; Song, 1987:323; Wu et al., 1991:28; Wu et al., 1991:101)

Clubiona kurilensis Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田、棉田、花生田、其他旱田、牡丹園。
捕 食：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、河北、北京、天津、吉林。

Clubiona lena Boesenberg et Strand 軟管巢蛛 (Song, 1987:325)
Clubiona lena Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：農田中。
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Clubiona maculata Song et Chen 斑管巢蛛 (Hu, 1984:293; Shi et al., 1989-90:88; Zhang, 1983:31; Zhang et Li, 1982:228; Zhao, 1984:5)
Clubiona maculata Song et Chen, 1979:
棲 息：稻田、棉田、菜園、橘園、林間皮下。
捕 食：*Odontotermes formosanus* Shiraki 黑翅土白蟻
稻蟲。
分 佈：湖南、廣東、貴州、浙江、上海、安徽、湖北。

Clubiona mandshurica Schenkel 吉林管巢蛛 (Hu, 1984:294)
Clubiona mandshurica Schenkel, 1953:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：吉林(遼源)。

Clubiona neglecta Cambridge 褐管巢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:295)
Clubiona neglecta Cambridge, 1862:
棲 息：稻田；亦棲息于石塊下或其他潮濕的地方。
捕 食：稻飛蝨
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：福建、湖南、四川、安徽、陝西。

Clubiona nigra Zhang 黑管巢蛛 (Zhang, 1993:162)
Clubiona nigra Zhang, 1993:162-163.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：吉林、黑龍。

Clubiona noesta Banks 模管巢蛛 (He, et al., 1991:136)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州、湖南。

Clubiona papillata Schenkel 乳突管巢蛛 (Hu, 1984:295)
Clubiona papillata Schenkel, 1906:
棲 息：生活于刺槐林的葉間。
捕 食 性。
分 佈：陝西、甘肅。

Clubiona phragmitis L. Koch 雙孔管巢蛛 (He, et al., 1991:136)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Clubiona phragmitoides Schenkel 蘆葦管巢蛛 (Hu, 1984:297)
Clubiona phragmitoides Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Clubiona propinqua L. Koch 近鄰管巢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:296; Zhao, 1984:5)
Clubiona propinqua L. Koch, 1879:90-92.
=*Clubiona pseudogermanica* Schenkel, 1963:155-156.
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：湖南、河南、甘肅、遼寧、吉林。

Clubiona pyrifera Schenkel 梨形管巢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:296)
Clubiona pyrifera Schenkel, 1936:
棲 息：稻田。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、湖南、廣東、湖北、甘肅。

Clubiona reichlini Schenkel 斑管巢蛛 (Feng, 1990:172; He, et al., 1991:136; Song, 1987:326; Yan et Wang, 1987:16)
Clubiona reichlini Schenkel, 1944:203-205.
=*Clubiona maculata* Song et Chen, 1979:23-25.
棲 息：稻田、茶園、柑橘園葉面。
捕 食：稻飛蝨
稻葉蟬。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、河北。

Clubiona serrata Zhang 鋸齒管巢蛛 (Zhang, 1993:165)

Clubiona serrata Zhang, 1993:165-167.

棲 息：山澗小溪邊的灌木及草叢中

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、雲南、貴州、四川、湖北。

Clubiona swatowensis Strand 汕頭管巢蛛 (Hu, 1984:297)

Clubiona swatowensis Strand, 1907:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Clubiona trivialis L. Koch 三叉管巢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:297)

Clubiona trivialis L. Koch, 1841:

棲 息：稻田，其他植物上或石塊下。

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、四川、湖北、寧夏。

Clubiona vigil Karsch 警覺管巢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:298; Sun et al., 1980(4):23; Wu-xing, 1979:26)

Clubiona vigil Karsch, 1879:

棲 息：稻田。

捕 食：稻飛蝨

稻葉蟬。

分 佈：廣東、浙江、湖北、黑龍江。

Clubiona violaceovittata Schenkel 紫條管巢蛛 (Hu, 1984:298)

Clubiona violaceovittata Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Clubiona sp. 管巢蛛 (Shi et al., 1989-90:88)

棲 息：橘園。

捕 食 性。

分 佈：上海。

Clubiona sp. 管巢蛛 (Dai, 1999, 21(4):167)

棲 息：茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。

分 佈：貴州。

Clubiona sp. 管巢蛛 (Chen et Chiu, 1983:288)

棲 息：稻田。
捕 食：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟。
分 佈：臺灣。

Itatsina praticola Bösenberg et Strand 草棲毛叢蛛 (He, et al., 1991:136; Hu, 1984:300; Song et Liu, 1982:449)
Agrocea praticola Bösenberg et Strand, 1906: 291.
Itatsina praticola, Yaginuma, 1974:113.
棲 息：農田中。
捕 食 性。
分 佈：浙江、江蘇。

Mesiotelus lubricus (Simon) 平滑間蛛 (Song, 1987:328)
Liocranum lubricum Simon, 1880:122-125.
Mesiotelus lubricus, Simon, 1897:140.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Micaria aciculata Simon 針形小蟻蛛 (Hu, 1984:303)
Micaria aciculata Simon, 1895:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Micaria alpina L. Koch 山區小蟻蛛 (Hu, 1984:301)
Micaria alpina L. Koch, 1872:
棲 息：渠邊石下。
捕 食 性。
分 佈：河北(平山)。

Micaria berlandi Schenkel 貝氏小蟻蛛 (Hu, 1984:303)
Micaria berlandi Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Micaria bonneti Schenkel 包氏小蟻蛛 (Hu, 1984:303)
Micaria bonneti Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Micaria centrocnemys Kulczynski 中裸小蟻蛛 (Hu, 1984:303)
Micaria centrocnemys Kulczynski, 1885:

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Micaria clasipes Boesenberg et Strand 擊小蟻蛛 (Hu, 1984:301)
Micaria clasipes Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：多見于菜園，徘徊于菜葉上捕食害蟲。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Micaria fagei Schenkel 法氏小蟻蛛 (Hu, 1984:303)
Micaria fagei Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Micaria formicaria (Sundevall) 小蟻蛛 (Hu, 1984:301)
Micaria formicaria (Sundevall, 1832:)
棲 息：草間、石下。
捕 食 性。
分 佈：甘肅(蘭州)。

Micaria quinquenotata Simon 五點小蟻蛛 (Hu, 1984:303)
Micaria quinquenotata Simon, 1895:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Micaria scintillans O.B. Cambridge 閃光小蟻蛛 (Hu, 1984:301)
Micaria scintillans O.B. Cambridge, 1871:
棲 息：石下。
捕 食 性。
分 佈：河北、北京、吉林。

Orthobula crucifera Boesenberg et Strand 十字盾球蛛 (He, et al., 1991:137; Hu, 1984:303)
Orthobula crucifera Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：湖南、陝西、河北。

Orthobula yaginumai Platnick 八氏盾球蛛 (Hu, 1984:304; Song, 1987:329)
Orthobula yaginumai Platnick, 1977:
別 名：*八木恬蛛*。

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Phrurolithus sinicus Zhu et Mei 中華刺足蛛 (Hu, 1984:304; Song, 1987:330)
Phrurolithus sinicus Zhu et Mei, 1982:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：陝西、河北、甘肅、吉林。

Ctenidae 櫛足蛛科

Anahita fauna Karsch 田野安蛛 (Feng, 1990:174; He, et al., 1991:137; Hu, 1984:306; Song, 1987:333)
Anahita fauna Karsch, 1879:
別 名：*黃豹櫛蛛*。
棲 息：稻田；山區林間的草叢或原野草地。
捕 食：稻縱捲葉螟。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、香港、浙江、安徽、河南、陝西、山東、北京、吉林。

Anahita multidentata Schenkel 多齒狡蛛 (Hu, 1984:308)
Anahita multidentata Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Zora nemoralis (Blackwall) 森林狼櫛蛛 (Hu, 1984:308)
Zora nemoralis (Blackwall, 1861:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Zora spinimana (Sundevall) 刺狼櫛蛛 (Hu, 1984:308)
Zora spinimana (Sundevall, 1833:)
棲 息：習性與絞蛛相同。
捕 食 性。
分 佈：吉林。

Eusparassidae (Heteropodidae) 巨蟹蛛科

Heteropoda amphora Fox 對巨蟹蛛 (Hu, 1984:311)
Heteropoda amphora Fox, 1936:
棲 息：

捕 食 性。
分 佈：廣東、四川。

Heteropoda forcipata (Karsch) 鉗巨蟹蛛 (Hu, 1984:311)
Heteropoda forcipata (Karsch, 1881:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川。

Heteropoda grahami Fox 格里巨蟹蛛 (Hu, 1984:311)
Heteropoda grahami Fox, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Heteropoda hamata Fox 黑斑巨蟹蛛 (Hu, 1984:311)
Heteropoda hamata Fox, 1937:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Heteropoda licenti Schenkel 北巨蟹蛛 (Hu, 1984:309)
Heteropoda licenti Schenkel, 1953:
棲 息：山地或旱田如花生地。
捕 食：蚜蟲、鱗翅目、雙翅目等害蟲。
分 佈：山東、遼寧。

Heteropoda minshana Schenkel 岷山巨蟹蛛 (Hu, 1984:311)
Heteropoda minshana Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Heteropoda stellata Schenkel 星巨蟹蛛 (Hu, 1984:311)
Heteropoda stellata Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河南、甘肅。

Heteropoda venatoria (Linnaeus) 狩獵巨蟹蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:276; Feng, 1990:175; He, et al., 1991: 137; Hu, 1984:311; Zhang, 1983:31)
Aranea venatoria Linnaeus, 1767:1035.
=*Aranea regia* Fabricius, 1793:408.
=*Aranea pallens* Fabricius, 1798:291.

Heteropoda venatoria Latreille, 1804:135.
=*Thomisus leucosius* Walckenaer, 1805:36.
=*Micrommata setulosa* Perty, 1833:195.
=*Olios antillianus* Walckenaer, 1837:568.
=*Olios colombianus* Walckenaer, 1837:571.
=*Ocypete pallens* C. L. Koch, 1838:82.
=*Ocypete murina* C. L. Koch, 1845:36.
=*Ocypete draco* C. L. Koch, 1845:44.
=*Olios javensis* Doleschall, 1857:428.
=*Olios gabonensis* Lucas, 1858:407.
=*Olios zonatus* Doleschall, 1859:54.
=*Sparassus ammanita* Dufour, 1863:9.
=*Ocypete brunneiceps* Giebel, 1863:320.
=*Olios regius* Gerstacken, 1873:482.
=*Heteropoda ferina* Simon, 1887:102.
=*Heteropoda ocellata* Pocock, 1903:

別 名：*白額巨蟹蛛*。
棲 息：水田、菜園、室內外牆壁上，多在夜間掠食蟑螂。
捕 食：*Periplaneta americana* Linnaeus 美洲大蠊(Cockroaches)
Blatella spp. 蜚蠊
Erionota thrax (Linnaeus) 蕉弄蝶
Diptera 雙翅目(蠅類)
Hymenoptera 膜翅目(蜂類)。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北；廣泛(Cosmopolitan)，日本、菲律賓、印度、美國。

Heteropoda venatoria maculipes Strnad 斑白巨蟹蛛 (Hu, 1984:311)
Heteropoda venatoria maculipes Strnad, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Heteropoda virgata Fox 小枝巨蟹蛛 (Hu, 1984:311)
Heteropoda virgata Fox, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Selenopidae 擬扁蛛科

Selenops bursarius Karsch 袋擬扁蛛 (He, et al., 1991:137; Song, 1987:332)
Selenops bursarius Karsch, 1879:
別 名：*黑斑擬扁蛛*。
棲 息：樹幹或房屋牆上。
捕 食 性。

分 佈：臺灣、浙江、江蘇、河南。

Selenops henanensis Zhu et Mao 豫擬扁蛛 (Feng, 1990:176; He, et al., 1991:137; Hu, 1984:312)

Selenopos henanensis Zhu et Mao, 1983:
棲 息：山地林間，徘徊于樹幹；稻田或室內墻壁上。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江、江蘇、河南。

Selenops szechuanensis Schenkel 四川擬扁蛛 (Hu, 1984:312)

Selenops szechuanensis Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Thomisidae 蟹蛛科

Bassaniana decorata (Karsch) 美麗羽蛛 (Feng, 1990:180; Wu et Chen, 1980(4):47)

Oxyptila decorata Karsch, 1879:
棲 息：松樹縫隙間。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、上海、陝西、山東。

Coriarachne melancholica Simon 黑革蟹蛛 (ASZI, 1987, 2:871; Feng, 1990:177; Hu, 1984:315; Song, 1987:253; Song et al., 1982:258; Zhao, 1984:5)

Coriarachne melancholica Simon, 1880:
棲 息：林區樹皮下，棉田或菜園。
捕 食 性。
分 佈：河南、河北、北京、青海。

Diaea subdola O.P. Cambrige 陷狩蛛 (Song et al., 1997:1729)

Diaea subdola O.P. Cambrige, 1885:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川、浙江、陝西、山東、山西；朝鮮、日本。

Heriaeus mellottei Simon 白斑褐綠蟹蛛 (He, et al., 1991:137; Hu, 1984:316)

Heriaeus mellottei Simon, 1886:
=*Heriaeus oblongus* Simon, 1918:
別 名：*橢圓草蛛*。
棲 息：棉田及黃菸田，或山地草叢間。
捕 食 性。
分 佈：河南、山東。

Heriaeus oblongus Simon 長毛蟹蛛 (ASZI, 1987, 2:872; Hu, 1984:316; Liu, 1987:223; Song, 1987:254)

Heriaeus oblongus Simon, 1918:

棲 息：果樹葉上。

捕 食：蚜蟲

葉蟎。

分 佈：湖北、陝西、北京、山西、內蒙古、黑龍江；亞洲、歐洲。

Lysiteles badongensis Song et Chai 巴東微蟹蛛 (Song et al., 1997:1730)

Lysiteles badongensis Song et Chai, 1990:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Lysiteles maius Ono 邁微蟹蛛 (Feng, 1990:178)

Lysiteles maius Ono, 1979:

棲 息：橘園、李樹樹葉上。

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Misumena vatia (Clerck) 弓足梢蛛 (He, et al., 1991:137; Zhao, 1984:5)

Misumena vatia (Clerck, 1757:)

棲 息：棉田。

捕 食 性。

分 佈：河南、陝西。

Misumenops arcigera (Grube) 弧形花蛛 (Hu, 1984:321)

Misumenops arcigera (Grube, 1862:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：黑龍江(烏蘇里)。

Misumenops hubeiensis Song et Zhao 湖北花蛛 (Song et al., 1997:1730)

Misumenops hubeiensis Song et Zhao, 1994:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川、湖北。

Misumenops japonica (Boesenberg et Strand) 日本花蛛 (He, et al., 1991:137; Hu, 1984:318)

Misumenops japonica (Boesenberg et Strand, 1906:)

棲 息：旱田作物間，常在植物花穗附近徘徊。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、四川、湖北、河南、陝西。

Misumenops pseudovatia Schenkel 擬弓足花蛛 (Hu, 1984:321)

Misumenops pseudovatia Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Misumenops tricuspidatus (Fabricius) 三突花蛛 (ASZI, 1987, 2:870; Cang et al., 1989:70-76; Cao, 1986:182; Chai et al., 1991:91; Dai, 1995, 11(4):184; Dai, 1999, 21(4):167; Dong, 1984:91; Dong, 1987, 14(1):28, 64; Dong, 1988:85; Feng, 1990:179; He, et al., 1991:137; Hu, 1984: 319; Hu et al., 1991:113-117; Li, 1981(1-2):84; Li et al., 1983:113; Lin et Qian, 1981(1-2):92; Lu et al., 1986:63; Niu et Liu, 1981(3):22; Pan et al., 1995, 4(1):41-44; Qu et al., 1985, 2(2):149-150; Qu et al., 1986:142; Shi, 1980[ed.]:128; Shi et al., 1989-90:88; Shu et Yu, 1985:93; Song, 1987:255; Wang et al., 1989:128; Wu et Ji, 1989:151-155; Wu et al., 1991:28; Wu et al., 1991:101;Wu-xing, 1979:26; Xiao et al., 1991:120; Xie, 1990:137-138; Xie et al., 1999, 21(2):87; Xu et al., 1987:140; Zhang, 1983:31; Zhang et al., 1994, 16(1):12; Zhao et Li, 1991:1-4; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zhao, 1984:5; Zhao et al., 1991, 13(1):1-4; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)

Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775:)

棲 息：花草叢、大豆田、棉田、花生田、麥田、油菜田、稻田中、荻和蘆葦田、橘園、菜園、茶園、果園、森林害蟲重要天敵。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

Adelphocoris suturalis 中黑盲蝽

Lygus lucorum 綠盲蝽

黑尾葉蟬

棉葉蟬

稻飛蝨

稻蚜

棉蚜

Brevicoryne brassicae 菜蚜(甘藍蚜)

Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜

Myzys persicae 桃蚜

蚜蟲

Coleophora laricella Hübner 落葉松鞘蛾

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(成蟲、幼蟲)

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(成蟲、幼蟲)

瓜野螟

豆野螟

棉捲葉蛾

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲

棉小造橋蟲

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾

棉葉螨

Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)

Cinara laricicola 落葉松大蚜

菜青蟲

葉蟎
茶園食蚜蠅成蟲及幼蟲
Cladius pectinicornis (Linnaeus) 玫瑰櫛角葉蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陜西、山東、山西、河北、北京、天津、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Misumenops vatia (Clerck) 弓足花蛛 (Hu, 1984:320)
Misumenops vatia (Clerck, 1757:)
Misumenops calycina (L)
棲 息：農田。
捕 食 性。
分 佈：河南、陜西、甘肅、內蒙古、吉林。

Misumenops sp. 花蛛 (Shi et al., 1989-90:88)
棲 息：橘園。
捕 食 性。
分 佈：上海。

Monaeses aciculus (Simon) (Barrion et Litsinger, 1995:220)
Mecostrabus aciculus Simon, 1903:727.
Monaeses aciculus, Ono, 1985:93.
棲 息：
捕 食：*Echinochloa crusgali* ssp. *hispidula*。
分 佈：臺灣；日本、菲律賓、越南、尼泊爾。

Monaeses caudatus Tang et Song 長尾蟹蛛 (Tang et Song, 1988:245)
Monaeses caudatus Tang et Song, 1988:245-246.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西(宜豐)。

Oxyptila coreana Paik 朝鮮羽蛛 (Hu, 1984:321; Zhao, 1984:5)
Oxyptila coreana Paik, 1974:
棲 息：棉田、山坡梯田或林間的草叢間。
捕 食 性。
分 佈：河南、陜西、山東、河北、甘肅。

Oxyptila crucifera Schenkel 十字羽蛛 (Hu, 1984:325)
Oxyptila crucifera Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Oxyptila decorata Karsch 美麗羽蛛 (ASZI, 1987, 2:872; He, et al., 1991:137; Hu, 1984:323; Song, 1987:257; Zhao, 1984:5)

Oxyptila decorata Karsch, 1879:
=*Xysticus pichoni* Schenkel, 1963:205-207.
棲 息：棉田、旱地、果樹上、針葉松樹皮之縫隙間。
捕 食：*Matsucoccus matsumurae* Kuwana 松幹蚧。
分 佈：浙江、湖北、河南、陝西、山東、寧夏、遼寧、吉林；日本。

Oxyptila hoshizuna Ono 沖繩綠蟹蛛 (Feng, 1990:181; He, et al., 1991:137)

Oxyptila hoshizuna Ono, 1978:
棲 息：果園樹幹或草叢間。
捕 食 性。
分 佈：廣西、浙江。

Oxyptila ineaqualis (Kulczynski) 不等羽蛛 (Hu, 1984:325)

Oxyptila ineaqualis (Kulczynski, 1901:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Oxyptila jeholensis Saito 內蒙羽蛛 (Hu, 1984:325)

Oxyptila jeholensis Saito, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河北。

Oxyptila lugubris (Kroneberg) 暗黑羽蛛 (Hu, 1984:325)

Oxyptila lugubris (Kroneberg, 1875:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Oxyptila lutulenta Schenkel 褐黃羽蛛 (Hu, 1984:325)

Oxyptila lutulenta Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：青海、甘肅。

Oxyptila pseudoblitea Simon 擬德羽蛛 (Hu, 1984:325; Song, 1987:258)

Oxyptila pseudoblitea Simon, 1880:109.
=*Xysticus chaffanjoni* Schenkel, 1963:225-226.
=*Xysticus acerboides* Schenkel, 1963:229-231.
=*Xysticus bonneti* Schenkel, 1963:231-232.

別 名：*三斑羽蛛*。
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山東、山西、河北、北京、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江。

Oxyptila raniceps Schenkel 蛙羽蛛 (Hu, 1984:325)

Oxyptila raniceps Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：青海、甘肅。

Oxyptila rauda Simon 勞德羽蛛 (Hu, 1984:325)

Oxyptila rauda Simon, 1875:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅、內蒙古。

Oxyptila wuchangensis Tang et Song 武昌羽蛛 (Tang et Song, 1988:246; Song et al., 1997:1731)

Oxyptila wuchangensis Tang et Song, 1988:246-248.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北(武昌)。

Oxyptila sp. 羽蛛 (Hu, 1984:323)

Oxyptila sp. Hu, 1984:323.
棲 息：山地林間
捕 食 性。
分 佈：山東。

Oxytate hoshizuna Ono 沖繩綠蟹蛛 (Hu, 1984:327; Song, 1987:260; Song et Liu, 1982:449)

Oxytate hoshizuna Ono, 1978:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣西；琉球群島。

Oxytate parallela (Simon) 平行綠蟹蛛 (Dong, 1988:85; Feng, 1990:182; Hu, 1984:325; Shu et Yu, 1985:93; Song, 1987:260; Song et al., 1982:257; Zhao, 1984:5)

Oxytate parallela (Simon, 1880:)
=*Oxytate striatipes* Koch, 1878:
=*Oxytate setosa* Karsch
=*Dieta japonica* Boesenberg et Strand
棲 息：近水邊核桃樹葉上或草叢中，山區梯田、平原棉田、旱田的作物間。
捕 食：*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾。
分 佈：臺灣、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、遼寧。

Oxytate sp. 尖尾蛛 (Li et al., 1983:113)

Oxytate sp. Li et al., 1983:113.
棲 息：花生田。
捕 食 性。
分 佈：河南。

Philodromus amitinus Chamberlin 親逍遙蛛 (Hu, 1984:333)

Philodromus amitinus Chamberlin, 1924:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：福建。

Philodromus auricomus L. Koch 耳斑逍遙蛛 (Feng, 1990:190; Hu, 1984:328)

Philodromus auricomus L. Koch, 1878:
別 名：*白腹逍遙蛛*。
棲 息：核桃果園，棉田、山地、林間及灌木叢中，不結網。
捕 食 性。
分 佈：河南、陝西、山東、北京。

Philodromus cespitum (Walckenaer) 草皮逍遙蛛 (ASZI, 1987, 2:873; Feng, 1990:191; He, et al., 1991:138; Hu, 1984:329; Li, 1981(1-2):84; Li et al., 1983:113; Liu et al., 1981(4):26-27; Niu et Liu, 1981(3):22; Qu et al., 1985, 2(2):149-150; Song, 1987:262; Wang et al., 1989:129; Zhao, 1984:5)

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802:)
=*Philodromus aureolus* (Clerck, 1757:)
=*Philodromus reussi* Boesenberg
別 名：*草地逍遙蛛*，*金黃逍遙蛛*。
棲 息：旱田、水田、稻田、棉田、花生田、大豆田、荻和蘆葦田、林間及果園的草叢間。
捕 食：盲椿
跳蟬
大豆根潛蠅
大豆蚜
鱗翅目(幼蟲)
稻葉蟬
稻飛蝨
棉象
蠅類。
分 佈：湖南、雲南、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；亞洲、歐洲。

Philodromus cinerascens Cambridge 灰色逍遙蛛 (Hu, 1984:333)

Philodromus cinerascens Cambridge

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Philodromus emarginatus orientalis Schenkel 東凹緣逍遙蛛 (Hu, 1984:333)

Philodromus emarginatus orientalis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Philodromus fallax Sundevall 虛逍遙蛛 (Zhou et Song, 1985, 2(2/3):273)

Philodromus fallax Sundevall, 1833:
棲 息：麥、棉等農田、水渠邊草中。
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Philodromus flavidus Saito 黃色逍遙蛛 (Hu, 1984:330)

Philodromus flavidus Saito, 1934:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：遼寧、吉林。

Philodromus lanchouensis Schenkel 蘭州逍遙蛛 (Hu, 1984:331; Song, 1987:264)

Philodromus lanchouensis Schenkel, 1963:
棲 息：果樹上。
捕 食 性。
分 佈：青海、寧夏、甘肅、內蒙古、遼寧。

Philodromus mongolicus Schenkel 蒙古逍遙蛛 (Hu, 1984:333)

Philodromus mongolicus Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古。

Philodromus reussi Boesenberg 四點逍遙蛛 (He, et al., 1991:138)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Philodromus rufus Walckenaer 紅棕逍遙蛛 (He, et al., 1991:138; Hu, 1984:332; Song, 1987:265)

Philodromus rufus Walckenaer, 1825:
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：雲南、青海、甘肅、陝西、北京、遼寧、吉林。

Philodromus soderbomi Schenkel 蘇氏逍遙蛛 (Hu, 1984:333)

Philodromus soderbomi Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Philodromus spinitarsis Simon 刺跗逍遙蛛 (ASZI, 1987, 2:874; Dong, 1988:85; Feng, 1990:192; He, et al., 1991:138; Hu, 1984:332; Li et al., 1983:113; Shu et Yu, 1985:93; Song, 1987:265; Wu-xing, 1979:26; Xie, 1990:137-138)

Philodromus spinitarsis Simon, 1895:
=*Philodromus davidi* Schenkel
棲 息：稻田、棉田、花生田、灌木林的枝葉或莖幹上捕食小型昆蟲。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、寧夏、新疆。內蒙古、遼寧、吉林；日本。

Philodromus subaureolus Boesenberg et Strand 土黃逍遙蛛 (Feng, 1990:193; He, et al., 1991:138; Hu, 1984:333)

Philodromus subaureolus Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田、灌木叢或旱田作物間。
捕 食：害蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、貴州、浙江、湖北、山東、新疆、吉林。

Phrynarachne katoi Chikuni 蟹形疣突蛛 (Feng, 1990:183)

Phrynarachne katoi Chikuni, 1955:
棲 息：灌木叢及果園樹幹上。
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江。

Pistius truncatus (Pallas) 直截腹蛛 (Hu, 1984:334; Zhao, 1984:5)

Pistius truncatus (Pallas, 1772:)
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：湖北、河南、陝西、北京、遼寧、吉林。

Runcinia albostriata Boesenberg et Strant 白條鋸足蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:224; Chai et al., 1991:91; Dai, 1997, 19(1):43; Dong, 1988:85; Feng, 1990:184; He, et al., 1991:138;, Hu, 1984:334; Song, 1987:267; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:39; Xu et al., 1987:140; Zhang, 1983:31; Zhang et al., 1994, 16(1):12; Zhao, 1984:5; Zong et al., 1986:119)

Runcinia albostriata Boesenberg et Strand, 1906:252.
棲 息：菜園、稻田葉叢間、棉田、茶園、山區農田、果園。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻飛蝨
稻葉蟬
蚜蟲
瓜野螟(幼蟲)
Dendrolimus punctatus (Wakler)　馬尾松毛蟲
茶叢間小型昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北；朝鮮、日本、菲律賓、印尼、泰國、Myanmar.

Runcinia caudata Schenkel　具尾鋸足蛛 (Hu, 1984:335)
Runcinia caudata Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Runcinia lateralis (C. L. Koch)　側鋸足蛛 (Hu, 1984:335)
Runcinia lateralis (C. L. Koch, 1838:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Synaema globosum (Fabricius)　圓葉花蛛 (ASZI, 1987, 2:869; Dong, 1988:85; Feng, 1990:185; He, et al., 1991:138; Hu, 1984:335; Li, 1981(1-2):84; Nie et Liu, 1981(3):22; Song et al., 1997:1732; Xie et al., 1999, 21(2):87; Zhang, 1983:31; Zhang et al., 1994:12; Zhao, 1984:5)
Synaema globosa Fabricius, 1775:
=*Synaema japonicum* Karsch, 1879:
別 名：*花葉蛛*。
棲 息：菜園、棉田、農田作物、山地樹叢林間、果園、草地等處，不結網
捕 食：稻葉蟬
葉蟬
稻飛蝨
蚜蟲
瓜野螟(幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius)　斜紋夜蛾
菜青蟲
鱗翅目(幼蟲)
葉蟎。
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯、歐洲。

Synaema japonicum Karsch　圓花葉蛛 (Song, 1987:268)
Synaema japonicum Karsch, 1879:

棲 息：農田、山地、樹叢、草地等。
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、浙江、陝西、山西、河北、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江。

Synaema zonatum Tang et Song 帶花葉蛛 (Tang et Song, 1988:248)
Synaema zonatum Tang et Song, 1988:248.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南(大庸)。

Thanatus albomaculatus Kulczynski 白斑狼蟹蛛 (Hu, 1984:338)
Thanatus albomaculatus Kulczynski, 1908:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Thanatus coreanus Paik 朝鮮狼蟹蛛 (Zhao, 1984:5)
Thanatus coreanus Paik, 1979:
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：河南。

Thanatus formicinus (Clerck) 蟻狼蟹蛛 (Dai, 1997, 19(1):43; 1999, 21(4):167; Dong, 1988:85; He, et al., 1991:138; Hu, 1984:336; Li et al., 1983:113; Zhang, 1983:31; Zhao, 1984:5)
Thanatus formicinus (Clerck, 1758:)
棲 息：棉田、玉米田、花生田、菜園、稻田、茶園、果園、山地草叢間。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
小型昆蟲。
分 佈：貴州、四川、浙江、湖北、河南、陝西、山東、河北、青海、甘肅、遼寧。

Thanatus labefactus Karsch 角紅蟹蛛 (Li et al., 1983:113)
棲 息：花生田。
捕 食 性。
分 佈：河南。

Thanatus miniacens Simon 朱色小狼蟹蛛 (Feng, 1990:194; Hu, 1984:338; Song, 1987:269)
Thanatus miniacens Simon, 1880:
別 名：*小狼逍遙蛛*，*朱色狼蟹蛛*。
棲 息：農田、果園；丘陵灌木叢或草叢。
捕 食 性。
分 佈：河北、北京、遼寧。

Thanatus stripatus Tikader 條紋狼蟹蛛 (Hu, 1984:338)

Thanatus stripatus Tikader, 1980:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏(南木林)。

Thanatus vulgaris Simon 普通狼蟹蛛 (Zhou et Song, 1985, 2(3/4):272)
Thamatus vulgaris Simon, 1874:
棲 息：麥、稻、玉米、棉等農田、菜地、果園及其防護林帶草叢等。
捕 食：蚜蟲、粉蝨、葉蟬等害蟲。
分 佈：新疆。

Thomisus albinus Cantor 白蟹蛛 (Hu, 1984:339)
Thomisus albinus Cantor, 1842:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江蘇(舟山)。

Thomisus albus (Gmelin) 白色蟹蛛 (He, et al., 1991:138; Hu, 1984:338; Zhao, 1984:5)
Thomisus albus (Gmelin, 1788:)
=*Thomisus onustus* Walckenaer
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：河南、甘肅、新疆、內蒙古、吉林。

Thomisus bicoloratus Cantor 兩色蟹蛛 (Hu, 1984:339)
Thomisus bicoloratus Cantor, 1843:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江蘇(舟山)。

Thomisus formosae Strand 臺灣蟹蛛 (Hu, 1984:340)
Thomisus formosae Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Thomisus grubei Simon 戈壁蟹蛛 (Hu, 1984:340)
Thomisus grubei Simon, 1895:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Thomisus kiangsiensis Schenkel 江西蟹蛛 (Hu, 1984:340)
Thomisus kiangsiensis Schenkel, 1963:

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西。

Thomisus labefactus Karsch 角紅蟹蛛 (Chai et al., 1991:91; Feng, 1990:186; He, et al., 1991:138; Hu, 1984:338; Zhao, 1984:5)

Thomisus labefactus Karsch, 1881:
棲 息：稻田、麥田、棉田和其他農田，灌木叢及花草間。
捕 食：稻葉蟬
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、新疆。

Thomisus marginifrons Schenkel 緣額蟹蛛 (Hu, 1984:340)

Thomisus marginifrons Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Thomisus okinawensis Strand (Barrion et Litsinger, 1995:229)

Thomisus okinawensis Strand, 1907:202.
=*Themisus formosae* Strand, 1907:204.
=*Thomisus picaceus* Simon, 1908:135.
=*Thomisus formosanus* Bonnet, 1957:4580.
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本、菲律賓、印尼、泰國。

Thomisus onustoides Boesenberg et Strand 三角蟹蛛 (Hu, 1984:338)

Thomisus onustoides Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：多在花瓣中活動。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、香港、四川。

Thomisus serrei Schenkel 鋸形蟹蛛 (Hu, 1984:340)

Thomisus serrei Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：上海。

Thomisus swatowensis Strand 汕頭蟹蛛 (Hu, 1984:340)

Thomisus swatowensis Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：廣東。

Thomisus taurinus Schenkel 牛蟹蛛 (Hu, 1984:340)

Thomisus taurinus Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Thomisus zhui Tang et Song 朱氏蟹蛛 (Tang et Song, 1988:249)

Thomisus zhui Tang et Song, 1988:249-250.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Tibellus oblongus (Walckemaer) 長蟹蛛 (Dai, 1997, 19(1):43; 1999, 21(4):167; He, et al., 1991:138; Hu, 1984:340; Li et al., 1983:113; Song, 1987:270)

Tibellus oblongus (Walckemaer, 1802:)

別 名：*短胸長蟹蛛*。

棲 息：水田、棉田、花生田、茶園、旱田、果園、牧場、草原。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

小型昆蟲。

分 佈：貴州、廣東、湖南、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、新疆、內蒙古、吉林。

Tibellus parallelus (Koch) 平行長蟹蛛 (Song, 1987:271)

Tibellus parallelus (Koch, 1837:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Tibellus semiannularis Tang 半環長逍遙蛛 (Feng, 1990:195)

Tibellus semiannularis Tang, 1986:

棲 息：稻株。

捕 食 性。

分 佈：海南、廣東、四川。

Tibellus tenellus (L. Koch) 嬌長蟹蛛 (Feng, 1990:196; He, et al., 1991:138; Hu, 1984:341; Song, 1987: 272; Zhao, 1984:5)

Tibellus tenellus (L. Koch, 1876:)

別 名：*柔弱長蟹蛛*，*柔弱長逍遙蛛*。

棲 息：果園、玉米田、棉田或其他旱田的經濟作物、果園或灌木林間。

捕 食 性。

分 佈：河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、吉林。

Tibellus sp. 長蟹蛛 (Li et al., 1983:113)

Tibellus sp. Li et al., 1983:113.
棲 息：花生田。
捕 食 性。
分 佈：河南。

Tmarus hanrasanensis Paik 斜額峭腹蛛 (Hu, 1984:245; Song, 1987:273)

Tmarus hanrasanensis Paik, 1973:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：吉林。

Tmarus oreintalis Schenkel 東方峭腹蛛 (ASZI, 1987, 2:872; Feng, 1990:187; Hu, 1984:342; Song, 1987:273; Zhao, 1984:5)

Tmarus oreintalis Schenkel, 1963:
棲 息：棉田、山區或丘陵地帶的灌木林間。
捕 食 性。
分 佈：河南、陝西、山東、山西、河北、北京。

Tmarus piger (Walckenaer) 角突峭腹蛛 (Hu, 1984:342; Li et al., 1983:113; Song, 1987:275; Zhao, 1984:5)

Tmarus piger (Walckenaer, 1802:)
棲 息：棉田、花生田。
捕 食 性。
分 佈：河南、陝西、河北、甘肅、吉林。

Tmarus qinlingensis Song et Wang 秦嶺蛸腹蛛 (Song et Wang, 1994:48)

Tmarus qinlingensis Song et Wang, 1994:48-49.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：陝西(秦嶺)。

Tmarus rimosus Paik 裂峭腹蛛 (Hu, 1984:345; Song, 1987:276)

Tmarus rimosus Paik,1973:
別 名：*裂突峭腹蛛*。
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：河北、北京、內蒙古、遼寧、吉林。

Tmarus taibaiensis Song et Wang 太白蛸腹蛛 (Song et Wang, 1994:47)

Tmarus taibaiensis Song et Wang, 1994:47-48.
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：陝西(秦嶺太白山)。

Tmarus taishanensis Zhu et Wen 泰山峭腹蛛 (Hu, 1984:344; Song, 1987:278)

Tnarus taishanensis Zhu et Wen, 1981:
棲 息：禾本科植物葉子頂端。
捕 食 性。
分 佈：山東(泰山)。

Tmarus taiwanus Ono 臺灣峭腹蛛 (Hu, 1984:345; Song, 1987:279)

Tmarus taiwanus Ono, 1977:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Tmarus yiminhensis Zhu et Wen 伊敏峭腹蛛 (Hu, 1984:344; Song, 1987:270)

Tmarus yiminhensis Zhu et Wen, 1981:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Tmarus sp. 峭腹蟹蛛 (Li et al., 1983:113)

Tmarus sp. Li et al., 1983:113.
棲 息：花生田。
捕 食 性。
分 佈：河南。

Xysticus acerboides Schenkel 針形花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus acerboides Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Xysticus albomarginatus Tang et Song 白緣花蟹蛛 (Song et Haupt, 1996:316; Tang et Song, 1988:250)

Xysticus albomarginatus Tang et Song, 1988:250-251.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏、青海。

Xysticus alsus Song et Wang 高寒花蟹蛛 (Song et Wang, 1994:46)

Xysticus alsus Song et Wang, 1994:46-47.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：陝西(秦嶺太白山)。

Xysticus altaicus Simon 阿泰花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus altaicus Simon, 1895:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Xysticus audax (Schrank) 莽闖花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus audax (Schrank)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Xysticus berlandi Schenkel 布氏花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus berlandi Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Xysticus bifasciatius (L. Koch) 比法花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus bifasciatius (L. Koch)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Xysticus bonneti Schenkel 包氏花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus bonneti Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西、青海、甘肅。

Xysticus chaffanjoni Schenkel 查氏花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus chaffanjoni Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古、黑龍江。

Xysticus cristatus (Clerck) 羽冠花蟹蛛 (Hu, 1984:345; Song, 1987:280)

Xysticus cristatus (Clerck, 1757:)
別 名：*冠花蟹蛛*。
棲 息：果園、桑園及雲杉中的小灌木叢。
捕 食 性。
分 佈：新疆(于田)。

Xysticus croceus Fox 波紋花蟹蛛 (ASZI, 1987, 2:871; Dong, 1988:85; Feng, 1990:188; He, et al., 1991:139; Hu, 1984L345; Li et al., 1983:113; Shi et al., 1989-90:88; Song et al., 1997:1732:Zhang, 1983:31; Zhao, 1984:5; Zong et al., 1984:249)

Xysticus croceus Fox, 1937:

別 名：*褐蟹蛛*。

棲 息：稻田、棉田、花生田、麥田、橘園、旱地作物葉面。

捕 食：稻葉蟬

稻飛蝨

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西；日本。

Xysticus denisi Schenkel 鄧氏花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus denisi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Xysticus dissimilis Zhu et Wang 異形花蟹蛛 (Hu, 1984:347)

Xysticus dissimilis Zhu et Wang, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(圖里河)。

Xysticus dolpoensis Ono 多爾波花蟹蛛 (Song et Haupt, 1996:316)

Xysticus dolpoensis Ono, 1978:

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川、青海；尼泊爾。

Xysticus ephippiatus Simon 鞍形花蟹蛛 (ASZI, 1987, 2:870; Chai et al., 1991:91; Dai, 1999, 21(4):167; Du et al., 1998, 20(2):86-89; Feng, 1990:189; He, et al., 1991:139; Hu, 1984:347; Li, 1981(1-2):84; Li et al., 1983:113; Song, 1987:281; Song et al., 1997:1732; Zhao, 1984:5)

Xysticus ephippiatus Simon, 1880:

棲 息：稻區、玉米、高粱、蠶豆、花生田、棉田、茶園、柑橘園、各類旱田、山林及矮小草叢間，不結網。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

Adelphocoris suturalis 中黑盲蝽

Lygus lucorum 綠盲蝽

稻葉蟬

稻飛蝨

Apochemia sp. 尺蠖(蘋果園)

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

稻田鱗翅目(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、俄羅斯、日本。

Xysticus ferrugindoides Schenkel 花蟹蛛 (He, et al., 1991:139; Hu, 1984:352)

Xysticus ferrugindoides Schenkel, 1963:

別 名：*銹色蟹蛛*。

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古、黑龍江。

Xysticus furcillifer Schenkel 小花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus furcillifer Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Xysticus hedini Schenkel 赫定花蟹蛛 (Hu, 1984:352; Song et al., 1997:1734)

Xysticus hedini Schenkel, 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南、浙江、湖北、山東、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本。

Xysticus hotingchiehi Schenkel 華南花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus hotingchiehi Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Xysticus kochi Thorell 中突花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus kochi Thorell, 1845:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：吉林。

Xysticus lateralis atrimaculatus Boesenberg et Strand 瓦紋花蟹蛛 (He, et al., 1991:139; Hu, 1984:348)

Xysticus lateralis atrimaculatus Boesenberg et Strand, 1906:

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：貴州、湖南。

Xysticus laticeps Schenkel 乳色花蟹蛛 (Hu, 1984:352; Song et Haupt, 1996:316)

Xysticus laticeps Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：青海、甘肅、內蒙古。

Xysticus lesoerti Schenkel 雙孔花蟹蛛 (Song, 1987:282)

Xysticus lesoerti Schenkel, 1963:

棲 息：金針地。

捕 食 性。

分 佈：貴州、浙江。

Xysticus lesserti Schenkel 雙孔花蟹蛛 (He, et al., 1991:139)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：四川。

Xysticus minimus Schenkel 微花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus minimus Schenkel, 1953:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Xysticus mongolicus Schenkel 蒙古花蟹蛛 (Hu, 1984:349; Song, 1987:284; Zhao, 1984:6)

Xysticus mongolicus Schenkel, 1963:

棲 息：苜蓿地、棉田。

捕 食 性。

分 佈：新疆、內蒙古。

Xysticus obtusfurcus Tang et Song 鈍叉花蟹蛛 (Tang et Song, 1988:251)

Xysticus obtusfurcus Tang et Song, 1988:251-252.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古、吉林。

Xysticus pseudobifasciatus Schenkel 擬花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus pseudobifasciatus Schenkel. 1936:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Xysticus quadratus Tang et Song 方花蟹蛛 (Tang et Song, 1988:252)

Xysticus quadratus Tang et Song, 1988:252-253.

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川。

Xysticus saganus Boesenberg et Strand 斜紋花蟹蛛 (Dai, 1999, 21(4):167; Dong, 1988:85; He, et al., 1991:139; Hu, 1984;349; Zhang, 1983:31; Zhao, 1984:5)

Xysticus saganus Boesenberg et Strand, 1906:
=*Xysticus tunicatus* Boesenberg et Strand
棲 息：棉田、菜園、茶園、大豆田或其他旱田作物間。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
茶樹枝葉間各類昆蟲。
分 佈：貴州、四川、江蘇、湖北、陝西、山東、山西、新疆、吉林。

Xysticus sibiricus Kulczynski 稀花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus sibiricus Kulczynski, 1908:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Xysticus sjostedti Schenkel 斯氏花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus sjostedti Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Xysticus soderbomi Schenkel 蘇氏花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus soderbomi Schenkel, 1936:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Xysticus striatipes L. Koch 條紋花蟹蛛 (ASZI, 1987, 2:871; Dong, 1988:85; He, et al., 1991:139; Hu, 1984:350; Li et al., 1983:113; Shu et Yu, 1985:93; Song, 1987: 285; Zhao, 1984:5)

Xysticus striatipes L. Koch, 1870:
棲 息：水田、花生田、棉田、山坡或灌木叢中。
捕 食：*Hyphantia cunea* (Drury) 美國白蛾(幼蟲)。
分 佈：江蘇、安徽、湖北、河南、山東、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；亞洲、歐洲。

Xysticus szetschuanensis Schenkel 四川花蟹蛛 (He, et al., 1991:139; Hu, 1984:351)

Xysticus szetschuanensis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。

分 佈：四川、青海、陝西。

Xysticus torsivus Tang et Song 旋扭花蟹蛛 (Tang et Song, 1988:253)

Xysticus torsivus Tang et Song, 1988:253-255.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川。

Xysticus ulmi (Hahn) 榆樹花蟹蛛 (Hu, 1984;351)

Xysticus ulmi (Hahn, 1831:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：吉林。

Xysticus vachoni Schenkel 魏氏花蟹蛛 (Hu, 1984:352)

Xysticus vachoni Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：內蒙古、黑龍江。

Xysticus xizangensis Tang et Song 西藏花蟹蛛 (Tang et Song, 1988:255)

Xysticus xizangensis Tang et Song, 1988:255-256.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：西藏(昌都西西)。

Xysticus sp. 花蟹蛛 (Shi et al., 1989-90:88)

棲 息：橘園。

捕 食 性。

分 佈：上海。

蟹蛛 (Feng et al., 1994, 10(3):142)

棲 息：

捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗(蝻)。

分 佈：山西。

Salticidae 跳蛛科

Bianor aenescens (Simon) 微菱頭蛛 (Dai, 1999, 21(4):167; Feng, 1990:197; He, et al., 1991:139; Hu, 1984:353; Sun et al., 1984:111; Zhao, 1984:6)

Bianor aenescens (Simon, 1868:)

棲 息：稻田、棉田、茶園。

捕 食：鱗翅目(幼蟲、成蟲)

Empoasca vitis Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
稻葉蟬
稻飛蝨。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東。

Bianor hotingchiehi Schenkel 黑菱頭蛛 (ASZI, 1987, 2:874; Barrion et Litsinger, 1995:62; Dai, 1997, 19(1):53; Feng, 1990:198; He, et al., 1991:139; Hu, 1984:354; Song, 1987:286; Sun et al., 1984:111; Tang et Zhou, 1983:207-214; Yin et Wang, 1981:268; Zhao, 1984:6)
Bianor hotingchiehi Schenkel, 1963:434.
別 名：*賀氏菱頭蛛*。
棲 息：稻田、棉田、農田中，有時成爲稻田優勢種、茶園。
捕 食：大白翅葉蟬
稻葉蟬
稻飛蝨
稻縱捲葉螟(成蟲)
茶樹枝葉間各種害蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東；越南、Myanmar.

Bianor maculatus (Keyserling) 斑菱頭蛛 (He, et al., 1991:139)
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Carrhotus detritus Boesenberg et Strand 橙黃貓跳蛛 (He, et al., 1991:139; Hu, 1984:355)
Carrhotus detritus Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田、草原或灌木叢中。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、江蘇。

Carrhotus pichoni Schenkel 黑紋貓跳蛛 (He, et al., 1991:140; Hu, 1984:356; Yin et Wang, 1981:269; Zhao, 1984:6)
Carrhotus pichoni Schenkel, 1963:
棲 息：稻田、棉田、山區林間。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨。
分 佈：福建、湖南、貴州、浙江、上海、安徽、湖北、陝西、山東。

Carrhotus xanthogramma (Latreille) 黃線卡蛛 (ASZI, 1987, 2:877; Chai et al., 1991:91; Song, 1987:287; Tang et al., 1995(4):168)
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819:)
=*Carrhotus detritsu* Boesenberg et Strand, 1906:358-391.
=*Carrhotus pichoni* Schenkel, 1963:444-446.

別 名：*黃褐擬蠅虎*。
棲 息：蔬菜地。
捕 食：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧。
分 佈：廣東、浙江、河北。

Chrysilla versicolor (C. L. Koch) 多色麗跳蛛 (ASZI, 1987, 2:877)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、湖北。

Dendyphantes afratus (Karsch) 暗色追蛛 (He, et al., 1991:140; Hu, 1984:357)
Dendyphantes afratus (Karsch, 1881:)
棲 息：稻田、山林中。
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣東、廣西、江蘇、安徽。

Dendyphantes thorelli Kulczynski 曹氏追蛛 (Hu, 1984:358)
Dendyphantes thorelli Kulczynski
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Epocilla calcarata (Karsch) 紅突爪蛛 (Feng, 1990:218)
Epocilla calcarata (Karsch, 1880:)
棲 息：果園枝葉間。
捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西。

Euophrys erratica (Walckenaer) 游蕩斑蛛 (Hu, 1984:361)
Euophrys erratica (Walckenaer)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Euophrys frontalis (Walckenaer) 前斑蛛 (Hu, 1984:358; Zhao, 1984:6)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802:)
棲 息：棉田、草間。
捕 食 性。
分 佈：河南、陝西、北京。

Euophrys trivittata Schenkel 三條斑蛛 (Hu, 1984:358)
Euophrys trivittata Schenkel,1963:

棲 息：溝邊草叢。
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古。

Euophrys undulatovittata Boesenberg et Strand 小帶斑蛛 (Dai, 1997, 19(1):43; 1999, 21(4):167; He, et al., 1991:140; Hu, 1984: 360)
Euophrys undulatovittata Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：稻田、旱田、茶園、山區林間，多在枝葉間捕蟲。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
茶樹枝葉間害蟲。
分 佈：湖南、貴州、四川、安徽、湖北、陝西、山東、吉林。

Evarcha albaria (L. Koch) 白紋獵蛛 (ASZI, 1987, 2:876; Feng, 1990:199; He, et al., 1991:140; Hu, 1984:361; Li et al., 1983:113; Shi et al., 1989-90:89; Song, 1987:290; Song et al., 1997:1734; Zhang, 1983:31; Zhao, 1984:6)
Evarcha albaria (L. Koch, 1878:)
別 名：*白斑獵蛛*。
棲 息：稻叢上或水邊草地、棉田、花生田、菜園、或其他旱田、橘園。
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
鷹翅天蛾(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、天津、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、俄羅斯。

Gedea daoxianensis Song et Gong 道縣格德蛛 (Song et Gong, 1992:291)
Gedea daoxianensis Song et Gong, 1992:291-292.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南(道縣)。

Harmochirus brachiatus (Thorell) 臂蛤莫蛛 (Feng, 1990:205; He, et al., 1991:140; Hu, 1984:362; Zhao, 1984 6)
Harmochirus brachiatus (Thorell, 1877:)
棲 息：稻田葉叢間、果園、大豆田、棉田。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、浙江、安徽、河南、陝西、吉林。

Hasarius adansoni (Savigny et Audouin) 花哈沙蛛 (Barrion et Litsinger, 1995:92; Dai, 1997, 19(1):43; Feng, 1990:206; He, et al., 1991:140; Song et al., 1997:1735)
Attus adansoni Audouin, in Savigny, 1825:169.
Hasarius adansoni, Simon, 1871:330.
=*Tachyscarthmus annamensis* Hogg, 1922:310.
別 名：*阿氏哈沙蛛*。
棲 息：稻田、庭院、墻壁及門窗等向陽處、茶園。
捕 食：地面各類昆蟲。

分 佈：臺灣、貴州、湖南、湖北、新疆。

Icius popivi Proszynski 波氏壯頭蛛 (Hu, 1984:367)

Icius popivi Proszynski, 1979:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：遼寧(大里山)。

Icius pupus Karsch 曲爪壯頭蛛 (He, et al., 1991:140Hu, 1984:368)

Icius pupus Karsch, 1879:
=*Icius iinea* (Karsch)
別 名：*小伊蛛，線紋伊蛛*。
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、新疆。

Icius vavaleriei (Schenkel) 卡氏伊蛛 (ASZI, 1987, 2:878)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州、浙江。

Icius vulpes (Grube) 狐伊蛛 (Song, 1987:303)

Icius vulpes (Grube, 1861:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：吉林。

Jotus difficilis Boesenberg et Strand 機敏蠅豹 (Dai, 1997, 19(1):43; 1999, 21(4):167; Hu, 1984;369)

Jotus difficilis Boesenberg et Strand, 1906:
=*Plexippus lesserti* Schenkel
棲 息：稻田、茶園(枝葉間)、山區旱田。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：貴州、湖南、浙江、湖北、陝西、山東。

Jotus linea (Karsch) 線紋蠅豹 (Hu, 1984;370)

Jotus linea (Karsch, 1879:)
=*Sitticus bilineatus* Saito
棲 息：油茶樹或其他植物上。
捕 食 性。
分 佈：貴州、湖南。

Jotus munitus Boesenberg et Strand 警戒蠅豹 (Hu, 1984:370)

Jotus munitus Boesenberg et Strand, 1906:
=*Aelurillus dimorphus* Boesenberg et Strand

=*Dexippus ? davidi* Schenkel
=*Dexippus tsckekiangensis* Schenkel
=*Jotus miarchinesicus* Strand
棲 息：草原、竹林或小灌木叢。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南 湖北。

Jotus munitus chinesicus Strand 中國警戒蠅豹 (Hu, 1984:371)
Jotus munitus chinesicus Strand, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東(汕頭)。

Kinhia yueluensis Peng 岳麓肯赫蛛 (He, et al., 1991:140)
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣西、四川、浙江。

Laufeia aenea Simon 杈形徘蛛 (Hu, 1984:371; Zhao, 1984:6)
Laufeia aenea Simon, 1888:
棲 息：大豆田、棉田。
捕 食 性。
分 佈：河南、吉林。

Marpissa elongata (Karsch) 長腹蠅獅 (Dai, 1999, 21(4):167; Dong, 1988:85; Feng, 1990:207; He, et al., 1991:140; Hu, 1984:372)
Icius elongata (Karsch, 1879:)
棲 息：山區稻田、柑橘園、茶園、牡丹園、林間之樹皮間。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、山西、寧夏。

Marpissa magister (Karsch) 縱條蠅獅 (ASZI, 1987, 2:876; Dai, 1999, 21(4):167; Feng, 1990:208; He, et al., 1991:140; Hu, 1984:372; Li et al., 1983:113; Song, 1987:296; Wang et al., 1989:129; Wu et Ji, 1989:151-155; Xie et al., 1999, 21(2):87; Xu et al., 1987:140; Zhang et al., 1994, 16(1):12; Zhao, 1984 6)
Icius magister Karsch, 1879:
=*Icidella interrogationis* Boesenberg et Strand
別 名：*雄黑跳蛛*。
棲 息：菜園、稻田(稻葉)、花生田、棉田、茶園及其他旱田作物、荻和蘆葦田或水邊雜草叢、果園叢。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
稻葉蟬
稻飛蝨
瓜野螟

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
葉蟎。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆、遼寧；日本。

Marpissa pulla (Karsch) 橫紋蠅獅 (He, et al., 1991:140; Hu, 1984:374)
Marpissa pulla (Karsch, 1879:)
棲 息：稻田或山區。
捕 食 性。
分 佈：廣東、安徽、新疆。

Marpissa sp. 蠅獅 (Zhang et al., 1994, 16(1):12)
Marpissa sp. Zhang et al., 1994:12.
棲 息：菜園。
捕 食：葉蟬
蚜蟲
瓜野螟
豆野螟
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾
菜青蟲
葉蟎。
分 佈：湖北。

Marpissa sp. 蠅虎 (Lo et Chen, 1995:369)
Marpissa sp. Lo et Chen, 1995:369.
捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨。
分 佈：臺灣。

Menemerus bivittatus (Duf) 雙條扁蠅虎 (Hu, 1984:377)
Menemerus bivittatus (Duf, 1836:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東(汕頭)。

Menemerus bonneti Schenkel 包氏扁蠅虎 (Hu, 1984:377)
Menemerus bonneti Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山東(威海)。

Menemerus confusus Boesenberg et Strand 濁斑扁蠅虎 (ASZI, 1987, 2:878; Dai, 1997, 19(1):43; Feng, 1990:209; He, et al., 1991:141; Hu, 1984:376; Song, 1987:297; Wu-xing, 1979:26; Zhang, 1983:31)
Menemerus confusus Boesenberg et Strand, 1906:350.

=*Menemerus sinensis* Schenkel, 1963:427-429.
=*Menemerus schensiensis* Schenkel, 1963:429-430.
棲 息：稻田、麥田、棉區及果樹、菜園、茶園
捕 食：稻葉蟬
稻飛蝨
茶樹枝葉間各種害蟲。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、南京、安徽、湖北、河南、陜西、山東、山西、河北、北京。

Menemerus fagei Schenkel 法氏扁蠅虎 (Hu, 1984:377)
Menemerus fagei Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Menemerus himeshimensis Boesenberg et Strand 縱帶扁蠅虎 (Hu, 1984;377; Zhang, 1983:31)
Menemerus himeshimensis Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：菜園。
捕 食 性。
分 佈：湖北、山東、山西。

Menemerus legendrei Schenkel 樂氏扁蠅虎 (Hu, 1984:377)
Menemerus legendrei Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Menemerus nimxshimeis Boesenberg et Strand (He, et al., 1991:141)
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：江蘇、山東、山西。

Menemerus schensiensis Schenkel 山西扁蠅虎 (Hu, 1984:377)
Menemerus schensiensis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：山西。

Menemerus sinensis Schenkel 中華扁蠅虎 (Hu, 1984:377)
Menemerus sinensis Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江蘇。

Menemerus wuchangensis Schenkel 武昌扁蠅虎 (Hu, 1984:377)

Menemerus wuchangensis Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Menemerus yunnanensis Schenkel 雲南扁蠅虎 (Hu, 1984:377)

Menemerus yunnanensis Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Myrmarachne formicaria (De Geer) 美麗蟻蛛 (Dai, 1999, 21(4):167; He, et al., 1991:141; Hu, 1984:378; Yan et Wang, 1987:16; Zhao, 1984 6)

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1788:)

棲 息：稻田、山區旱田或林間，棉田、果園、茶園。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻葉蟬

稻飛蝨。

分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京。

Myrmarachne formosicola Strand 臺灣蟻蛛 (Hu, 1984;381)

Myrmarachne formosicola Strand, 1910:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Myrmarachne gisti Fox 吉氏蟻蛛 (ASZI, 1987, 2:879; Feng, 1990:211; He, et al., 1991:141; Hu, 1984:379; Song, 1987:298; Yan et Wang, 1987:16)

Myrmarachne gisti Fox, 1936:

棲 息：稻田、棉田、茶園、果園和灌木叢等場所的枝葉間；山區旱田。

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東。

Myrmarachne hoffmanni Strand 赫氏蟻蛛 (Hu, 1984:381)

Myrmarachne hoffmanni Strand, 1913:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：山東(青島)。

Myrmarachne innermichelis Boesenberg et Strand 黑色蟻蛛 (Dong, 1988:85; Hu, 1984:379; Shi et al., 1989-90:89; Wang et al., 1989:130)

Myrmarachne innermichelis Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：橘園、草叢或樹葉間、荻和蘆葦田。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、上海。

Myrmarachne japonica Karsch 日本蟻蛛 (He, et al., 1991:141; Hu, 1984;380; Song, 1987:299)

Myrmarachne japonica Karsch, 1879:
棲 息：稻田、樹叢、果園。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、四川、湖北、陝西、河北。

Myrmarachne joblotti (Scopoli) 喬氏蟻蛛 (Feng, 1990:212)

Myrmarachne joblotti (Scopoli, 1763:)
=*Myrmarachne formicaria* (De Geer, 1778:)
棲 息：旱田作物、橘樹、灌木等場所。
捕 食 性。
分 佈：四川、湖南、浙江、安徽、湖北、陝西、山東、北京、吉林。

Myrmarachne lesseri Schnekel 卵腹蟻蛛 (He, et al., 1991:141)

棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Myrmarachne lugubris Kulczynski 憂蟻蛛 (Hu, 1984:381)

Myrmarachne lugubris Kulczynski, 1895:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅、烏蘇里。

Myrmarachne magnus Saito 大蟻蛛 (Hu, 1984:380)

Myrmarachne magnus Saito, 1933:
棲 息：習性同日本蟻蛛。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Myrmarachne maxillosa 7-dentata Saito 七鋸齒蟻蛛 (Hu, 1984:381)

Myrmarachne maxillosa 7-dentata Saito, 1907:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東(廣州)。

Myrmarachne patellata Strand 荷葉蟻蛛 (Hu, 1984:381)

Myrmarachne patellata Strand, 1907:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：廣東(汕頭)。

Myrmarachne sansiborica Strand 無刺蟻蛛 (Hu, 1984:381)

Myrmarachne sansiborica Strand, 1910:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Myrmarachne 7-dentata Strnad 七齒蟻蛛 (Feng, 1990:21)

Myrmarachne 7-dentata Strnad, 1907:

棲 息：橘樹、李樹及山丘灌木叢。

捕 食 性。

分 佈：廣東、四川、浙江。

Myrmarachne sp. 紅胸蟻蛛 (He, et al., 1991:141; Lin et Qian, 1981(1-2):92; Wu-xing, 1979:26)

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：福建、廣西、貴州、浙江、江蘇、上海、湖北、河南。

Myrmarachne sp. 黑蟻跳蛛 (He, et al., 1991:141)

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：貴州、湖北。

Myrmarachne sp. 蟻蛛 (Zhang et al., 1994, 16(1):12)

Myrmarachne sp. Zhang et al., 1994:12.

棲 息：菜園。

捕 食：葉蟬

蚜蟲

瓜野螟

豆野螟

菜青蟲。

分 佈：湖北。

Myrmarachne sp. 蟻蛛 (Zhang et al., 1994, 16(1):12)

Myrmarachne sp. Zhang et al., 1994:12.

棲 息：菜園。

捕 食：葉蟬

蚜蟲
瓜野螟
豆野螟
菜青蟲。
分 佈：湖北。

Myrmarachne sp. 蟻蛛 (Zhao, 1984:6)
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Philaeus chrysops (Poda) 黑斑蠅虎 (Hu, 1984:381)
Philaeus chrysops (Poda, 1761:)
棲 息：草叢間。
捕 食 性。
分 佈：山西、北京、吉林。

Phintella abnormis (Boesenberg et Strand) 異菲蛛 (Song et al., 1997:1738)
Phintella abnormis (Boesenberg et Strand, 1906:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖北；俄羅斯、日本。

Phintella accentifera (Simon) 扇形菲蛛 (He, et al., 1991:141)
棲 息：稻田。
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Phintella bifurcilinea (Boesenberg et Strand) 叉線金蟬蛛 (Chen, 1992:69; Dai, 1997, 19(1):44; 1999, 21(4):167; Feng, 1990:200; Song, 1987:307; Song et al., 1997:1736)
Phintella bifurcilinea (Boesenberg et Strand, 1906:)
別 名：*花腹麗蛛，雙叉菲蛛*。
棲 息：黃花菜根部周圍，捕食地面害蟲；茶園、稻田、果園亦可見。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
茶樹枝葉間各種害蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西；日本、越南。

Phintella cavaleriei (Schenkel) 卡氏金麗蛛 (Feng, 1990:201; Song, 1987:293; Song et al., 1997:1736)
Dexippus cavaleriei Schenkel, 1963:454-456.
別 名：*卡氏菲蛛*。
棲 息：旱田作物葉面。
捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、湖北、甘肅；朝鮮。

Phintella linea (Karsch) 細線麗蛛 (Feng, 1990:203)

Phintella linea (Karsch, 1879:)

棲 息：柑橘園、油茶樹、梨樹、檬果、荔枝樹幹及枝葉間；稻、棉田及油菜地。

捕 食 性。

分 佈：四川、湖南、浙江、湖北、陝西。

Phintella maculata 多斑菲蛛 (He, et al., 1991:141)

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：湖南、湖北。

Phintella melloteei (Simon) 黃斑金蟬蛛 (Dai, 1999, 21(4):167; Feng, 1990:204; He, et al., 1991:141; Song, 1987:294; Song et al., 1997:1737)

Phintella melloteei (Simon, 1888:)

=*Jotud difficilis* Boesenberg et Strand, 1906:336.

=*Dexippus lesserti* Schenkel, 1963:451-454.

別 名：*機敏蠅豹，梅氏菲蛛*。

棲 息：稻田、棉田、茶園、果園及旱田農作物。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)。

分 佈：湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、甘肅、吉林；朝鮮、日本、俄羅斯、中亞、羅馬尼亞。

Phintella popovi (Proszynski) 波氏金蟬蛛 (Song, 1987:294)

Phintella popovi (Proszynski, 1979:)

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：遼寧。

Phintella versicolor (C.L. Koch) 多色金麗蛛 (Feng, 1990:202; He, et al., 1991:141; Song, 1987:288; Song et al., 1997:1738)

Phintella versicolor (L. Koch, 1846:)

=*Jotus munites* Boesenberg et Strand, 1906:334-336.

=*Dexippus davidi* Schenkel, 1963:446-449.

=*Dexippus tschekiangensis* Schenkel, 1963:449-4551.

別 名：*警戒蠅豹，多色麗蛛，多色菲蛛*。

棲 息：稻田、茶園、果園、竹林或灌木叢。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北；朝鮮、日本、越南、印度。

Phelgra festiva (C.L. Koch) 麗緋蛛 (Song et al., 1997:1739)

Phelgra festiva (C.L. Koch, 1834:)

棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、廣西、貴州、浙江、安徽、湖北、陝西、山東、河北、吉林、黑龍江；朝鮮、蒙古、俄羅斯、歐洲。

Phlegra micans Simon 燦黑灰蛛 (Hu, 1984:384)
Phlegra micans Simon, 1901:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Phlegra pichoni Schenkel 皮氏黑灰蛛 (He, et al., 1991:141; Hu, 1984:383; Zhao, 1984:6)
Phlegra pichoni Schenkel, 1963:
棲 息：稻田、旱田、棉田。
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、貴州、浙江、安徽、河南、陝西、山東、北京。

Phlegra potanini Schenkel 莆氏黑灰蛛 (Hu, 1984:384)
Phlegra potanini Schenkel, 1963:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、山東、北京、甘肅。

Phlegra semipullata Simon 公黑灰蛛 (Hu, 1984:384)
Phlegra semipullata Simon, 1901:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Phlegra thibetana Simon 西藏黑灰蛛 (Hu, 1984:384)
Phlegra thibetana Simon, 1901:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Plexippoides regius Wesolowska 王擬蠅虎 (Song et al., 1997:1739)
Plexippoides regius Wesolowska, 1981:
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、浙江、安徽、湖北、河北、吉林；朝鮮。

Plexippus crassipes Karsch 粗腳蠅虎 (Hu, 1984:384)
Plexippus crassipes Karsch, 1881:

棲 息：野外的草叢或農舍的墻壁上。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川。

Plexippus discifer Schenkel 盤觸蠅虎 (He, et al., 1991:141; Hu, 1984:384; Yin et Wang, 1981:271; Zhao, 1984:6)
Plexippus discifer Schenkel, 1953:
棲 息：稻田或山地、棉田。
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、浙江、江蘇、河南、北京。

Plexippus incognitus Boesenberg et Strand 淡色蠅虎 (Hu, 1984:384)
Plexippus incognitus Boesenberg et Strand, 1906:
棲 息：室外。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plexippus paykulli (Audouin) 黑色蠅虎 (ASZI, 1987, 2:875; Barrion et Litsinger, 1995:83; Dai, 1999, 21(4):167; Dong, 1988:85; Feng, 1990:213; He, et al., 1991:141; Hu, 1984:386; Li et al., 1983:113; Song, 1987:300; Sun et al., 1984:111; Wang et al., 1989:130; Wu-xing, 1979:26; Zhang, 1983:31; Zhao, 1984:6; Zhao et al., 1999(3):19; Zong et al., 1986:119)
Attus paykulli Audouin, in Savigny, 1825:172.
=*Plexippus punctatus* Karsch, 1878:25.
Plexippus paykulli, Simon, 1889:335.
=*Menemerus crassus* Hogg, 1922:307.
=*Hyllus mimus* Chamberlin, 1924:33-34.
別 名：*白條跳蛛*。
棲 息：稻田、菜園、花生田、棉田、茶園、山坡旱田或果園、室內窗戶、墻上、山坡綠樹幹上(如梧桐、茶樹)及荻和蘆葦田。
捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)
Nephotettis virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛虱
梨網蝽
稻縱捲葉螟。
天 敵：泥蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、新疆；日本、泛熱帶(Pantropical)。

Plexippus petersi (Karsch) (Barrion et Litsinger, 1995:83)
Euophrys petersi Karsch, 1878:332.
Plexippus petersi, Simon, 1903:728.
捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
Spodoptera mauritia acronyctoides 夜蛾。
分 佈：中國；日本、菲律賓、越南、印尼、新幾內亞、非洲。

Plexippus pococki Thorell 波氏蠅虎 (He, et al., 1991:142)

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南。

Plexippus setipes Karsch 條紋蠅虎 (ASZI, 1987, 2:875; Dai, 1999, 21(4):167; Dong, 1988:85; Feng, 1990:214; He, et al., 1991:142; Hu, 1984:387; Li et al., 1983:113; Lin et Qian, 1981(1-2):92; Song, 1987:301; Xie et al., 1999, 21(2):87; Zhang, 1983:31; Zhang et al., 1994, 16(1):12; Zhao, 1984:6)

Plexippus setipes Karsch, 1879:89-90.

=*Dexippus berlandi* Schenkel, 1963:456-459.

棲 息：菜園、稻田、花生田、旱田(大豆、玉米等)、棉田、茶園、草地或灌木叢之樹幹、屋內墻上。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

稻葉蟬

葉蟬

稻飛蝨

蚜蟲

瓜野螟

豆野螟

Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾

菜青蟲

葉蟎。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、甘肅、寧夏、新疆；日本。

Portia heteroidea Xie et Yin 異形孔蛛 ·(Song et al., 1997:1740)

Portia heteroidea Xie et Yin, 1991:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：湖南、貴州、四川、陝西。

Ptocasius strupifer Simon 毛垛兜跳蛛 (Song et al., 1997:1740)

Ptocasius strupifer Simon, 1901:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣西、雲南、湖北；越南。

Rhene atrata (Karsch) 鴉雷蛛 (He, et al., 1991:142; Hu, 1984:388; Song et al., 1997:1741)

Rhene atrata (Karsch, 1881:)

棲 息：稻田。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南、四川、湖北、山東；俄羅斯、日本、越南、印度。

Rhene triapophyses Peng 三突寬胸蠅虎 (Peng, 1995:35)

Rhene triapophyses Peng, 1995:35-36.

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：雲南(勐臘)。

Silerella vittata Karsch 藍翠蛛 (Dai, 1997, 19(1):44; 1999, 21(4):167; He, et al., 1991:142; Hu, 1984:388; She et al., 1996, 22(2):9-11; Zhao, 1984:6)

Silerella vittata Karsch, 1879:

棲 息：稻田、蔬菜地和黃花菜根部、草地、茶園、棉田、山地及丘陵或灌木叢中。

捕 食：*Empoasca vitis* Göthe 假眼小綠葉蟬(茶樹)

蚜蟲

小型昆蟲

蚊類。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東。

Simonella formosana Saito 臺灣西蒙蛛 (Hu, 1984:389)

Simonella formosana Saito, 1933:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Sitticus clavator Schenkel 棒躍蛛 (Song, 1987:303)

Sitticus clavator Schenkel, 1963:

棲 息：

捕 食 性。

分 佈：河北、甘肅。

Sitticus fascifer (Simon) 卷帶躍蛛 (Feng, 1990:216; He, et al., 1991:142; Hu, 1984:399; Song, 1987:304)

Sitticus fascifer (Simon, 1880:)

棲 息：稻田、常跳躍于室內窗框上。

捕 食：蠅類。

分 佈：河南、陝西、北京、內蒙古。

Sitticus floricola (C. L. Koch) 花躍蛛 (Zhou et Song, 1985, 2(3/4):374)

Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837:)

棲 息：林沼澤地、河邊草間。

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Sitticus niveosegnatus (Simon) 雪記躍蛛 (Song, 1987:305)

Attus niveosegnatus Simon, 1880:110-101.
Sitticus niveosignatus, Song et Yu, 1983:14.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：北京。

Sitticus patellidens Boesenberg et Strnad 白星躍蛛 (Hu, 1984:399)
Sitticus patellidens Boesenberg et Strnad, 1906:
棲 息：柑橘林中。
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Sitticus penicillatus Simon 五紋躍蛛 (Feng, 1990:217; He, et al., 1991:142; Hu, 1984:390; Zhao, 1984:6)
Sitticus penicillatus Simon, 1875:
別 名：*王斑躍蛛*。
棲 息：稻田、蘋果樹上、棉田。
捕 食 性。
分 佈：貴州、浙江、河南、陝西、北京。

Sitticus pubescens (Fabricius) 多毛躍蛛 (Zhao, 1984:6)
棲 息：棉田。
捕 食 性。
分 佈：河南。

Sitticus sinensis Schenkel 中華躍蛛 (He, et al., 1991:142; Hu, 1984:391; Zhao, 1984:6)
Sitticus sinensis Schenkel, 1963:
棲 息：稻田、棉田、山區或丘陵地帶旱田。
捕 食 性。
分 佈：湖南、河南、陝西、山東、青海、甘肅、新疆。

Stenaelurillus hainanensis Peng 瓊斯坦蛛 (Peng, 1995:36)
Stenaelurillus hainanensis Peng, 1995:36-37.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：海南。

Synagelides agoriformis Strand 日本合跳蛛 (Xie et Yin, 1990:301)
Synagelides agoriformis Strand, 1906:93-422.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；日本、北韓、蘇聯(Primore)。

Synagelides annae Bohdanowicz 安氏合跳蛛 (Xie et Yin, 1990:302)

Synagelides annae Bohdanowicz, 1979:56-59.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西(廬山)；日本。

Synagelides cavaleriei (Schenkel) 卡氏合跳蛛 (Song, 1987:306)
Synagelides cavaleriei (Schenkel, 1963:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Synagelides gambosa Xie et Yin 蹄形合跳蛛 (Xie et Yin, 1990:298)
Synagelides gambosa Xie et Yin, 1990:298-300.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：湖南(張家界國家森林公園)。

Synagelides lushanensis Xie et Yin 廬山合跳蛛 (Xie et Yin, 1990:300)
Synagelides lushanensis Xie et Yin, 1990:300-301.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：江西(廬山)。

Synagelides zhilcovae Proszynski 齊氏合跳蛛 (Xie et Yin, 1990:302)
Synagelides zhilcovae Proszynski, 1979:319.
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：吉林；蘇聯(Primore)。

Telamonia bifurcilinea Boeseng et Strand 花腹巢跳蛛 (He, et al., 1991:142; Hu, 1984:391)
Telamonia bifurcilinea Boeseng et Strand, 1906:
棲 息：稻田、草地。
捕 食 性。
分 佈：廣東、四川、浙江、江蘇、陝西。

Telamonia vlijmi (Proszynski) 弗氏巢跳蛛 (Song, 1987:309)
Telamonia vlijmi (Proszynski, 1976:)
棲 息：
捕 食 性。
分 佈：安徽。

Yllenus bajan Proszynski 巴江野蛛 (Song et Haupt, 1996:316)
Yllenus bajan Proszynski, 1968:

捕 食 性。
分 佈：新疆；蒙古。

國家圖書館預行編目資料

害蟲天敵名錄 / 林珪瑞 / 臺中縣：
行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第 104 號
A List of Natural Enemies of Insect Pests
2003 (民國 92 年) 初版
版面 : 26 X 19 cm.
ISBN : 957-01-4782-2 全套：精裝
ISBN : 957-01-4783-0 全套：平裝
1. 天敵類 － 害蟲天敵 － 名錄
統一編號 : 1009202718

害蟲天敵名錄

發行人 : 林俊義
編著者 : 林珪瑞
出版者 : 行政院農業委員會 農業試驗所
地址 : (413) 臺中縣霧峰鄉中正路 189 號
網址 : http:/www.tari.gov.tw
電話 : (04) 23302301
傳真 : (04) 2333-8162
承印者 : 信成文具印刷有限公司
地址 : 臺中市興中街 106 號
電話 : (04)22224617
傳真 : (04)22272358
出版日期 : 中華民國九十二年九月 初版
工本費 : NT$ 1800 元 (全套精裝 全套平裝)
ISBN : 957-01-4782-2 (全套：精裝)
ISBN : 957-01-4783-0 (全套：平裝)
統一編號 : 1009202718
展售書局地址 :
國家書坊臺視總店 : 臺灣市八德路三段 10 號
TEL :02-25781515-643
三民書局 : 臺北市重慶南路一段 61 號
TEL :02-23617511
五南文化廣場 : 臺中市中山路 2 號 B1
TEL : 04-22260330
新進圖書廣場 : 彰化市光復路 177 號
TEL : 04-27252792
青年書局 : 高雄市青年一路 141 號
TEL : 07-3324910

ISBN 957-01-4783-0